

V09 NICORETTE® INVISIPATCH 10 mg/16h, 15 mg/16h, 25 mg/16h nicotina, adesivo transdérmico. **Indicações:** Tratamento da dependência do tabaco. Indicado ≥ 18 anos, exceto se recomendado pelo médico. **Posologia e modo de administração:** Aplicar adesivo na pele limpa e intacta de manhã ao levantar e remover à noite ao deitar. Fumadores com dependência elevada: iniciar com um adesivo/dia de 25 mg/16h, durante 8 semanas; reduzir a dose com um adesivo/dia de 15 mg/16h durante 2 semanas e seguidamente, durante 2 semanas, aplicar um adesivo/dia de 10 mg/16h. Fumadores com baixa dependência: iniciar com um adesivo/dia de 15 mg/16h durante 8 semanas e reduzir para 10 mg/16h nas últimas 4 semanas do tratamento. Nicorette Invisipatch pode ser utilizado em associação com Nicorette® 2 mg (sabor clássico e sabor menta fresca), Nicorette® BucoMist ou Nicorette® BucoMist Sabor Fruta Menta para fumadores com elevado grau de dependência, que continuam a sentir desejos incontroláveis de fumar ou que não tiveram sucesso com a monoterapia. Não utilizar ≥ 6 meses. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes. **Advertências e precauções:** doenças cardiovasculares, compromisso renal/hepático, doenças gastrointestinais. Não utilizar com problemas dermatológicos crónicos. **Efeitos indesejáveis:** prurido; náusea, vômitos, cefaleias, erupção cutânea, urticária; palpitações, taquicardia, reações no local de aplicação, astenia, desconforto e dor no tórax, mal-estar geral, fadiga, hipersensibilidade, mialgia, parestesia, sonhos anormais, dispneia, hiperidrose, rubor, hipertensão; desconforto gastrointestinal, reação anafilática, dor nas extremidades, angioedema, eritema, convulsão. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.