

V06 **NASEX®** 1 mg/ml xilometazolina, gotas nasais, solução. **Indicações:** tratamento sintomático temporário da congestão nasal causada por rinite/sinusite. **Posologia e modo de administração:** via nasal, 1-2 gotas em cada narina até 3 vezes/dia, durante um máximo de 7 dias. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes, crianças < 12 anos, aumento da pressão intraocular (especialmente glaucoma de ângulo fechado), *Rhinitis sicca*, após hipofisectionia transfenoidal/cirurgias transnasais/transorais em que a dura-máter tenha sido exposta, uso concomitante com IMAOs ou uso de IMAOs nas 2 semanas anteriores, ou uso de medicamentos com efeito hipertensor, rinite atrófica/vasomotora. **Advertências e precauções:** precaução: doentes que reagem fortemente a simpaticomiméticos, doenças cardíacas/vasculares, hipertensão, hipertiroidismo, diabetes, hipertrofia da próstata e feocromocitoma. A duração do tratamento deve ser a mais curta possível, devido ao “efeito rebound”. Apenas para suporte temporário na rinite alérgica. **Efeitos indesejáveis:** dor/ardor no nariz e garganta, secura da membrana mucosa nasal; epistaxe; reações alérgicas sistémicas, nervosismo, insónias, cefaleias, tonturas, alterações visuais temporárias, palpitações, aumento da pressão arterial, náuseas; “efeito rebound”. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.