

V10 **BIAFINE®** 6,7 mg/g trolamina, emulsão cutânea. **Indicações:** eritema solar, queimaduras de 1º grau, feridas cutâneas superficiais não infetadas. **Posologia e modo de administração:** aplicar uma camada espessa, ultrapassando largamente a superfície da ferida/lesão. Aplicar 2 a 4 vezes ao dia, até que a área afetada cure completamente. Para as queimaduras de 1º grau, fazer penetrar a última camada através de ligeira massagem. Para as feridas cutâneas superficiais não infetadas, limpar a lesão, aplicar como descrito acima e renovar as aplicações, mantendo sempre um excedente da emulsão sobre a lesão. Se necessário, cobrir com compressa humedecida. Não utilizar penso absorvente seco. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes, feridas com hemorragia e/ou infetadas. **Advertências e precauções:** Afastar dos olhos. Utilização em bebés < 4 semanas com feridas abertas ou grandes áreas de pele gretada ou lesada mediante avaliação do profissional de saúde. **Efeitos indesejáveis:** reações no local de administração. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.