

V08 **HEXTRIL**[®] 1 mg/ml hexetidina, solução bucal. **Indicações:** infeções menores da orofaringe e estados inflamatórios, incluindo candidíases, como adjuvante na prevenção/tratamento de gengivites e controlo de complicações faríngeas e úlceras aftosas recorrentes; halitose e cirurgia dentária nos cuidados pré/pós-operatórios; higiene oral, incluindo prevenção/controlo da placa dentária. **Posologia e modo de administração:** administração tópica na cavidade bucal. Bochechar/gargarejar durante 30 segundos com, pelo menos, 15 ml 2-3 vezes/dia, não excedendo as 3 utilizações/dia. Não engolir. Cuspir após utilização. Não diluir e agitar bem antes de utilizar. Não recomendado para crianças < 12 anos. **Contraindicações:** hipersensibilidade aos componentes. **Efeitos indesejáveis:** reações de hipersensibilidade, angioedema, ageusia, disgeusia, tosse, dispneia, boca seca, disfagia, náuseas, aumento das glândulas salivares, vômitos, reações no local de aplicação. MNSRM. Para mais informações contactar o titular da AIM. JNTL Consumer Health (Portugal), Lda. Lagoas Park, Edifício 11, Piso 0, 2740-270 Porto Salvo. NIPC 516808206.