

MOTRIN® Dosificación Fácil

Alivio fuerte y eficaz para dolores y molestias leves, incluidos dolores musculares, dolores de espalda y dolores leves por artritis



Use el producto solo como se indica.

MOTRIN® IB Comprimidos Recubiertos

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA	INSTRUCCIONES
Ibuprofén (NSAID*) 200 mg (en cada comprimido)	Adultos y niños de 12 años en adelante: Tome 1 comprimido recubierto cada 4 a 6 horas mientras persistan los síntomas; si la fiebre o el dolor no responden a 1 comprimido, se pueden tomar 2 comprimidos Niños menores de 12 años: Consulte con un médico	No tome más de 6 comprimidos recubiertos en 24 horas, a menos que lo indique un médico

Alivio de acción rápida para dolores y molestias leves, incluidos calambres menstruales, dolores de muelas y dolores musculares



Use el producto solo como se indica.

MOTRIN® IB Geles Líquidos

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA	INSTRUCCIONES
Ibuprofén (NSAID*) 200 mg (en cada cápsula)	Adultos y niños de 12 años en adelante: Tome 1 cápsula cada 4 a 6 horas mientras duren los síntomas; si la fiebre o el dolor no responden a 1 cápsula, se pueden tomar 2 cápsulas Niños menores de 12 años: Consulte con un médico	No tome más de 6 cápsulas en 24 horas, a menos que lo indique un médico

Alivio rápido y eficaz para el dolor de la migraña y los síntomas relacionados con esta, como la sensibilidad a la luz y las náuseas



Use el producto solo como se indica.

MOTRIN® Geles Líquidos para la Migraña

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA	INSTRUCCIONES
Ibuprofén (NSAID*) 200 mg (en cada cápsula)	Adultos: Tome 2 cápsulas con un vaso con agua. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte con un profesional de la salud Menores de 18 años: Consulte con un médico	No tome más de 2 cápsulas en 24 horas, a menos que lo indique un médico

Alivio de dolores y molestias leves, con una ayuda eficaz para dormir por la noche



Use el producto solo como se indica.

MOTRIN® PM Comprimidos Recubiertos

INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS Y FRECUENCIA	INSTRUCCIONES
Citrato de difenhidramina 38 mg Ibuprofén (NSAID*) 200 mg (en cada comprimido)	Adultos y niños de 12 años en adelante: Tomar 2 comprimidos recubiertos antes de acostarse	No tomar más de 2 comprimidos recubiertos en 24 horas

*Medicamento antiinflamatorio no esteroide.

Esta no es una lista completa de todos los productos MOTRIN®.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO ADECUADO:

- Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta en todos los productos MOTRIN®. Conserve la caja.
- **NO** use con ningún otro producto que contenga NSAID*
- Espere el tiempo indicado entre dosis
- Si tiene alguna pregunta, consulte con un profesional de la salud para saber qué producto es adecuado para usted

Motrin®

Visite Motrin.com para
obtener información
adicional sobre
el producto