Spikevax dispersija injekcijām
COVID-19 mRNS vakcīna (nukleozīdu modificēta)
Uzglabāšana un apstrāde

Uzglabāšana sasaldētā veidā

Uzglabāt sasaldētu no -25 °C līdz -15 °C temperatūrā.

Neuzglabāt temperatūrā, kas zemāka par -50 °C.

Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.



Pirms lietošanas atkausējiet katru flakonu

Flakonu attēliem ir tikai ilustratīva nozīme

2 stundas un 30 minūtes ledusskapī

no 2°C līdz 8°C

(30 dienu laikā 2 °C līdz 8 °C temperatūrā)



VAI

1 stunda istabas temperatūrā

no 15 C līdz 25 C



Pirms zāļu ievadīšanas ļaujiet flakonam sasilt istabas temperatūrā 15 minūtes

Norādījumi pēc atkausēšanas

Neatvērts flakons

Maksimālais laiks

30 dienas — Ledusskapī, no 2 C līdz 8 C

24 stundas — Uzglabāt vēsumā vai istabas temperatūrā, no 8 C līdz 25 C

Pēc pirmās devas ievilkšanas

Maksimālais laiks

19 stundas — Ledusskapī vai istabas temperatūrā

Flakons jāuzglabā no 2 C līdz 25°C temperatūrā. Uzrakstīt izmešanas datumu un laiku uz flakona etiķetes.

Izmetiet lietoto flakonu pēc 19 stundām.

Ievelciet no flakona katru vakcīnas devu, izmantojot jaunu sterilu adatu un šļirci katrai injekcijai, lai novērstu infekciju izraisītāju pārnešanu no vienas personas uz otru.
Deva šļircē ir jāizlieto nekavējoties.

Kad flakona aizbāznis ir pārdurts, lai ievilktu sākotnējo devu, vakcīna jāizlieto nekavējoties un pēc 19 stundām jāizmet.

Neizlietotās vakcīnas vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

NEKAD **atkārtoti nesasaldējiet atkausēto vakcīnu**

moderna

Spikevax dispersija injekcijām
COVID-19 mRNS vakcīna (nukleozīdu modificēta)

Deva un lietošana

Devas un grafiks

Primārās vakcinācijas sērijas
Personas no 12 gadu vecuma
Spikevax tiek ievadīta 2 (divu) 100 mikrogramu devu (katra pa 0,5 ml) kursā.

Bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem
Spikevax ievada kā 2 (divu) 50 mikrogramu devu kursu (katra deva 0,25 ml, kas satur 50 mikrogramus mRNS, kas veido pusi no primārās devas personām no 12 gadu vecuma). Otro devu ieteicams ievadīt 28 dienas pēc pirmās devas.

Personas ar smagiem imūnās sistēmas traucējumiem no 6 gadu vecuma
Personām ar smagiem imūnās sistēmas traucējumiem ne agrāk kā 28 dienas pēc otrās devas var ievadīt trešo Spikevax devu -- cilvēkiem no 12 gadu vecuma 0,5 ml jeb 100 mikrogramus, bet bērniem vecumā no 6 līdz 11 gadiem 0,25 ml jeb 50 mikrogramus.

Balstvakcinācijas deva
Personas no 18 gadu vecuma
Spikevax balstvakcinācijas devu (0,25 ml, kas satur 50 mikrogramus mRNS, kas ir puse no primārās devas) pieaugušajiem jāievada intramuskulāri vismaz 3 mēnešus pēc primārās sērijas pabeigšanas.
Spikevax var izmantot kā balstvakcīnu pieagušajiem, kuri saņēmuši primāro Spikevax sēriju, vai primāro sēriju, kas veidota no citas mRNS vakcīnas vai adenovīrusa vektora vakcīnas.

Lietošana

Pēc atkausēšanas un pirms katras devas ievilkšanas uzmanīgi pavirpiniet flakonu.
Vakcīna ir gatava lietošanai pēc atkausēšanas. **Nekratīt un neatšķaidīt.**

Pirms injekcijas ievadīšanas pārbaudiet katru devu, lai:

Pārliecinātos, ka gan **flakonā, gan** šļircē šķidrums ir baltā līdz bālganā krāsā.

Pārliecinātos par šļirces tilpumu.

Vakcīna var saturēt baltas vai caurspīdīgas zāļu makrodaļiņas.

Ja deva ir nepareiza vai ir mainījusies krāsa un ir redzamas citas daļiņas, neveiciet vakcināciju.

Vakcinējamajai personai vai tās aprūpētājam izsniedziet vakcinācijas kartīti, kurā norādīts datums, kad jāatgriežas, lai saņemtu nākamās Spikevax ***DEVAS***.

Jautājumu gadījumā apmeklējiet vietni www.modernacovid19global.com un izvēlieties savu valsti.

TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Spikevax ir paredzēta aktīvai imunizācijai, lai novērstu COVID-19, ko izraisa SARS-CoV-2, personām no 6 gadu vecuma. Šī vakcīna jālieto saskaņā ar oficiālajiem ieteikumiem.

KONTRINDIKĀCIJAS
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

moderna

©2022 Moderna, Inc.