


Spikevax dispersão injetável Vacina de mRNA contra a COVID-19 (nucleósido modificado)

Armazenamento e conservação

Armazenamento de congelação

Armazenar congelado entre
-25 °C e -15 °C

Não armazenar abaixo de -50°C
Conservar na embalagem de origem para
proteger da luz.



Descongelar cada frasco para injetáveis antes da utilização

Imagens de frascos para injetáveis apenas para fins ilustrativos

2 horas e 30 minutos no frigorífico

2°C a 8°C


(dentro do prazo de
validade de 30 dias
entre 2°C e 8°C)



OU

1 hora à temperatura ambiente

15°C a 25°C



Deixe o frasco para injetáveis repousar à temperatura ambiente durante 15 minutos antes de administrar

Instruções após descongelação

Frasco para injetáveis não perfurado

Tempos máximos

30
dias

Frigorífico

2°C a 8°C

24
horas

Armazenamento refrigerado
até à temperatura ambiente

8°C a 25°C



Após retirada da primeira dose

Tempo máximo

19
horas

Frigorífico ou
temperatura ambiente

O frasco para injetáveis deve ser
mantido entre 2°C e 25°C. Registrar
data e hora de eliminação na
etiqueta do frasco.

Elimine o frasco para injetáveis
perfurado após 19 horas.



Retire cada dose da vacina do frasco para injetáveis utilizando uma nova agulha estéril e seringa para cada injeção, para evitar a transmissão de agentes infecciosos de uma pessoa para outra.

A dose na seringa deve ser utilizada imediatamente.

Assim que o frasco para injetáveis tiver sido perfurado para retirar a dose inicial, a vacina deve ser utilizada imediatamente e eliminada após 19 horas.

Qualquer vacina não utilizada ou resíduos devem ser eliminados de acordo com os requisitos locais.

NUNCA volte a congelar a vacina descongelada

moderna®

Spikevax dispersão injetável Vacina de mRNA contra a COVID-19 (nucleósido modificado)

Dosagem e administração

Dosagem e esquema

Esquema de vacinação primário

Indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos

A Spikevax é administrada com um esquema de 2 (duas) doses de 100 microgramas (de 0,5 ml cada).

Crianças com idades compreendidas entre 6 e 11 anos

A Spikevax é administrada com um esquema de 2 (duas) doses de 50 microgramas (0,25 ml cada, contendo 50 microgramas de mRNA que corresponde a metade da dose primária para indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos).

Recomenda-se que a segunda dose seja administrada 28 dias após a primeira dose.

Indivíduos gravemente imunocomprometidos com idade igual ou superior a 6 anos
Pode ser dada uma terceira dose, pelo menos 28 dias após a segunda dose, a indivíduos com idade igual ou superior a 12 anos (0,5 ml, 100 microgramas) e a crianças com idades compreendidas entre 6 e 11 anos (0,25 ml, 50 microgramas) com compromisso imunitário grave.

Dose de reforço

Indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos

Pode ser dada uma dose de reforço de Spikevax (0,25 ml, contendo 50 microgramas de mRNA, o que constitui metade da dose primária) por via intramuscular a adultos, pelo menos 3 meses após o término do esquema de vacinação primário.

A Spikevax pode ser usada como reforço em adultos a quem tenha sido administrada a vacinação primária com Spikevax ou com outra vacina de mRNA ou de vetor adenoviral.

Administração

Misture suavemente o conteúdo do frasco para injetáveis após a descongelação e antes de retirar cada dose. A vacina está pronta a utilizar após descongelação. **Não agite nem dilua.**

Antes da injeção, inspecione cada dose para:

Confirmar que o líquido se apresenta
com uma cor **branca a esbranquiçada**

Verificar o volume na seringa

A vacina pode conter partículas brancas ou translúcidas relacionadas com o produto.

Se a dosagem estiver incorreta, ou houver descoloração e estiverem presentes outras partículas, não administre a vacina.



Forneça um cartão de vacina ao vacinado ou ao seu prestador de cuidados com a data em que o vacinado precisa de regressar para a **DOSE FUTURA** da Spikevax.

Para questões, visite www.modernacovid19global.com e seleccione o seu país.

INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS

A Spikevax é indicada para imunização ativa, para prevenção da COVID 19 causada pelo SARS CoV 2 em indivíduos com idade igual ou superior a 6 anos. A utilização desta vacina deve ser feita de acordo com as recomendações oficiais.

CONTRAINDICAÇÕES

Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes.

moderna®