

치성 농양: 환자에게 치성 농양의 원인과 치료법을 알려 주십시오.

치성 농양은 통증을 동반한 부종으로 노란색의 끈적한 액체(고름)가 차 있습니다. 치성 농양은 치은 농양(치주 농양이라고도 함)과 치아 농양(치아근침 주위 농양이라고도 함)의 두 가지 유형이 있습니다.

치성 농양의 원인

농양은 입안이 자극받거나 감염을 일으키는 박테리아가 침입하면 발생할 수 있습니다. 감염이 확산되는 것을 막기 위한 보호막으로서 감염 부위에 농양이 형성됩니다.

치은 농양은 일반적으로 치아와 잇몸 사이의 감염으로 인해 발생합니다. 이 같은 감염은 끼어 있는 음식으로 인해 발생하거나, 심각한 치주 질환이 있는 경우 잇몸 아래와 뼈에 박테리아가 증식하면 발생할 수 있습니다.

치아 농양은 치주의 끝에 나타나며 치신경이 죽거나 죽어갈 때 발생합니다.

치성 농양의 증상

치성 농양의 증상은 다음과 같습니다.

- 쏘시는 통증
- 고름이 차 있는 부종
- 잇몸 염증
- 닿으면 아픈 치아
- 입안의 안 좋은 맛(고름이 목으로 넘어갈 때 발생)

감염증이 수개월 또는 수년간 지속되고 치료를 받지 않으면 치유되지 않을 수 있으므로 치아 농양 또는 치은 농양의 증상을 간과하지 않는 것이 중요합니다. 감염증을 방치할 경우 치아와 주위의 뼈를 손상시키고 혈류로 번져 더 심각한 합병증을 일으킬 수 있습니다.

치성 농양의 치료

치아 농양 또는 치성 농양으로 판단되는 경우 치과 전문의의 진료를 받아야 합니다.

치과 의사는 농양 주변 분위기를 세척하고 농양 배액술을 통해 고름을 짜내고 감염증을 치료합니다. 입안에 뼈와 피부를 뚫는 누공이 생겨 고름이 흘러들어가는 경우도 있습니다. 농양으로 인해 이 같은 누공이 생긴 경우 치과 의사는 해당 부위를 세척하여 자연적으로 없어지게 합니다.

치아 안쪽부터 감염이 시작된 경우 치과 의사는 치아에 작은 구멍을 뚫어야 합니다. 이 방법으로 농양이 배출되게 합니다. 이 시술 후에는 근관 치료와 채우기 또는 크라운 치료가 필요합니다.

농양으로 인해 치아가 손상되거나 농양의 크기가 특히 큰 경우에는 발치해야 할 수 있습니다.

치성 농양으로 인해 치주 질환이 발생한 경우 해당 질환을 치료하여 추가 감염을 예방해야 합니다. 단, 통증을 완화하기 위해 치과 의사가 농양을 배출할 수 있습니다.

치성 농양 예방법

치아 건강을 잘 유지하면 농양을 예방할 수 있습니다. 매일 이를 닦고 치실을 사용하며 치과 전문의에게 정기적으로 검진을 받는 것 등이 치아 건강을 지키는 방법입니다.

다음 제품을 사용하는 것이 좋습니다.

Oral-B 전기 충전식 칫솔

Oral-B 수동 칫솔

크레스트 치약

구강 -B 치실

크레스트 및 구강 -B 구강 청결제