




COMPRENDRE LE PROCESSUS D'IMPLANT DENTAIRE

DENT MANQUANTE



MISE EN PLACE DE L'IMPLANT



GUÉRISON



RESTAURATION DE L'IMPLANT
(POSITIONNEMENT DU PILIER ET DE LA COURONNE)



L'HYGIÈNE BUCCODENTAIRE EST LA CLÉ DE LA RÉUSSITE DES IMPLANTS


IL EST IMPORTANT D'ADOPTER DE BONNES HABITUDES D'HYGIÈNE BUCCODENTAIRE ET D'UTILISER DES PRODUITS ÉPROUVÉS POUR AIDER À MAINTENIR UNE SANTÉ DES GENCIVES OPTIMALE - AVANT ET APRÈS LA CHIRURGIE



- ✓ Se brosser les dents deux fois par jour
- ✓ Utiliser la soie dentaire tous les jours
- ✓ Utiliser le rince-bouche selon les recommandations



- ✓ Nettoyer autour de l'implant à l'aide de l'hydropulseur avancé Oral-B
- ✓ Parfait pour les implants



Consultez votre professionnel des soins buccodentaires pour de plus amples directives

RISQUEZ-VOUS DE SOUFFRIR D'UNE MALADIE DES IMPLANTS?



EN SANTÉ

- Aucune douleur
- Aucune rougeur ou inflammation
- Aucun saignement lors des soins à domicile

COMPLICATIONS POTENTIELLES

- Aucune



MUCOSITE PÉRI-IMPLANTAIRE

- Rougeur et inflammation au niveau de la gencive
- Douleur et sensibilité sur le site
- Saignements lors des soins à domicile

COMPLICATIONS POTENTIELLES

- Douleur et inconfort chroniques
- Progression vers la péri-implantite



PÉRI-IMPLANTITE

- Rougeur et inflammation au niveau de la gencive
- Douleur et sensibilité sur le site
- Saignements lors des soins à domicile
- Perte osseuse
- Mobilité/perte de l'implant (dans les cas avancés)

COMPLICATIONS POTENTIELLES

- Perte osseuse permanente
- Défaillance potentielle et perte de l'implant
- Dans les cas sévères, une intervention chirurgicale pourrait être requise



LE SAVIEZ-VOUS?

LE TAUX D'ÉCHEC DES IMPLANTS DENTAIRES PEUT ALLER JUSQU'À 11 %, EN PARTIE À CAUSE DES FACTEURS DE RISQUE QUI SUIVENT*¹ :

- L'accumulation de la **plaque**
- Le **tabagisme**
- Les **maladies gingivales** récurrentes
- Les antécédents de **parodontite**
- Le défaut de **maintenir une bonne hygiène buccodentaire**
- Le **diabète** qui n'est pas contrôlé

* Plusieurs facteurs pourraient être en cause d'un échec de l'implant. Les patients de moins de 55 ans et les fumeurs ou anciens fumeurs, en plus des patients ayant des implants avec un accès inadéquat à l'hygiène interdentaire présentaient plus souvent un échec d'implant tardif. Référence : 1. Takamoli J et coll. Clin Oral Implants Res 2021 May;32(5):619- 628. doi: 10.1111/clr.13732. Publication électronique 23 mars 2021. PMID: 33629418.