

ベージニオ[®]錠を 服用される患者さんへ

ベージニオ[®]錠の服用中に

かん しつ せい はい しつ かん

「間質性肺疾患*」

があらわれることがあります。



以下のような症状が見られた場合には、

服用を中止し、速やかに

治療を受けている医療機関に連絡してください。

□ 階段を登ったり、少し無理をしたり
すると息切れがする・息苦しくなる

からせき たん

□ 空咳(痰のない咳)が出る

□ 発熱する など



*間質性肺炎・肺臓炎とよばれることがあります

かんしつせいはいしっかん

- 間質性肺疾患は、
急に重篤化して死亡に至る可能性があるため、
早期発見と**早期治療**が大切です

- 症状が見られた場合には、
ページニオの**服用を中止し、速やかに**
治療を受けている医療機関(あるいは指示された
緊急時の連絡先)に連絡してください

緊急時の連絡先

	通常時	夜間・休日
● 医療機関名		
● 診療科名		
● 担当医名		
● 電話番号		

ご家族または介護されている方へ

上記医療機関を受診できない場合は、

- ✓ 救急対応が可能な医療機関を受診してください
- ✓ 受診先の医師などには、間質性肺疾患を起こす可能性のある薬剤(ページニオ)を服用中の旨お伝えください

本リーフレットの内容は動画でもご覧いただけます。

アクセスはこちら ▶▶▶



ページニオに関する
お問い合わせ

ページニオ相談窓口
日本イーライリリー株式会社

フリー
ダイヤル **0120-526-062**

(365日年中無休/時間9:00-21:00)



日本イーライリリー株式会社

ABE-N004 (R3)
2021年12月作成