

フルテオ[®]を投与されている患者さんへ

以下のような症状が現れたら、**投与をやめ、
すぐに主治医に連絡を取ってください。**

じん麻疹

**血圧低下、
意識がうすれる**

**投与すると
いつも動悸(どうき)
を感じる**

呼吸困難

**顔、唇、舌、
のどの腫れ**

**吐き気、嘔吐(おうと)、
ひどい便秘、目が覚めない、
脱力が起こる**

すぐに対応する必要はありませんが、フルテオ[®]には
以下のような副作用が出ることがあります。

頭痛

恶心

食欲不振

**筋肉がピクピクする、
筋肉のけいれん、
筋肉の痛み**

- フルテオ[®] 投与中・投与終了後にかかわらず、骨肉腫と診断されたら、フルテオ[®] 治療を受けている（受けていた）ことをすぐに主治医に伝えてください。

起立性低血圧、めまいや意識消失が起こることがあります。

○ 転倒の危険がありますので、十分に注意してください。

○ 高血圧治療中の方や低血圧を指摘されたり、めまい、立ちくらみ、動悸(どうき)等の症状がみられたことのある方は特に注意してください。

○ ショックや、一過性の急激な血圧低下に伴う意識消失があらわれることがあります。

この薬の注射後30分程度はできる限り安静にしてください。また、血圧低下、めまい、立ちくらみ、動悸(どうき)、気分がすぐれない、吐き気、顔面が蒼白(そうはく)になる、冷や汗が出るなどがあらわれた場合は、症状がおさまるまで座るか横になってください。
その後、主治医に連絡してください。

主治医または薬剤師への連絡先



Lilly Answers リリーアンswers 日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口

一般の方・患者様向け

0120-245-970 *1 **078-242-3499** *2

*1 通話料は無料です。携帯電話からでもご利用いただけます。尚、IP電話からはフリーダイヤルをご利用できない場合があります。

*2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

*3 祝祭日および当社休日を除きます。

当社製品に関するお問い合わせ

受付時間

月曜日～金曜日
8:45～17:30 *3