

ベージニオ[®]錠を 服用される患者さんへ

このお薬を服用中は特に以下のことに注意しましょう

以下のような症状が見られた場合には、
服用を中止し、治療を受けている医療機関に

速やかに 連絡してください。



かんしつせいはいしっかん
□ 間質性肺疾患が疑われる症状

- 階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる
- 空咳からせき たん (痰のない咳) が出る
- 発熱する など



□ 下痢による脱水が疑われる症状

- めまい、頭痛がする
- 尿の量が減ったり、色が濃くなったりする
- 水分がとれない など



- 肝機能障害 (肝機能検査値の上昇)、骨髄抑制 (血液細胞の数の減少) があらわれることがあるため、医師の指示に従って、定期的に血液検査を受けてください。

かんしつせいはいしっかん

- 間質性肺疾患(間質性肺炎・肺臓炎など)は、急に重篤化して死亡に至る可能性があるため、**早期発見**と**早期治療**が大切です
- 症状が見られたら**速やかに**主治医の先生に相談しましょう

緊急時の連絡先

	通常時	夜間・休日
● 医療機関名		
● 診療科名		
● 担当医名		
● 電話番号		

他の医療機関を受診する場合や、薬局などで他のお薬を購入する場合は、必ずこのお薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

ページニオに関する
お問い合わせ

ページニオ相談窓口
日本イーライリリー株式会社

フリー
ダイヤル **0120-526-062**

(365日年中無休/時間9:00-21:00)

Lilly

日本イーライリリー株式会社

ABE-N006(R1)
2020年5月作成