



LUMBALGIA



- Alrededor del **70% de los adultos presenta un episodio de lumbalgia a lo largo de su vida.**^{1,2}
- Este tipo de dolor puede ser provocado por una variedad de causas, como espasmos musculares, tensión o hernias discales, entre otros.²
- Aunque el tratamiento puede requerir fisioterapia u otras intervenciones, el uso de analgésicos es fundamental para el control del dolor.²
- El paracetamol es un analgésico de primera elección en el manejo del dolor lumbar leve a moderado¹, y posee misma eficacia clínica con menor tasa de eventos adversos que otros analgésicos para el dolor de espalda baja.³⁻⁷



**POTENCIA ANALGÉSICA,
SEGURIDAD COMPARABLE CON PLACEBO⁸⁻¹¹**




Sistema óseo

Columna vertebral¹²⁻¹³

Estructura anatómica Articulación intervertebral con terna de disco

1. Cuerpo vertebral
2. Raíz nerviosa
3. Disco intervertebral
4. Anillo fibroso disco intervertebral
5. Núcleo pulposo disco intervertebral
6. Hernia de disco
7. Meninges (Duramadre, aracnoides y piamadre)
8. Médula espinal



Estructura anatómica Columna vertebral, vista lateral

1. Atlas (C1)
2. Axis (C2)
3. Columna cervical (C1 a C7)
4. Lordosis cervical
5. Columna torácica (T1 a T12)
6. Cifosis torácica
7. Columna lumbar (L1 a L5)
8. Lordosis lumbar
9. Sacro (S1 a S5)
10. Cóccix
11. Cifosis sacra



Presentaciones de **20 y 40**
tabletas

Una tableta cada
4-6 horas
Sin exceder 5 tabletas al día

Referencias: 1. Guía de Práctica Clínica GPC Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de Lumbalgia Aguda y Crónica en el Primer Nivel de Atención. 2. Lumbago agudo. Medline. Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007425.htm>. 3. Sharma C, Mehta V. Paracetamol- mechanisms and updates, Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain, Volume 14, Issue 4, August 2014, Pages 153-158. 4. Ridderikhof ML, et al. Acetaminophen or Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs in Acute Musculoskeletal Trauma-A Multicenter, Double-Blind, Randomized, Clinical Trial. *Ann EmergMed*. 2018;71(3)-357-368.e8. 5. Hung K, Graham C, Lo RSL, et al. Oral paracetamol and/or ibuprofen for treating pain after soft tissue injuries: Single centre double-blind, randomised controlled clinical trial. *PLoS One*. 2018;13(2):e0192043. 6. Dalton J Jr, Schweinle J. Randomized controlled noninferiority trial to compare extended release acetaminophen and ibuprofen for the treatment of ankle sprains. *Ann EmergMed*. 2006;48(5)-615-23. 7. Craig M, Jeavons R, Probert J, et al. Randomised comparison of intravenous paracetamol and intravenous morphine for acute traumatic limb pain in the emergency department. *Emerg Med J*. 2012;29(1)-37-9. 8. Tylex® 750, Información Para Prescribir Amplia. 9. Toussaint K, Yang X, Zielinski M, et al. What do we (not) know about how paracetamol (acetaminophen) works. *J Clin Pharm Ther*. 2010 35(6)-617-38. 10. Leopoldino A, Machado G, Ferreira P, et al. Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2019;2(2):CD013273. 11. Farré M, Abanades S, Álvarez Y, et al. Paracetamol. *Dolor*. 2004;19-5-15. 12. Drake R. Grey Anatomía para Estudiantes. 3ra Ed. Elsevier. 13. Clínica de Navarra: <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/hernia-discal-lumbar>.

Tylex® 750 tableta, 2019. Reg. No. 307M93 SSA IV.

*Mercado de prescripciones de paracetamol CLOSE UP 2024.

Aviso de publicidad: 2521052002C00032

Tylex® 750
Paracetamol