





Amniotic Membrane Rupture

Rupture de la membran  amniotique




Allaitement



1. Positionnement —
Ventre contre ventre,
mamelon contre le nez



**2. Réflexe des points
cardinaux —**
Bouche grande
ouverte




3. Mise au sein —
Amener le bébé au
sein en pointant son
menton vers l'avant



4. Prise du sein —
Le mamelon et une partie du
sein sont dans la bouche du bébé

Epidural & Spinal Anesthesia

Anesthésie péridurale et rachidienne



External Monitoring

Surveillance externe

Contraction Monitor

Capteur de contractions

Fetal Heart Rate Monitor


Capteur de rythme
cardiaque foetal

Fetal Heart Rate (FHR)

Rythme cardiaque
foetal (RCF)


Uterine Activity

Activité utérine












Internal Monitoring

Surveillance interne



Étapes du travail

Première étape : Travail	Phase précoce (de latence)	 Peut durer 12 heures ou plus	 30-60 secondes 5-20 minutes	 0-6 cm	
	Phase active	 Peut durer 6 heures ou plus	 45-60 secondes 2-4 minutes	 6-8 cm	
	Phase de transition	 Peut durer quelques minutes ou quelques heures	 60-90 secondes 2-3 minutes	 8-10 cm	
	Deuxième étape : Accouchement	 Peut durer plusieurs heures	 45-90 secondes 3-5 minutes	 10 cm - accouchement	
Troisième étape : Expulsion du placenta		 5-20 minutes après l'accouchement			

Outils utilisés dans le travail

