

VERDACHT AUF SHOX-DEFIZIENZ BEI KINDERN MIT KLEINWUCHS?

Schritt-für-Schritt Anleitung:
Berechnung des Quotienten aus Sitzhöhe zu Körperhöhe¹

1. SITZHÖHE MESSEN*



2. KÖRPERHÖHE MESSEN



3. QUOTIENT BERECHNEN

Berechnen Sie den Quotienten Sitzhöhe/ Körperhöhe

: =
Sitzhöhe (cm) Körperhöhe (cm) Quotient



Ist der berechnete Wert größer als der jeweils angegebene +2 SDS-Wert in der Tabelle**, ist eine Überweisung zu einem pädiatrischen Endokrinologen empfehlenswert, um den Verdacht auf einen SHOX-Gendefekt zu verifizieren.

+2 SDS Jungen	Alter in Jahren	+2 SDS Mädchen
0,687	1	0,689
0,640	2	0,639
0,605	3	0,603
0,587	4	0,587
0,576	5	0,577
0,570	6	0,571
0,564	7	0,564
0,558	8	0,558
0,551	9	0,552
0,544	10	0,549
0,539	11	0,545
0,536	12	0,541
0,532	13	0,541
0,532	14	0,544
0,534	15	0,548
0,537	16	0,550
0,538	17	0,550
0,541	18	0,550

Name:

Lilly