

 никоретте®



Гид по отказу от курения

Всё о курении
и способах борьбы
с табачной зависимостью



Содержание

1	Готовимся к отказу	3
2	Никоретте® Никотин-заместительная терапия (НЗТ)	23
3	Отказ от стиков и схема подбора	31
4	Во время отказа	36
5	Источники	41





Готовимся к отказу

- Бросаем курить — мифы
- Преимущества отказа от курения
- Советы, как бросить курить. Подготовка
- Почему бросить курить сложно?
- Как формируется зависимость

Мы вами гордимся!

Многие только мечтают когда-нибудь бросить курить, а вы перешли от слов к действию и уже сделали шаг к жизни, свободной от сигарет или стиков для систем нагревания табака!

Может быть действительно сложно. Но мы можем помочь.

И прежде чем начать, давайте развеем мифы, которые часто мешают или пугают при отказе от курения.

Бросаем курить – мифы

МИФ 1

Я так долго курил, что вред организму уже нанесён

Отказ от курения в любом возрасте приносит пользу для здоровья, а польза начинается с 1-го дня без сигарет или стиков.

Уже через 8 часов после отказа от курения нормализуется уровень кислорода в организме.

Через 1 год риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается примерно вдвое.

А спустя 15 лет риск ишемической болезни сердца становится практически таким же, как у человека, который никогда не курил¹.



Бросаем курить – мифы

Миф 2



Мне не следует бросать курить, потому что я поправлюсь

Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы немного поправиться, когда вы бросаете курить, но отказ от курения — одно из лучших решений, которые вы можете сделать для своего здоровья.

Курение подавляет аппетит и снижает чувство голода^{2, 3}. Однако есть помощники в отказе от курения, например никотин-заместительная терапия (НЗТ, о которой мы поговорим дальше), которая помогает снижать тягу к курению и облегчать различные проявления синдрома отмены, в том числе повышенный аппетит^{2, 3, 21}.

Бросаем курить – мифы

Миф 3



Это заставит меня больше нервничать

Снижение стресса, которое вы можете почувствовать, когда вы выкуриваете очередную сигарету или стик системы нагревания табака, носит краткосрочный характер⁴.



Бросаем курить – мифы


Миф 4

**Бросить курить
только с помощью
силы воли — самый
эффективный способ**

На самом деле лишь 3–5% из тех, кто бросает курить только при помощи силы воли, могут продержаться без курения в течение 6–12 месяцев⁵.

Это происходит потому, что бросить курить действительно очень сложно. Поэтому обратиться за дополнительной поддержкой — совершенно нормально!

Преимущества отказа от курения



Безусловно, от курения страдают не только лёгкие, но и весь организм. И если вы бросите курить, то положительный эффект отказа от курения на ваш организм проявится уже через восемь часов.

Что происходит с организмом, когда бросаешь курить?



8 часов

Нормализация уровня кислорода

Уровень никотина и угарного газа в крови снижается более чем вдвое, а уровень кислорода возвращается к норме^{1,6}.



48 часов

Более чистые лёгкие

В организме почти не осталось угарного газа. Лёгкие могут начать очищаться от слизи. Способность различать вкусы и запахи начинает улучшаться^{1,6}.



72 часа

Больше энергии

Если вы заметили, что вам стало легче дышать, это значит, что спазм бронхов начинает уменьшаться. Кроме того, вы начнете ощущать прилив энергии^{1,6}.

Что происходит с организмом, когда бросаешь курить?



1 год

Более здоровое сердце

Повышенный риск ишемической болезни сердца снижается примерно вдвое по сравнению с людьми, продолжающими курить^{1, 6}.



5-15 лет

Снижение риска инсульта

Через 5-15 лет после отказа от курения риск инсульта снижается до уровня риска у некурящего человека^{1, 6}.



10-15 лет

Снижение риска для лёгких и сердца

Риск рака лёгких снижается примерно вдвое по сравнению с людьми, продолжающими курить. Риск ишемической болезни сердца снижается практически до уровня такого риска у человека, который никогда не курил^{1, 6}.

Что происходит с организмом, когда бросаешь курить?

У вас станет больше энергии, времени, чтобы провести его с близкими, и вы даже сможете экономить, ведь на покупку сигарет с каждым годом тратится всё больше денег. **Тут вы можете посчитать, сколько вы сможете сэкономить, если бросите курить.**



**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.**

Советы, как бросить курить⁷. Подготовка



Как вы уже поняли, курение — это зависимость, и избавиться от нее может быть крайне сложно. Как минимум нужно настроиться и подготовиться к этому, чтобы минимизировать риски срыва.

Советы, как бросить курить?.

Подготовка



Установите дату и составьте план отказа от курения. Дата должна быть в обозримом будущем. Например, через 7–10 или 21 день. Объявите, что вы хотите бросить курить или позовите кого-то сделать это вместе. **В день отказа от курения скажите себе «стоп» — больше ни одной затяжки.**



Выберите метод медикаментозной поддержки. Можно посоветоваться с врачом, например, с психологом. Поговорите с семьей, чтобы близкие понимали ваше состояние и помогли пережить синдром отмены.



Ставьте реальные цели. Пусть это будет 1 неделя или месяц без курения, или год. Важно, чтобы вы могли ее достичь и идти дальше.



Избавьтесь от всего, что может напомнить о курении: сигареты и пустые пачки от них, пепельницы, зажигалки и другие вещи. **Попросите семью и друзей, которые курят, не делать этого рядом с вами** и не оставлять сигареты или стики на видном месте.



Вспомните, что раньше вам помогало при попытках бросить курить, а что нет.

**Советы, как
бросить курить?⁷
Подготовка**

Советы, как бросить курить⁷. Подготовка



Возможно, вам пригодятся **заменители сигареты или стика**, которые вы привыкли держать во рту: жвачка без сахара, морковные палочки, зубочистки и т.д.



Постарайтесь **избегать ситуаций**, которые обычно провоцировали вас на курение. **Найдите новый способ снимать стресс и расслабляться:** массаж, сауна, новый фильм в приятной компании.



Отвлеките себя другими занятиями: прогулка, хобби, особенно такие, которые плохо совмещаются с вредной привычкой (например, плавание).



Внесите изменения в привычный распорядок дня: поменяйте маршрут на работу, выпейте чай вместо кофе, съешьте на завтрак не яичницу, а творог.



Пейте больше воды. Когда хочется закурить, можно пить маленькими глотками, задерживая дыхание.

**Советы, как
бросить курить?
Подготовка**

Советы, как бросить курить⁷. Подготовка



Попробуйте технику глубокого дыхания, когда почувствуете острое желание покурить: вдыхайте медленно через нос, выдыхайте через рот, представляя, как легкие наполняются чистым воздухом.



Расскажите и отпразднуйте свою свободу от никотина, когда цель будет достигнута.

Почему бросить курить сложно?


Многие ошибочно думают, что курение это всего лишь вредная привычка, хотя на самом деле — это зависимость (код МКБ: F17).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет масштаб распространения табачной зависимости как **Глобальную табачную эпидемию**.

Сигареты вызывают бо́льшую зависимость, чем может казаться




Героин




Кокаин




Алкоголь



Антипсихотики
Антидепрессанты



Каннабиноиды



Анальгетики



Табак

Вероятность развития зависимости после употребления вещества хотя бы 1 раз^{8, 9}.

При этом бросить курить может быть сложнее, чем отказаться от героина или опиатов

Анализ 28 различных исследований с участием людей, пытавшихся избавиться от зависимости от различных веществ: исследователи сосредоточились на испытуемых, которые **не получали никаких лекарств**, которые могли бы помочь им преодолеть зависимость (некоторые проходили поведенческую терапию).

Смогли отказаться



40%

От опиоидов,
таких как героин



18%

От алкоголя



8%

Смогли бро-
сить курить²⁴


Как формируется зависимость?



Проникновение никотина
в лёгкие и кровеносные
сосуды




Попадание никотина
в головной мозг



Никотин

Воздействие никотина
на соответствующие
рецепторы



Дофамин

Выброс дофамина —
гормона удовольствия

При курении никотин воздействует на соответствующие рецепторы в головном мозге и приводит к выбросу дофамина — «гормона удовольствия». Из-за регулярного воздействия никотина число рецепторов растёт, а значит, растёт и потребность в их постоянной подпитке никотином¹⁰.

Симптомы синдрома отмены



Тяга к курению



Подавленность



Беспокойство



Тревожность



Раздражительность



Трудности
с концентрацией



И другие...

Если человек не получает никотин, то он испытывает мучительные симптомы синдрома отмены:

При каждой затяжке в кровоток крайне быстро поступает высокая концентрация никотина. Когда сигарета или стик выкурены, его уровень падает так же резко, а рецепторы требуют продолжения подачи никотина.

Как раз из-за симптомов отмены очень сложно бросить курить. Чтобы облегчить синдром отмены, была разработана никотин-заместительная терапия (НЗТ).

Для определения своей зависимости вы можете пройти тест Фагерстрема, отсканировав QR-код

Позволяет оценить степень никотиновой зависимости у курящих людей. Тест состоит из 6 простых вопросов. Чем выше итоговый балл, тем сильнее выражена зависимость от никотина.





Никотин- заместительная терапия (НЗТ)


- Что такое никотин-заместительная терапия?
- Мифы о никотин-заместительной терапии
- Вы выбрали Никоретте® НЗТ. С чего начать и какую лекарственную форму подобрать?



Что такое Никотин-заместительная терапия?

Никотин-заместительная терапия (НЗТ) — **одна из самых изученных терапий** табачной зависимости в мире¹¹ — это безрецептурный метод лечения табачной зависимости¹².



НЗТ входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ, 24.5.2. Лекарственные средства при нарушениях, вызванных употреблением никотина¹³.



Как работает НЗТ

НЗТ доставляет **терапевтическую** дозу никотина в головной мозг. Никотина поступает ровно столько, чтобы хватило на смягчение синдрома отмены, но этого недостаточно для поддержания устойчивой зависимости.

При использовании НЗТ не происходит резкого выброса дофамина — гормона удовольствия, за счет чего НЗТ не поддерживает зависимость, а помогает бороться с ней.





Никоретте® НЗТ — что известно в мире с точки зрения доказательной медицины


НЗТ входит в перечень основных лекарственных средств ВОЗ, 24.5.2. Лекарственные средства при нарушениях, вызванных употреблением никотина¹³.


Никоретте® НЗТ входит в Клинические рекомендации РФ.

«Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых МКБ 10: F17.2, F17.3» Уровень убедительности рекомендаций **A** (уровень достоверности доказательств — 1a)²⁵.

Клинические подтвержденные данные об эффективности и безопасности никотин-заместительной терапии как метода борьбы с табачной зависимостью.

Одна из самых изученных терапий табачной зависимости в мире, эффективность и безопасность которой достоверно изучены в более **150 клинических исследованиях** на протяжении **более 40 лет** с вовлечением более **50 000 пациентов**¹¹.





Никоретте® НЗТ — что известно в мире с точки зрения доказательной медицины

Никоретте® НЗТ входит в рекомендации Европейской сети по профилактике курения табака (ENSP²⁶) по лечению табачной зависимости.

Всестороннее руководство для осуществления мероприятий и стратегии по лечению табачной зависимости¹⁰



При никотиновой зависимости высокой и очень высокой степени (тест Фагерстрема более 8 баллов), что более характерно для синдрома отмены табака, **строго рекомендуется** назначение комбинации **поведенческой** и **фармакологической** терапии^{27, 28}



Рекомендуется **применение фармакологической терапии** для пациентов со степенью никотиновой **зависимости более 6 баллов** по тесту Фагерстрема^{27, 28}



Лечение является **действенным**, если оно обеспечивает **период воздержания** от потребления табачных продуктов в течение **не менее 6 месяцев**^{27, 28}

Мифы об НЗТ

Существует и большое количество сомнений и мифов о работе НЗТ, и сейчас мы вместе их развеем.



Миф 1

никотин-заместительная терапия такая же вредная, как и курение

Отказ от курения в любом возрасте приносит пользу для здоровья, а польза начинается с 1-го дня без сигарет/стиков.

Исследования демонстрируют связь между курением и риском развития рака, проблем с сердцем и многих других заболеваний²⁹. Большинство этих побочных эффектов вызывают токсины сигаретного дыма, а не сам никотин¹⁶.



Миф 2

препараты НЗТ вызывают такое же привыкание, как и курение

Использование НЗТ не означает замену одной никотиновой зависимости на другую. Кроме того, никотин, содержащийся в продуктах НЗТ, достигает мозга гораздо медленнее, чем при курении сигареты или стиков, что делает НЗТ значительно менее вызывающим привыкание фактором^{10, 17}.

Принцип действия НЗТ построен на том, что при его применении организм человека постепенно адаптируется к уменьшающимся дозам никотина вплоть до полной отмены.

Мифы об НЗТ



Миф 3

Никотин-заместительная терапия не работает

НЗТ — самая известная терапия табачной зависимости в мире, эффективность и безопасность которой достоверно изучены в более 150 клинических исследованиях на протяжении более 40 лет с вовлечением более 50 000 пациентов¹⁷.

На самом деле, часто причина, по которой люди не могут отказаться от сигарет или стиков, заключается в том, что они либо используют НЗТ не в соответствии с инструкцией, либо подбирают неправильную лекарственную форму или дозировку¹⁸.



Миф 4

Никотин-заместительная терапия — это дорого

Некоторые считают, что использование НЗТ — слишком дорогое удовольствие, но если сравнить ее со стоимостью курения, то вы тратите совершенно разные суммы.

К тому же НЗТ — это про вклад в ваше здоровое будущее.

A photograph of three men sitting in the back of a car. The man on the left is smiling and looking towards the camera, wearing a blue and white striped shirt. The man in the middle is making a 'rock on' hand gesture, winking, and looking towards the camera, wearing a grey tank top and a straw hat. The man on the right is smiling and looking towards the camera, wearing a plaid shirt. The car's interior and windows are visible in the background.

Отказ от стиков и схема подбора

Не все курильщики курят обычные
сигареты.

Некоторые предпочитают системы
нагрева табака (стики).

Отказаться от курения стиков может быть
так же непросто, как и от сигарет.¹⁹

Что такое системы нагрева

Системы нагрева табака (СНТ) – это **электронные устройства**, при курении которых **табак нагревается** до температуры не превышающей температуру горения обычной сигареты, т.е., как правило, это ниже 600°C²⁰.

В результате образуется **аэрозоль**, который содержит **сравнимую** с традиционными сигаретами **долю никотина**²⁰.

Согласно независимой оценке отраслевых данных, **концентрация более 20 вредных** и потенциально вредных **химических веществ в СНТ значительно выше**, чем в эталонном сигаретном дыме²⁰.





Все лекарственные формы Никоретте®- имеют показания к отказу от курения стиков:




Спрей для полости рта вкус:
мятный, фруктово-мятный
дозировка: 1 мг



Жевательная резинка
вкус: свежие фрукты, свежая
мята, морозная мята
дозировки: 2 мг и 4 мг



Таблетки для рассасывания
вкус: мятные, фруктовые
дозировки: 2 мг и 4 мг




Пластырь трансдермальный
дозировки:
10 мг, 15 мг и 25 мг

Схема и дозы применения при отказе от курения стиков точно такие же, как при отказе от обычных сигарет²¹. А именно, руководствуемся схемой применения на следующей странице.

Вы выбрали Никоретте®. Как подобрать лекарственную форму²¹?


Оцените степень зависимости



Сразу или постепенно

Вы выбрали Никоретте®. Как подобрать лекарственную форму²¹?

Для пластыря трансдермального



Сразу

Комбинированная терапия

- курильщикам с сильно выраженной никотиновой зависимостью (более 20 сигарет в день)
- или испытывающих непреодолимую тягу к курению,
- или которым не удалось отказаться от курения с применением только одного вида никотин-заместительной терапии возможно применение комбинированной терапии:

пластыря 25 мг в комбинации с жевательными резинками 2 мг, спреем 1 мг или таблетками для рассасывания 2 мг.



Спрей для полости рта
1 мг

или




Жевательная резинка
2 мг

или



Таблетки для
рассасывания
2 мг

Пластырь
трансдермальный
25 мг



Дневник по отказу от курения

**Борьба с тягой к курению —
непростой путь. И мы здесь, чтобы вас
поддержать.**

Запланируйте дату, когда вы планируете полностью отказаться от сигарет или стиков. Спланируйте, как именно вы будете снижать количество выкуриваемых сигарет или стиков. Это и будет ваш персональный план. Отмечайте в ячейках ниже количество сигарет или стиков, выкуриваемых в день. Так вы сможете контролировать свой прогресс. Применяйте выбранную вами лекарственную форму строго согласно дозировкам и длительности применения, указанным в инструкции.

Если вы выбрали стратегию «отказаться сразу», то теперь главное не сдаваться и идти до конца. А мы обязательно расскажем, как сделать этот путь легче.

А если ваш выбор — постепенный отказ от сигарет, то здесь сначала нужен план.

Дневник по отказу от курения

Месяц №1

1 план контроль	2 план контроль	3 план контроль	4 план контроль	5 план контроль
6 план контроль	7 план контроль	8 план контроль	9 план контроль	10 план контроль
11 план контроль	12 план контроль	13 план контроль	14 план контроль	15 план контроль
16 план контроль	17 план контроль	18 план контроль	19 план контроль	20 план контроль
1 план контроль	1 план контроль	1 план контроль	1 план контроль	1 план контроль
1 план контроль	1 план контроль	1 план контроль	1 план контроль	1 план контроль
1 план контроль	Цель: 0 сигарет или стиков в день к _____			



Во время отказа

- Что делать, если сорвался?
- Почему отказ от курения занимает 6 месяцев и более?
- Дневник отказа

Что делать, если сорвался?

Отказ от курения — это процесс, а не единичное событие. Многие из тех, кто бросает курить, в какой-то момент срываются и выкуривают сигарету/стик или даже полностью возвращаются к привычке. Важно понимать, что срывы могут случаться, и может потребоваться несколько попыток, чтобы бросить курить навсегда. Вот почему так важно иметь план действий на случай срыва, чтобы вы могли успешно вернуться на правильный путь.

Что делать, если сорвался?



Позитивное мышление

Во время срыва важно сохранять позитивный настрой. Постарайтесь сосредоточиться на уже достигнутом прогрессе, даже если вы не достигли своей конечной цели — бросить курить. Отказаться от этой привычки навсегда довольно сложно, поэтому даже несколько минут или часов без сигареты или стика можно считать достижением.



Вы можете достичь своей цели — нужно только проявить настойчивость!

Когда вы сталкиваетесь со срывом, может быть полезно напомнить себе, почему вы вообще хотели бросить курить. Ради улучшения здоровья? Чтобы сэкономить деньги? Или ради своих близких? Какие бы ни были ваши причины, попробуйте использовать их, чтобы вернуть свою мотивацию к отказу. Также может быть полезным составить список целей, которые вы хотите достигнуть благодаря отказу.

Что делать, если сорвался?



Учитесь на своих ошибках

Каждая попытка бросить курить — это возможность получить ценный опыт и научиться. Отказ от курения требует практики и настойчивости, поэтому важно подумать о том, что вам показалось трудным и что привело к ошибке. Чтобы по-настоящему извлечь уроки из своей предыдущей попытки, попробуйте записывать свой опыт — это поможет вам лучше понять, что пошло не так, и как вы можете исправить это в следующий раз. Подумайте о ситуациях, в которых вы, скорее всего, столкнетесь с искушением, и постарайтесь избегать их хотя бы на время, пока вы в самом начале пути к отказу. Например, попробуйте избегать места, где можно легко попросить у кого-нибудь сигарету.

Что делать, если сорвался?



Составить план

Риск сорваться обычно выше в течение первых нескольких недель. Вот почему полезно составить план, который поможет избежать триггеров и получить необходимую поддержку. Поскольку общение с другими курильщиками является наиболее частой причиной срыва, полезно подумать о том, как можно избежать таких ситуаций, особенно в первые несколько недель. Точно так же важно подумать о том, как избежать других распространенных триггеров, таких как стресс, алкоголь и события, связанные с выбросом большого количества эмоций.

Хотя избежать всех триггеров сложно, вы, безусловно, можете контролировать их и по возможности избегать.

Также стоит помнить о дополнительной поддержке, которая может понадобиться вам в следующей попытке. Например, вы можете заручиться поддержкой Никоретте® и проконсультироваться со специалистом.

Почему отказ от курения занимает 6 месяцев и более

За это время количество никотиновых рецепторов уменьшается, возвращаясь к норме²².

Клинические рекомендации РФ

Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых МКБ 10: F17.2, F17.3.

Курильщики имеют гораздо больше никотиновых рецепторов, чем некурящие, что объясняет высокую толерантность к никотину у курильщиков, а также их сильную никотиновую зависимость.

Этих рецепторов так много, что они могут быть выделены с помощью позитронно-эмиссионной томографии: центр никотиновой зависимости, который делает более светлыми область *nucleus accumbens* и область *anterior tegmental*, где никотиновые рецепторы в основном и располагаются в головном мозге.

Тем не менее эти клетки сохраняют память о курении, и, при возобновлении курения, их количество на клеточной мембране может уменьшиться очень быстро.


Ссылки и источники

1. Национальная служба здравоохранения Великобритании: <https://www.nhs.uk/smokefree/why-quit/what-happens-when-you-quit>
2. Стеад и соавт. 2012. Никотин-заместительная терапия для отказа от курения (Обзор). Библиотека Кохрейна.
3. Согласно инструкции по применению Никоретте® Жевательная резинка «Морозная мята».
4. <https://bagenamed.by/poleznaja-informacija/kurenje-posle-stressa/>
5. По данным клинических исследований John R. Hughes, Josue Keely & Shelly Naud. Форма кривой рецидива и долгосрочной абстиненции среди не получавших лечение курильщиков. 2004 Society for the Study of Addiction.
6. ДОКЛАД ВОЗ О ГЛОБАЛЬНОЙ ТАБАЧНОЙ ЭПИДЕМИИ, 2021 г. Решение проблемы новых и появляющихся изделий.
7. Электронный ресурс: <https://www.nicorette.ru/kak-brosit-kurit/soveti> (Дата последнего доступа 11.08.2023).
8. Stahl's Essential Psychopharmacology, 3rd ed.2008.
9. <https://www.csam-smca.org/wp-content/uploads/2014/11/A-Pipe-An-Evolving-Perspective-on-Smoking-Cessation-Therapies.pdf>.
10. Рекомендации ENSP (European Network for Smoking and Tobacco Prevention aisbl) по лечению табачной зависимости// 2016 год. https://ensp.network/wp-content/uploads/2021/01/Russian_Guidelines_2016.pdf
11. Хартманн-Бойс Дж. с соавт. Никотин-заместительная терапия в сравнении с контролем в отказе от курения. Кокрановская база данных систематических обзоров 2018, Issue 5, Art. No.: CD000146. (<https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000146.pub5/pdf/full>).
12. Антонов Н. С., Сахарова Г. М. Эффективность применения безрецептурных препаратов для лечения табачной зависимости: обзор литературы. РМЖ. 2016; 24 (12): 804-810.).

13. Model List of Essential Medicines 24.5.2. Medicines for nicotine use disorders eEML - Electronic Essential Medicines List (essentialmeds.org)
14. https://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_russian.pdf?ua=1
15. 21-й Перечень ВОЗ основных лекарственных средств (электронная версия), ВОЗ, 2020 <https://list.essentialmeds.org/>
16. Национальная служба здравоохранения Великобритании: <https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/stop-smoking-aids/#nicotine-replacement-therapies-nrts>
17. Согласно инструкции по применению Никоретте® Спрей для полости рта.
18. <https://www.nicorette.ru/vred-kureniya/mify-o-nikotine-i-nzt>
19. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0761842518303632?via%3Dihub>
20. Heated tobacco products: information sheet – 2nd edition. Доклад ВОЗ. Электронный ресурс <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-2020.2> (дата доступа от 10.07.2023)
21. Согласно инструкциям по применению лекарственных форм Никоретте®.
22. <https://psychiatr.ru/download/1454?view=1&name=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf>
23. Дата размещения 24.12.2024 https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/601_2
24. Stahl's Essential Psychopharmacology, 3rd ed.2008. 2<https://www.csam-smca.org/wp-content/uploads/2014/11/A-Pipe-An-Evolving-Perspective-on-Smoking-Cessation-Therapies.pdf>
25. Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака (никотина). Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/601_2

26. European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Европейская сеть по профилактике курения и табака
27. Источники: <https://psychiatr.ru/download/1454?view=1&name=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf>; <http://gbuzrkkrnd.ru/f/000897.pdf> Клинические рекомендации: «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака (никотина). Синдром зависимости от табака, синдром отмены табака у взрослых.» Дата размещения 24.12.2024
28. Источники: <https://psychiatr.ru/download/1454?view=1&name=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf>; <http://gbuzrkkrnd.ru/f/000897.pdf>
29. P Boyle. Lung Cancer 1997; 17: 1-60 2) Y Çolak, et al. Amer J Resp Crit Care Med 2015; 192: :172 - 181

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ИНСТРУКЦИЕЙ**



 никоретте®



Никоретте®
Бросить курить - реально