

ÉRYTHÈME FESSIER 101

ÇA ARRIVE : LES BÉBÉS DÉVELOPPENT DE L'ÉRYTHÈME FESSIER

L'érythème fessier est le **problème de peau le plus courant** chez les bébés et les jeunes enfants.



PLUS DE LA MOITIÉ

des bébés âgés de 4 à 15 mois développeront au moins un érythème fessier au cours d'une période de 2 mois.



PRESQUE TOUS

les bébés développeront un érythème fessier avant d'avoir appris la propreté.



À QUEL
MOMENT
CONTACTER
LE MÉDECIN

Les cas légers guérissent d'eux-mêmes après 3 ou 4 jours de traitement.

Si l'érythème est grave, ou s'il ne diminue pas, contactez le cabinet de votre médecin.

Symptômes

Peau légèrement rouge, irritée à l'intérieur de la zone couverte par la couche

Plaies vives, ouvertes ou qui saignent à l'intérieur de la zone couverte par la couche

LÉGER

GRAVE

Causes

- 1 Irritants dans les selles et l'urine
- 2 Changements dans le pH de la peau
- 3 Peau humide
- 4 Friction de la couche sur la peau humide

Il se produit le plus souvent lorsque :

- le bébé a une diarrhée
- il mange de nouveaux aliments ou des aliments solides
- il prend des antibiotiques

6

ÉTAPES POUR TRAITER L'ÉRYTHÈME FESSIER ET PROTÉGER LA PEAU



Garder la peau propre et asséchée




Changer la couche fréquemment



Exposer souvent la peau à l'air libre



Appliquer une généreuse couche de crème contre l'érythème fessier



Nettoyer doucement la peau avec des lingettes pour bébés



Utiliser des couches jetables super absorbantes

Le saviez-vous?

Depuis que les couches jetables ont fait leur apparition dans les années 1960, elles ont aidé à réduire de moitié les cas d'érythème fessier grâce à leur innovation et aux améliorations qui leur ont été apportées.



Pampers

Pour de plus amples renseignements, visitez le :
www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/When-Diaper-Rash-Strikes.aspx