

Należy mieć tę informację przy sobie i pokazywać ją innym pracownikom służby zdrowia zaangażowanym w opiekę medyczną i leczenie pacjenta.

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko lekarza

(który przepisał lek Olumiant)

Numer telefonu do lekarza

Informacja dla pacjentów o leku OLUMIANT® (barycynib)

Ten dokument zawiera ważne informacje dla pacjenta przed terapią lekiem Olumiant i w czasie jej trwania.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa
tel: +48 22 440 33 00, faks: +48 22 440 35 53
www.lilly.pl

The Lilly logo is written in a white, elegant, cursive script font against a red background.

Ciąża

- Nie stosować leku Olumiant jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.
- Należy stosować skuteczne metody antykoncepcji w czasie przyjmowania leku Olumiant (oraz przez 1 tydzień po zakończeniu leczenia).
- Należy natychmiast poinformować lekarza o zajściu w ciążę (lub o chęci zajścia w ciążę).

Zakażenia

Stosowanie leku Olumiant może nasilić objawy trwającego zakażenia lub zwiększyć ryzyko wystąpienia nowego zakażenia lub zwiększyć ryzyko reaktywacji wirusa. U pacjentów z cukrzycą lub w wieku powyżej 65 lat prawdopodobieństwo zakażenia może być zwiększone. Nielezione zakażenie może stać się ciężkie. Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu objawów zakażenia, takich jak:

- Gorączka, rany, uczucie większego zmęczenia niż zazwyczaj lub problemy z użębieniem
- Nieustępujący kaszel, nocne poty, zmniejszenie masy ciała. Mogą to być objawy gruźlicy (zakaźnej choroby płuc)
- Bolesna wysypka skórna z pęcherzami. Może to być objaw zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca

Nieczerniakowy rak skóry

U pacjentów przyjmujących lek Olumiant odnotowano przypadki nieczerniakowego raka skóry. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pojawią się nowe zmiany skórne w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu, albo jeśli zmieni się wygląd istniejących zmian.

Zakrzepy krwi

Olumiant może powodować schorzenie, które prowadzi do powstania zakrzepu krwi w nodze i jego przemieszczenie do płuc. Należy natychmiast powiadomić lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

- obrzęk lub ból nogi lub ręki
- wzrost temperatury i zaczerwienienie nogi lub ręki
- niespodziewana duszność,
- przyspieszony oddech,
- ból w klatce piersiowej.

Zawał serca lub udar mózgu

Należy natychmiast powiadomić lekarza w razie wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

- silny ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (który może promieniować do ramion, żuchwy, szyi, pleców)
- duszność
- zimne poty
- osłabienie ręki i (lub) nogi po jednej stronie
- niewyraźna mowa