



OSMO

KALKCYANAMIDE

EIGENSCHAPPEN

OSMO KALKCYANAMIDE is breed inzetbaar in de tuin: zowel bij aanleg als onderhoud van gazons, als in de moestuin en de siertuin.

De voordelen van deze meststof zijn al tientallen jaren bekend en gewaardeerd.

OSMO Kalkcyanamide komt langzaam vrij waardoor je een langdurige groei bekommt.

OSMO Kalkcyanamide zorgt voor een minder zure bodem (bekalkingseffect).

OSMO Kalkcyanamide zorgt in uw moestuin voor een verhoging van het calciumgehalte in de bodem waardoor je sterkere planten bekommt. De ge oogste vruchten zijn ook beter en langer bewaarbaar. Bovendien is deze meststof geformuleerd in een fijne korrel die zich gelijkmatig laat uitstrooien.

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking voor de juiste dosis en toepassingswijze voor het meest optimale resultaat.

GEbruik

J F M A M J J A S O N D

WWW.OSMO.BE/KALKCYANAMIDE

Door 2 keer de halve dosis uit te strooien, bekom je een gelijkmatiger verdeling en resultaat. Strooien tijdens de eerste keer in lengterichting en tijdens de tweede keer in breedterichting is ideaal.

Bij aanleg gazon

1 week vóór het inzaaien 40 gr/m² inwerken in de bovenste laag van een vochtige grond. Het hoge gehalte aan calcium in de kalkstikstof zorgt voor een luchtige structuur van de bovenste grondlaag en vergemakkelijkt op die wijze de kieming en inworteling van het gras. De langwerkende stikstof zorgt voor een vlotte groei van het nieuw ingezaaide gazon gedurende meerdere weken.

Bij bestaande gazons (min. 1 jaar oud)

Strooi steeds op DROOG gras om te vermijden dat de korrels aan de blaadjes blijven kleven. Strooi in het voorjaar en met een toestel dat een nauwkeurige dosering garandeert. Strooi eerst 20 g/m² en twee weken later nogmaals 20 g/m². Kale plekken kan men 2 weken na de laatste (tweede) strooibeurt herinzaaien.

In moes- en siertuin

- Als bemesting
- Strooi 2-3 weken vóór het zaaien of planten en werk
- oppervlakkig in in de bodem
- Ten vroegste 2 weken na het planten een extra dosis tussen de planten strooien. Strooi steeds wanneer het gewas DROOG is zodat de korrels niet aan de bladeren



TIPS

Neem bij het gebruik van Osmo Kalkcyanamide zeker de volgende tips in acht :

- **Respecteer de wachttijden en de hoeveelheden**
Bij het gebruik van deze meststof geldt dat “te vaak” en “te veel” leidt tot verbranding van de gewassen. Volg daarom de algemene dosering op deze verpakking of volg het schema per teelt op de website www.osmo.be/kalkcyanamide
- **Droge gewassen**
Strooi de korrels tussen de gewassen wanneer die goed droog zijn, zodat de korrels niet aan het blad blijven kleven.
- **Vochtige bodem**
De werking van de korrels kalkstikstof wordt in gang gezet door vocht. Wil je dus het effect van deze meststof onmiddellijk lanceren, dan kan je best na het strooien bij droge omstandigheden de bodem besproeien. Ook wanneer er na het strooien een langere droge periode aanbreekt, is besproeien aan te raden
- **Strooi niet bij sterke wind en in volle zon**
- **Handschoenen**
Draag tijdens het verwerken of strooien altijd handschoenen en eventueel een masker. Niet gebruiken in gesloten ruimtes zoals serres.
- **Huisdieren**
Na behandeling wachten tot het regent vooraleer huisdieren op het gazon te laten lopen.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

GEWAARBORGDE SAMENSTELLING EG MESTSTOF.

Stikstofmeststof. Nitraathoudende kalkstikstof.

Bevat 19,8% stikstof (N) totaal waarvan 1,8% nitraatstikstof.

Granulaat (GR) om te strooien

FIJNE KORREL