

**MILBEMAXTAB™ COMPRIMES PELLICULES POUR CHATS,
MILBEMAXTAB™ COMPRIMES PELLICULES POUR PETITS CHATS ET CHATONS,
MILBEMAXTAB™ COMPRIMES POUR CHIENS,
MILBEMAXTAB™ COMPRIMES POUR PETITS CHIENS ET CHIOTS.**

Médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre professionnel de santé animale. Lire attentivement la notice. En cas de persistance des symptômes, veuillez consulter un vétérinaire.

Espèces cibles : Chats et chiens. **Indications :** Chez le chat : Traitement des infestations mixtes par les stades immatures et adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus multilocularis*. Nématodes : *Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*. Prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. Chez le chien : Traitement des infestations mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus* spp, *Mesocestoides* spp. Nématodes : *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis* (réduction de l'infestation), *Angiostrongylus vasorum* (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes), *Thelazia callipaeda*. Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. **Contre-indications :** MILBEMAXTAB comprimés pelliculés pour chats : ne pas utiliser chez les chats de moins de 2 kg. MILBEMAXTAB comprimés pelliculés pour petits chats et chatons : ne pas utiliser chez les chats de moins de 6 semaines et/ou de moins de 0,5 kg. MILBEMAXTAB comprimés pour chiens : Ne pas utiliser chez les chiens pesant moins de 5 kg. MILBEMAXTAB comprimés pour petits chiens et chiots : Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 semaines et/ou pesant moins de 0,5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Précautions particulières d'emploi :** Se laver les mains après usage. En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l'avis d'un médecin et lui montrer la boîte et/ou la notice.

MILBEMAX™ CHEW COMPRIMES A CROQUER POUR CHIENS

Médicament vétérinaire. Demandez conseil à votre professionnel de santé animale. Lire attentivement la notice. En cas de persistance des symptômes, veuillez consulter un vétérinaire.

Indications : Chez les chiens : Traitement des infestations mixtes par les stades adultes des cestodes et des nématodes sensibles au praziquantel et à la milbémycine oxime suivants : Cestodes : *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp, *Echinococcus* spp, *Mesocestoides* spp. Nématodes : *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis*, *Angiostrongylus vasorum* (réduction de l'infestation par les stades parasitaires adultes immatures (L5) et adultes), *Thelazia callipaeda*. Le médicament peut être intégré ponctuellement dans un programme de prévention de la dirofilariose (*Dirofilaria immitis*), si un traitement concomitant contre des cestodes est indiqué. **Contre-indications :** Ne pas utiliser chez les chiens

pesant moins de 5 kg. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. **Précautions particulières d'emploi** : Se laver les mains après usage. Eviter le contact avec le médicament vétérinaire en cas d'hypersensibilité connue à l'un des constituants. En cas d'ingestion accidentelle de comprimés, en particulier par un enfant, prendre l'avis d'un médecin immédiatement et lui montrer la boîte et/ou la notice. L'Echinococcose présente un risque potentiel pour l'homme. En cas d'Echinococcose, les protocoles spécifiques en termes de traitement, de suivi et de sécurité des personnes doivent être suivis. Consulter un expert ou un centre de parasitologie.

FRCAHMIL00157i - janvier 2019