PermaFlo™ DC
الراتنج الترميمي/الراتنج الترميمي المركب ثنائي المعالجة

وصف المنتج

تم تصميم الراتنج الترميمي/الترميمي المركب PermaFlo™ DC بالاشتراك مع Peak™ Universal Bond لتوفير الطبقة الكيميائية الراتنج الترميمي من نوع الإيبوكسي والأكريلات المعدلة الثنائية التي تعمل على تحسين الالتصاق بالأسنان. يمنح استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية. يمكن استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية. يمكن استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية. يمكن استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية.

مواد الاستعمال/الغرض المقصود

تم تصميم الراتنج الترميمي/الترميمي المركب PermaFlo™ DC بالاشتراك مع Peak™ Universal Bond لتوفير الطبقة الكيميائية الراتنج الترميمي من نوع الإيبوكسي والأكريلات المعدلة الثنائية التي تعمل على تحسين الالتصاق بالأسنان. يمنح استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية. يمكن استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية. يمكن استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية. يمكن استخدام الترميمات المركبة كطبقة أولية الشركة المصنعة للأسنان وحدة أساسية قوية.

مواد الاستعمال

- بالنسبة للمرضى أو المستخدمين الذين يعانون من الحساسية. يرجى الرجوع إلى: ممنسة حساسات الحساسية الخاص بالمنتج: www.ultradent.com/p/perma-flow-dc
- يجب استخدام هذا المنتج وفقًا لدليل تعليمات الشركة المصنعة. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات.

التحذيرات والاحتياطات

- يمكن أن تكون الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة أكثر حساسية. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان.

موانع الاستعمال

- الحساسية المفرطة أو المستخدمين الذين يظهرون عن الحساسية. يرجى الرجوع إلى: ممنسة حساسات الحساسية الخاص بالمنتج: www.ultradent.com/p/perma-flow-dc
- يجب استخدام هذا المنتج وفقًا لدليل تعليمات الشركة المصنعة. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات. اتصل بالشركة المصنعة إذا كنت تفتقر إلى تعليمات.

التحذيرات والاحتياطات

- يمكن أن تكون الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة أكثر حساسية. تجنب التلامس المستمر للأنسجة اللينة. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان. يمكن أن تؤدي الأسنان المعالجة بالراتنج الأسنان غير الحساسة إلى تلف الأسنان.
- تجنب التلامس المستمر للأنسجة اللينة. تجنب التلامس المستمر للأنسجة اللينة. تجنب التلامس المستمر للأنسجة اللينة. تجنب التلامس المستمر للأنسجة اللينة

PermaFlo™ DC
Kettős kötésű kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta

Termékleírás
A PermaFlo™ DC kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta a PermaFlo™ univerzális kötéssel együtt úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a ragasztógyanta kémiai polimerizációját az indirekt fogpótlások és endodontiai csapok alatt.
akár hozzáfér a fény, akár nem. Ez az egy fényrendszerhez adó (radio-opaque) kompozit ragasztócement/helyreállító gyanta, amely fényre kötő tulajdonságának köszönhetően alkalmas áttetsző fogpótlásokhoz, azaz onlay-hez, inlay-hez és porcelán korongokhoz. Használható kövezhető fogpótlásokhoz, mint kindulási réteg hálós ragasztott kompozitokhoz és maganyagként a korona gyártása előtt.

Ellenjavallatok
- Az allergiával kszült betegek vagy felhasználók esetében tekintse meg a termékalkatrészek vonatkozó dokumentumait, amelyek az utrabent.com oldalon vagy a szállítón keresztül hozzáférhetők tapasztal, az érintett területet alaposan dörzsölje le vízzel, és kérje meg a beteget, hogy forduljon orvoshoz

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantak érzékenysége okozhatnak. Kerülje el a meg nem kötött fogyasztó anyagok érintését a bőrrel. Ne használja olyan betegeknél, akik ismerten érzékenyek az akrilátokra vagy más gyantára. Ha allergiás reakció, bőrgyulladás vagy bőrkitörés lép fel, forduljon orvoshoz. A termék lenyelése esetén igyon bőséges vizet, és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A betegeknek és a fogorvosoknak oldalvédővel ellátott védőszemüveget kell viselniük
- Csak a szakember fogorvos használja
- A hegyek csak egyszer használatosak
- Az előmosés ellenőrzése érdekében minden használat között távolítsa el a hegyet, és zárja vissza a Luer Lock kupakot
- A helyreállító eljárások során irányítsa a kezelőfényt, hogy elkerülje a korai polimerizációt
- A fényaktivált kétkomponensű gyanta a kényszerű fénytől. A Luer Lock fecskendő kupakját használat után vissza kell cserélni a mini kvárcüveg megelőzése érdekében. Fedje le a fecskendő hegyét gézzel, ha hosszú ideig kitnyezett fénynek van kitéve.
- Biztosítson megfelelő szigetelést
- A gyantákat hűtőben kell tárolni a hosszú távú eltarthatóság érdekében.

Lépésenkénti utasítások
Előkészítés – Közvetett ragasztási technika
1. Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, sztnét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. Ha az ellenőrláltat észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
2. Tisztítsa meg a felületeket, ahol be kíván szálítani egy Ultra-Etch® Scrub a STARbrush™ interkonnektív kefével tisztítja, fertőtlenítő és eltávolítja a maradék cementet).
3. Ellenőrizze a protézis illeszkedését.
4. Készítse elő a protézis belső felületét.

Fém alapú:
1. Mikroszcsiszolnál vagy homokfúvással tisztítsa meg a fogpótlás belső felületét.
2. Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, sztnét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. Ha az ellenőrláltat észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
3. Vigyen fel fogszívókat (például Ultra-Etch® maratószert) a fogpótlás belső felületére 5 másodperce a tisztításhoz, majd öblítse be 5 másodperccel, majd szárítsa meg.

Kerámia/porcelán:
1. Ellenőrizze az összes kémiai anyag folyósságát, sztnét és állagát, mielőtt intraorálisan alkalmazná. Ha az ellenőrláltat észlel, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
2. Vigyen fel hidrogén-fluorsavat (például Ultradent™ Porcelain Etch-et) a fogpótlás belső felületére 90 másodpercig, öblítse le, szárítsa meg.
3. Vigyen fel Ultra-Etch maratószert 5 másodpercig, hogy eltávolítsa a porcelánsiklat és a HF-maratás során keletkezett termékeket. Öblítse le és szárítsa meg.
4. Vigyen fel szilánc (például Ultradent™ Silane) a fogpótlás belső felületére 1 percig, szárítsa meg, és tegye fölre a fogpótlást. Ne öblítse le.

Cirkónia:
1. Nekodonint az nézzmanozint silánu, nobenzitet ar gaisu protézes iekšējā virsmu.
2. Izņēmīgi cirkonija grunšķemju saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Saagatavolana — Kodinäätana
Pylväsolarsaarenne tehtaas vespija:
1. Iskalojat saatavat un atsäjet mitu.
2. Pirms intraorāls izteikšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. NEOBLIGĀTI — uzklājiet Consepsis Scrub (ja pieejams) ar Black Mini™ otas uzgali uz preparāta ar bezrīkšanas kustīgu ūdeni un jauniet tam nožāvē, atzāpē preparāta medaunt mitu.
4. Uzklājiet Peak™ SE gruntējumu ar Black Mini otas uzgali 20 sekundes uz zoba saguatees, nepārtraukti maizot uz preparāta.
5. Atkaukstiet gruntējumu 5 sekundes, izmantojot gaisa/ūdens līteru ūsi vai liela apjoma iešlankīsu ierīci tieši virs saguatees.

Pirmajam kodinātājam tehtaas iespēja:
1. Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas krāsu un konsistenci, uzklājot neliela daudzuma uz mucātīgu palīkina vai marles. Izmetiet visu dūdro kārdinu, kas izdalās.
2. Izņēmīgi ūdens kārši kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vidēm zobu saguatees virsmām 20 sekundes.
3. Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atsājiet mitu.
4. NEOBLIGĀTI — ja iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz preparāta Consepsis Scrub (ja pieejams) ar bezrīšanas kustību un ļaujiet nožāt.

Saagatavolana — Sarkumgumiem
1. Pirms intraorāls steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
2. Izņēmīgi ūdens kārši kodinātāju ar Black Micro™ otas uzgali uz vienīgi maizīet 10 sekundes.
3. Atšaukstiet/žāvējiet 10 sekundes, izmantojot pilna gaisa spiedienu. Saagatavei vajadzīgo kārši spīdīgai.
4. Gaisinas otas uzklāšanas 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.

Saagatavolana — Cementēšana
1. Pirms uzgaja pievienošanas pārbaudiet vienmērīgu plūsmu no abām šķirces ariem, izspiešot neliela daudzuma pirms iekešanas saguatees. Šķērsgriezumam jābūt pieaugošai, lai uzmitos no saistaspēju ārfēnsas.
2. Pievienojiet sajaukšanas uzgali, savienojot vācieju iekšējās taspas ar šķirces ariem. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu.
3. Ja vēlaties, pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali sajaukšanas uzgalim, lai no Dual Barrel šķirces ieudīta tieši protezēšanas reģionā.
4. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana
1. Uzklājiet protēzei pilnu PermaFlo DC sālīšu sveķu kārtu un nekavējoties noņetojiet to vietā. Darbība laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
2. Noņemiet visu lieko.
3. Uzklājiet Dechy™ barjeras šķidumu (vai glicerīnu), lai novērstu skābekļa inhibīcijas slāņa veidošanos.
4. Gaisinas cietināšana mašīnā 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.

PIEZĪME: iestatītais laiks ir 5–8 minūtes.

Saagatavolana — Tap un izņemšana
1. Izurbiet taspas caurumu, izmantojot gumijas aizturi un atbilstošā urbēna UniCore™ urbi.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Rūpīgi izskalojiet 10 sekundes, izmantojot Titanaya™ adapteri un Endo-Eze™ 22 gā uzgali. Nosusinātai ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali no saguatevas apākšas ar aizgāju.
4. Pārbaudiet tapas (piemēram UniCore™ tapas) atbilstību un nogriezet velamāja garumu, izmantojot zīmbārtiņu dimanta disku.

PIEZĪME: kārtīšu un operatīvie urbji var noārušāt šķēdras.

Saagatavolana — Kodināšana
PIEZĪME: vienmēr novērojiet un noņemiet šķēnisks vielas no saguatees apākšas uz augšu.
Peak™ SE protokolā:
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet šķirkstošo pārvietnīku NavTip™ FX 30 ga antaļā.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Uzklājiet uz tapas vietas un koronālās saguatevamas 20 sekundes, izmantojot maisīšanas darīšnu.
4. Izņemiet lieko daudzumu ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali no apākšas uz augšu.

Pārkaņojas kodinātāna tehnika:
1. Ultra-Etch kodinātājam šķirci pievienojiet šķirkstošo Endo-Eze 22 gā uzgali.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Sāciet apākšā un aizpildiet tapas vietu koronālā. Uzklājiet uz koronālās saguatees. Kodinet 20 sekundes.
4. Noņemiet kodinātāja pārpalikumu ar Luer vakuuma adapteri un 22 gā uzgali.

Endo-Eze technika
1. Izmantojot Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali, rūpīgi noskalojiet un viegli nosusinietet gaisu, atsāļot tapas vietu nedaļēji mitru.

Saagatavolana — Savienojums
1. Pievienojiet NavTip FX 30 ga uzgali Peak Universal Bond šķirces ārienā.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Ievietojiet 1–2 plūkenus tapas vietā un uz saguatees, pēc tam 10 sekundes maisiet karšā gaurumā, ieskaitot vīsu saguatees.
4. Rūpīgi noņemiet lieko Peak Universal Bond līmi, izmantojot TNAvaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali.
5. Izžāvējiet tapas vietu un saguatei 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu, lai atšāsdītu/žāvētu ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali, lai izvairītu atlikšo šķīdinātāju no apakšas un tapas vietas mala. Nesāksājiet.

Cirkonija:
1. Nekodinet un neizmantojiet silānu, noberzētiet ar gaisu protēzes iekšējās virsmu.
2. Izņēmīgi cirkonija grunšķemju saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Saagatavolana — Kodināšana
Pylväsolarsaarenne tehtaas vespija:
1. Iskalojat saatavat un atsāļjet mitu.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. NEOBLIGĀTI — uzklājiet Consepsis Scrub (ja pieejams) ar Black Mini™ otas uzgali uz preparāta ar bezrīšanas kustīgu ūdeni un jauniet tam nožāt, atzāpē preparāta medaunt mitu.
4. Uzklājiet Peak™ SE gruntējumu ar Black Mini otas uzgali 20 sekundes uz zoba saguatees, nepārtraukti maizot uz preparāta.
5. Atkaukstiet gruntējumu 5 sekundes, izmantojot gaisa/ūdens līteru ūsi vai liela apjoma iešlankīsu ierīci tieši virs saguatees.

Pirmajam kodinātājam tehtaas iespēja:
1. Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas krāsu un konsistenci, uzklājot neliela daudzuma uz mucātīgu palīkina vai marles. Izmetiet visu dūdro kārdinu, kas izdalās.
2. Izņēmīgi ūdens kārši kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vidēm zobu saguatees virsmām 20 sekundes.
3. Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atsāļjet mitu.
4. NEOBLIGĀTI — ja iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz preparāta Consepsis Scrub (ja pieejams) ar bezrīšanas kustību un ļaujiet nožāt.

Saagatavolana — Savienojums
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
2. Izņēmīgi ūdens kārši kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vienīgi maizīet 10 sekundes.
3. Atšaukstiet/žāvējiet 10 sekundes, izmantojot pilna gaisa spiedienu. Saagatavei vajadzīgo kārši spīdīgai.
4. Gaisinas otas uzklāšanas 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.

Saagatavolana — Cementēšana
1. Pirms uzgaja pievienošanas pārbaudiet vienmērīgu plūsmu no abām šķirces ariem, izspiešot neliela daudzuma pirms iekešanas saguatees. Šķērsgriezumam jābūt pieaugošai, lai uzmitos ārfēnsas.
2. Pievienojiet sajaukšanas uzgali, savienojot vācieju iekšējās taspas ar šķirces ariem. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu.
3. Ja vēlaties, pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali sajaukšanas uzgalim, lai no Dual Barrel šķirces ieudīta tieši protezēšanas reģionā.
4. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana
1. Uzklājiet protēzei pilnu PermaFlo DC sālīšu sveķu kārtu un nekavējoties noņetojiet to vietā. Darbība laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
2. Noņemiet visu lieko.
3. Uzklājiet Dechy™ barjeras šķidumu (vai glicerīnu), lai novērstu skābekļa inhibīcijas slāņa veidošanos.
4. Gaisinas cietināšana mašīnā 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.

PIEZĪME: iestatītais laiks ir 5–8 minūtes.

Saagatavolana — Tap un izņemšana
1. Izurbiet taspas caurumu, izmantojot gumijas aizturi un atbilstošā urbēna UniCore™ urbi.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Rūpīgi izskalojiet 10 sekundes, izmantojot Titanaya™ adapteri un Endo-Eze™ 22 gā uzgali. Nosusinietet ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali no saguatevas apākšas uz augšu.
4. Pārbaudiet tapas (piemēram UniCore™ tapas) atbilstību un nogriezet velamāja garumu, izmantojot zīmbārtiņu dimanta disku.

PIEZĪME: kārtīšu un operatīvie urbji var noārušāt šķēdras.

Saagatavolana — Kodināšana
PIEZĪME: vienmēr novērojiet un noņemiet šķēnisks vielas no saguatees apākšas uz augšu.
Peak™ SE protokolā:
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet šķirkstošo pārvietnīku NavTip™ FX 30 ga antaļā.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Uzklājiet uz tapas vietas un koronālās saguatevamas 20 sekundes, izmantojot maisīšanas darīšnu.
4. Izņemiet lieko daudzumu ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali no apākšas uz augšu.

Pārkaņojas kodinātāna tehnika:
1. Ultra-Etch kodinātājam šķirci pievienojiet šķirkstošo Endo-Eze 22 gā uzgali.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Sāciet apākšā un aizpildiet tapas vietu koronālā. Uzklājiet uz koronālās saguatees. Kodinet 20 sekundes.
4. Noņemiet kodinātāja pārpalikumu ar Luer vakuuma adapteri un 22 gā uzgali.

Endo-Eze technika
1. Izmantojot Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali, rūpīgi noskalojiet un viegli nosusinietet gaisu, atsāļjet tapas vietu nedaļēji mitru.

Saagatavolana — Savienojums
1. Pievienojiet NavTip FX 30 ga antaļā pie Peak Universal Bond līmes šķirces.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Ievietojiet 1–2 plūkenus tapas vietā un uz saguatees, pēc tam 10 sekundes maisiet karšā gaurumā, ieskaitot vīsu saguatees.
4. Rūpīgi noņemiet lieko Peak Universal Bond līmi, izmantojot TNAvaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali.
5. Izžāvējiet tapas vietu un saguatei 10 sekundes, izmantojot pilnu gaisa spiedienu, lai atšāsdītu/žāvētu ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali, lai izvairītu atlikšo šķīdinātāju no apakšas un tapas vietas mala. Nesāksājiet.

Cirkonija:
1. Nekodinet un neizmantojiet silānu, noberzētiet ar gaisu protēzes iekšējās virsmu.
2. Izņēmīgi cirkonija grunšķemju saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Saagatavolana — Tapa, cementēšana un serdes veidošana
1. Noņemiet PermaFlo DC sālīšu sveķu šķirces vāciņu.
2. Noņetojiet sajaukšanas uzgali uz Dual Barrel šķirces, kas sakārtā abās pieslēgvietās. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas vietā.
3. Pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali Dual Barrel maisīšanas uzgalim, lai no šķirces ieudītu tieši karšā.
4. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana — Tap un cementēšana un serdes veidošana
1. Iespiediet neliela daudzuma pirms iekešanas tapas vietā.
2. Ievietojiet gaļu tapas vietā līdz pilnam dziļumam.
3. Izmantojot vienmērīgu spiedienu, piegādājiet PermaFlo DC sālīšu sveķus, kas sākas apākšā un pārvietojas koronālā.
4. Ļaujiet sveķiem tapas vietā nožāt 2 minūtes.
5. Noņetojiet cietināšanas lampu tieši virs tapas un 20 sekundes cietinieties gaisma, cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.
6. Ja nepieciešams, ap tapu turpiniet veidot PermaFlo DC sālīšu sveķu šķirces.

PIEZĪME: gaismas cietināšana 5 sekundes starp slāņiem, lai tā sasniegtu un izveidotu serdi. Veicot serdes veidošanu ārējo cietināšanu 40 sekundēm. Iestatītais laiks ir 5–8 minūtes

Apstrāde
Ar kvarcstrenzveidotās ekvarālās ērdekēbem a fecskendē kēt hastrakāt kūzot tērūle ā kepages ērūsēsēj fertēdēntūsēnrel, ēs hazmājon ēdēbūdē vēdēbūvakē. Ha nem hazmál vēdēhūvakē, a fecskendō csak egyszer használtuk.

Tárolás és értalmatlanítás
A kūlūsē csomagolásban tālāthnē cināmēk megfelelően tárolja.
A hulladékok a helyi szabályoknak, rānyelvek és előírások szerint semmisítse meg.

Egyéb információk
Minden sajátos esemény jelentsen a gyártónak és az illetékes hatóságnak.
utradent.com / 1 800.552.5512 / 801.572.4200
1. A Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. védjegye.

PermaFlo™ DC
Divkārša cietēšanas salīkšte/atjaunojošie sveķi

Produkta apraksts
PermaFlo™ DC sālīkšte/atjaunojošie sveķi kopā ar Peak™ Universal Bond ir paredzēti, lai nodrošinātu sālīkšu sveķu kīmisku polimerizāciju zem netiešām restaurācijām un endodontiskajām tapām, kas ir pieejamas un nav pieejamas lampai. Tos var cietināt ar gaismu caurspīdīgām restaurācijām, t.i., onlejām, inlejām un porcelāna kroņiem. To var izmantot tiešās restaurācijās kā sākotnējo slāni ādmugurā stūkmēm, āksmēm, porcelāna/metāla kārunēēm. Ja gši būti būvēsiai kietinamas skaistrinos restauracijoms, to var izmantot kā maganmatēriālam un kā pamatmateriālu pirms kroņa izgatavošanas.

Kontraindikācijas
- Pacientiem vai lietotājiem, kuriem ir bažas par alerģiju, skatiet produkta alerģenu dokumentu, kas pieejams vietnē utrabent.com. Ja tiek novērota alerģiska reakcija, rīpīgi izskalojiet pakļauto vietu ar ūdeni un ar mīkstiem pacientam konsultēties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
- Sveķi var būt sensibilizējoši. Izvairieties no nesacietējušu zobu sveķu atkārtotas saskares ar ādu. Nekļūstot pacientiem ar zināmu jutību pret akrilātiem vai citiem sveķiem. Ja rodas alerģiska reakcija, ādas iekaisums vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.
- Ja produkts ir norīts, dzeriet lielu daudzumu ūdens un sazinieties ar ārstu. Ja pieskaras ādai vai acīm, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Pacientiem un zobārstniecības speciālistiem jāvalkā aizsargbrilles ar sānu aizsargiem
- Izmantojiet tikai ietekšes padomus
- Uzgali ir paredzēti tikai vienreizēji lietošanai
- Lai izvairītos no aizsērēšanas, nomainiet uzgaļiti un pēc katras lietošanas reizes no jauna aizskujiet ar Luer Lock vāciņiem.
- Restorācijas procedūru laikā novirziet operatora lampu, lai izvairītos no priekšlaicīgas polimerizācijas
- Ar lampu darināmās salīkšteļas ir jūtīgas pret apkārtējo gaismu. Šķirces Luer Lock vāciņi pēc lietošanas jānomaina, lai novērstu nevēlamu polimerizāciju. Nosedīset šķirces gaiu ar marli, ja tas ilgstoši ārsts ārsts apkārtējā gaismas iedarbībai.
- Ievietojot ārstēšanu izolācija
- Lai ilgāk uzglabātu sveķus, tie jāglabā ledusskapī, lai saglabātu to derīguma termiņu

Pakāpeniski norādījumi
Saagatavošana — Netiešās saistīšanas tehnika
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
2. Notīriet saglabā, nosūkājiet un noskalojiet Consepsis™ Scrub ar STARbrush™ starpkoronālo otu, lai notīrītu, dezinficētu un noņemtu cementa atlikumus.)
3. Pārbaudiet protezēšanas piemērotību.
4. Sagatavojiet protēzes iekšējo virsmu.

Metāla bāzes:
1. Aparātdīgās protēzes iekšējo virsmu ar mikro beral vai smilšu smilšu.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Uzklājiet fosforīkšķu (piemēram, Ultra-Etch® kodinātāju) uz protēzes iekšējās virsmas 5 sekundes, lai notīrītu, 5 sekundes noskalojiet, nosusinet.

Keramika/porcelāns:
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
2. Uzklājiet fluorūdeņraža (piemēram, Ultradent™ porcelāna kodinātāju) uz protēzes iekšējās virsmas 90 sekundes, noskalojiet, nosusinet.
3. Vandenim Ultra-Etch maratoru 5 sekundes, lai noņemtu porcelāna sāļus un HF kodināšanas radītās atlikšus. Noskalojiet un nosusinet.
4. Uzklājiet silānu (piemēram, Ultradent™ silānu) uz protēzes iekšējās virsmas 1 minūti, nosusinet un novietojiet protēzi vietā. Nenoskalojiet.

Cirkonija:
1. Nekodinet un neizmantojiet silānu, noberzētiet ar gaisu protēzes iekšējās virsmu.
2. Izņēmīgi cirkonija grunšķemju saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Saagatavošana — Kodināšana
Pulēšanas tehnikas vespija:
1. Iskalojiet saglatavi un atsāļjiet mitu.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. NEOBLIGĀTI — uzklājiet Consepsis Scrub (ja pieejams) ar Black Mini™ otas uzgali uz preparāta ar bezrīšanas kustīgu ūdeni un jauniet tam nožāt, atzāpē preparāta medaunt mitu.
4. Uzklājiet Peak™ SE gruntējumu ar Black Mini otas uzgali 20 sekundes uz zoba saguatees, nepārtraukti maizot uz preparāta.
5. Atkaukstiet gruntējumu 5 sekundes, izmantojot gaisa/ūdens līteru ūsi vai liela apjoma iešlankīsu ierīci tieši virs saguatees.

Pirmajam kodinātājam tehtaas iespēja:
1. Pirms uzklāšanas pārbaudiet produkta plūsmas krāsu un konsistenci, uzklājot neliela daudzuma uz mucātīgu palīkina vai marles. Izmetiet visu dūdro kārdinu, kas izdalās.
2. Izņēmīgi ūdens kārši kodinātāju ar Blue Micro™ uzgali uz vidēm zobu saguatees virsmām 20 sekundes.
3. Rūpīgi noskalojiet 5 sekundes un atsāļjet mitu.
4. NEOBLIGĀTI — ja iegūtu papildu efektu pret mikrobiem, uzklājiet uz preparāta Consepsis Scrub (ja pieejams) ar bezrīšanas kustību un ļaujiet nožāt.

Saagatavošana — Savienojums
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
2. Izņēmīgi ūdens kārši kodinātāju ar Blue Micro™ otas uzgali uz vienīgi maizīet 10 sekundes.
3. Atšaukstiet/žāvējiet 10 sekundes, izmantojot pilna gaisa spiedienu. Saagatavei vajadzīgo kārši spīdīgai.
4. Gaisinas otas uzklāšanas 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.

Saagatavošana — Cementēšana
1. Pirms uzgaja pievienošanas pārbaudiet vienmērīgu plūsmu no abām šķirces ariem, izspiešot neliela daudzuma pirms iekešanas saguatees. Šķērsgriezumam jābūt pieaugošai, lai uzmitos ārfēnsas.
2. Pievienojiet sajaukšanas uzgali, savienojot vācieju iekšējās taspas ar šķirces ariem. Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai nofiksētu.
3. Ja vēlaties, pievienojiet elastīgo intraorālo uzgali sajaukšanas uzgalim, lai no Dual Barrel šķirces ieudītu tieši protezēšanas reģionā.
4. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.

Izmantošana
1. Uzklājiet protēzei pilnu PermaFlo DC sālīšu sveķu kārtu un nekavējoties noņetojiet to vietā. Darbība laiks ir aptuveni 2 minūtes 30 sekundes.
2. Noņemiet visu lieko.
3. Uzklājiet Dechy™ barjeras šķidumu (vai glicerīnu), lai novērstu skābekļa inhibīcijas slāņa veidošanos.
4. Gaisinas cietināšana mašīnā 10 sekundes, izmantojot cietināšanas lampu ar intensitāti ≥ 800 mW/cm2 vēja gurauna reģionā 385–515 nm.

PIEZĪME: iestatītais laiks ir 5–8 minūtes.

Saagatavošana — Tap un izņemšana
1. Izurbiet taspas caurumu, izmantojot gumijas aizturi un atbilstošā urbēna UniCore™ urbi.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet visu līmēšo vielu plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. Rūpīgi izskalojiet 10 sekundes, izmantojot Titanaya™ adapteri un Endo-Eze™ 22 gā uzgali. Nosusinietet ar Titanaya adapteri un Endo-Eze 22 gā uzgali no saguatevas apākšas uz augšu.
4. Pārbaudiet tapas (piemēram UniCore™ tapas) atbilstību un nogriezet velamāja garumu, izmantojot zīmbārtiņu dimanta disku.

PIEZĪME: kārtīšu un operatīvie urbji var noārušāt šķēdras.

Saagatavošana — Kodināšana
PIEZĪME: vienmēr novērojiet un noņemiet šķēnisks vielas no saguatees apākšas uz augšu.
Peak™ SE protokolā:
1. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet šķirkstošo pārvietnīku NavTip™ FX 30 ga antaļā.
2. Pirms intraorālās steķēšanas pārbaudiet plūsmu, krāsu un konsistenci. Ja ir jūtama pretestība, nomainiet uzgali un vēlreiz pārbaudiet.
3. 20 sekundes kodināšana ūdens apākšā un kalšo vietos ir koronālino preparato.
4. Izņēmīgi pārbaudiet nauddoami Tirkway adapteri ir Endo-Eze 22 gā antaļā ā apačos i sirkļ. Noņemiet visu lieko.

Ortho technique:
Pirie Ultra-Etch ēsdēmo širkšto pārvietnīku Endo-Eze 22 gā antaļā.
Pirēi špurdāmi i burna, patkrinkte sraušą, sraiķę ir konsistencją. Jei pasirpisirinsas yra, pakeiskite antgalį ir dar kartą patikrinkite.
Ēsdēmo ēsdēmo širkšto pārvietnīku ir kūrūmi tapas vietą ir koronālino. Kūrūmi ēsdēmo ēsdēmo. Ēsdēmo ēsdēmo širkšto pārvietnīku nauddoami Tirkway adapteri ir Endo-Eze 22 gā antaļą i ēsdēmo ēsdēmo širkšto pārvietnīku. Noņemiet visu lieko.
Ēsdēmo širkšto pārvietnīku ir Endo-Eze 22 gā antaļą ir kūrūmi tapas vietą. Ēsdēmo širkšto pārvietnīku ēsdēmo širkšto pārvietnīku ēsdēmo širkšto pārvietnīku