HU

Peak™ Universal Bond & Peak™ SE

Fényre keményedő ragasztó és önmaró alapozó

Termékleírás

A Peak™ Universal Bond ragasztó palack, fecskendő vagy adagolókart szálban kínálja. Használható önmarósítóval vagy teljes marattal technikával. 1:1% ban erős alkohol oldószer hordozóval van töltve, és a legtöbb nagy intenzitású lámpával és lézerrel is elkészíti, és kikeményíthető. A Peak Universal Bond ragasztó fecskendő tartálszerű tartálszerű, amely hosszú ideig kötési szilárdságot biztosítat. A Peak™ SE Primer egy önmarósító dentin kötőanyag, amely egy fecskendős adagolórendszerben maratásnyelvű és alapozóból áll. Az Ultra-Etch™ és az Opal Etch™ egyaránt optimális viszkozitású 35%-os foszforsav marási oldat. A folyékonyág lehetővé teszi a pontos vékonybevonat, belehelyezés és szétfújás. Az ultra-Etch kétszer, szupravékony vékony viszkózus anyag, hogy megakadályozza az elfolyását. Az Ultra-Etch és az Opal Etch maratószerek onkoterápiával a mély nyálkahártyán (átlagos mélység 1,9 µm 15 mikaszkóp maratásával). Nem tartalmaznak fluoridot, és úgy vannak kialakítva, hogy dobítókar gyorsan és teljes mértékben eltávolíthatók legyenek. Az összes kötő termék ezekben használat előtt fogelmosóban olvasva és el és eltávolítva az összes szálat és SDS-információk.

Szálltáros (ajtós)

Peak Universal Bond

- 1,2 ml es adagoló fecskendő
  - Szálltáros töltőanyag: Insipral™ kefevég vagy fém Dento-Infusor™ hegy
- 4 ml es üveg
  - Opalkazettás
  - Applikátor ecset

Csőcsi SE

- 1,2 ml es adagoló fecskendő
  - Szálltáros töltőanyag: Black Mini™ kefevég

Ultra-Etch maratószer

- 1,2 ml es adagoló fecskendő és adagolókezelő
  - Blue Micro™ hegy
  - Insipral™ kefevég
- IndiSpenser™ fecskendő

Használati javallatok/rendeltetés

Peak Universal Bond ragasztó

Gyakorlatilag minden maratás és ragasztási igénye használható a helyreállító fogászatban minden korosztály számára. A Peak Universal Bond ragasztó a kivételével anyagokhoz tapad:

- Dentin és zománc
- Porcelán, cirkónia
- Fém
- Kompozit

Peak SE alapozó

Használható a legtöbb könnyű hozzáférésű ragasztási eljárásához mind az elülső, mind a hátsó részen. A Peak SE primer a Peak Universal Bond ragasztókat egyszerű ragasztó használatát dentin, zománc, porcelán és kompozit ragasztókhoz.

Ultra-Etch maratószer: Használja az Ultra-Etch-et a dentin maratására, vagy folyékony etikettelésére ragasztószáz vagy szálban.

Ellenjavallatok

- Ne használja olyan betegeknél, akik ismertem érzékenyek metakrilátokra vagy más gyantára.
- Az allergiás problémákkal küzdő betegek vagy ügyfelek esetében tekintse meg az utasításon az webhelyen elérhető termék adatlapját, dokumentumot. Ha allergiás reakciót észlel, alapozan dörzsölje le ezzel a kitett területet, és forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- A gyantát érzékenységet okozhat, és allergiát is meg nem kötött bőgyűrűs ragasztóval szemben (ez a bőrre és/vagy légzőszervekre). Ha allergiát reakció, bőrgyulladás vagy bőrkiütés jelei lép fel, bertegt forduljon orvoshoz.
- Maratás – kerülje a légy szovetekkel való érintkezést
- A hőgyrendszerű lámpák és lézerek ALKONNAL dolgoznak le a területet fel vízzel
- Ha a terméket lenyelt, igyon nagy mennyiségű vizet és forduljon orvoshoz. A termék belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A fogfelé (pulpa) közelében lévő területek védő alapozóval kell kezelni a maratószer behelyezése előtt
- A beteghez/ügyfélhez a fogorvosnak/szakértőnek szóló szakmai utasítások elérhetővé tétele
- Intenzitás a fénykő lámpát, hogy megkiadjuntsa az összes gyantát alapja anyag vagy elő ezeket polimerizáljuk
- Használat után azonnal zárja vissza a kupakot/szivattyút, és ne hagyja az üveget szobahőmérsékletnél
- A kezelés szétfújás optimalizálása érdekében használjon olajmentes és nedvességmentes levegőt
- Csak az ajánlott hegyeket használja
- Ne engedje csak egyszer használatosnak

Lépésenkénti utasítások

Előkészítés: Peak Universal Bond

1,2 ml es fecskendő

1. Távolítsa el a Luer Lock kupakot.
2. Biztonságosan rögzítse az ajánlott hegyet.
3. Ellenőrizze az áramlást, a szórt és az állapot az intraorális alkalmazás előtt. Ha az ellenállást érzett, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.

4 ml es palack

1. Ragadjon rázza fel az üveget.
2. Távolítsa el a kupakot.
3. Helyezze az ajánlott adagoló egy leverdeésbe.
4. A felvetheet használjon inkább applikátor ecsetet.
5. Felhordás előtt ellenőrzés szükséges az ajánlat.

Egységdózis

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Távolítsa el a mikro applikátort az egységadagolós tartály ajánlott.
3. A nyújtózzon tartsa a ajánlat, hogy folyásszerű legyen.
4. A mikroapplikátor segítségével adagolja ki a terméket az egységadagolós tartály kupakján lévő nyílásron keresztül.
5. A felhordás előtt ellenőrizze a termék szintű és alapját.

Előkészítés: Peak SE

1,2 ml es fecskendő

MEGJEGYZÉSEK

- A Peak SE primer kezelési használatához a jetMix™ fecskendőben elvásárolt kétkomponens aktiválása szükséges.
- A Peak SE primer az aktiválás után 120 napig stabil.
- A KEVÉRES ELŐTT NE TÁROLTSA EL A LUER LOCK KUPAKOT.
- Az aktiválás előtt tűy fel a legnagyobb méretű hegyet a jetMix™ fecskendőre.
- Gyorsan és erőteljesen nyomja be a „dátumozott" dugattyút a kézjegő hengerbe.
- Ellenőrizze, hogy a dugattyú egy megfelelő "darton" virsuli-szálban van-e a kézjegő hengerrel.
- Távolítsa el a Luer Lock kupakot.
- Biztonságosan rögzítse az ajánlott hegyet.
- Az intraorális expresszió előtt ellenőrizze az áramlást. Ha az ellenállást érzett, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
- Ha szükséges, ellenőrizze a termék folyásszerű szintet és konzisztenciáját.

Előkészítés: Ultra-Etch

1,2 ml es fecskendő

1. Távolítsa el a Luer Lock kupakot.
2. Biztonságosan rögzítse az ajánlott hegyet.
3. Az intraorális expresszió előtt ellenőrizze a maratószer folyásszerű, szórt és konzisztenciáját. Ha az ellenállást érzett, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
4. Kezdetben kis mennyiséget átlátszó folyadék szórjon ki a fecskendőből. Ez normális.

Indőgyenes fecskendő

1. Távolítsa el a Luer Lock kupakot az IndiSpenser fecskendőről.
2. Csatlakoztassa az 1,2 ml es kezelési IndiSpenser fecskendőt külső menetehez.
3. Nyomja le az IndiSpenser dugattyúit, miközben az 1,2 ml es fecskendődugattyúit a kézzel töltötteje vezeti.
4. Különítse el a fecskendőket, és igazja vissza a maratószer vizsgálat ellátott IndiSpenser fecskendőt.
5. Biztonságosan rögzítse az ajánlott hegyet az 1,2 ml es fecskendőhöz.
6. Az intraorális expresszió előtt ellenőrizze az áramlást. Ha az ellenállást érzett, cserélje ki a hegyet, és ellenőrizze újra.
7. Ha szükséges, ellenőrizze az folyásszerű szintet és a fecskendőből. Ez normális.

Alap eltekintése: ragasztási javítás előtt

- Dentinoxonol™ Sensitive Solution (ezüst-fluorid) a fogszuvasodást, biztosítva az összes nem mineralizált dentint eltávolítását (ebben a Seek™/Sable™ Seek™ fogszuvasodásjelző használata javasolt). V. osztályú kopástanú/áthúzódás eltávolításehoz ebben az esetben javasolt.
- Kompozit: Ellenőrizd felszínt gyémántfúrokat. Vigyen fel Ultra-Etch maratószert a bírott felületre 2-3 másodpercre.
- Fém: Ha szükséges, vegyen fel Ultra-Etch maratószert 2-3 másodpercre a tisztításhoz. Ha szükséges, a fém felületét szórja meg alumínium-oxiddal 50–80 PSI nyomásnál mikroszuszja le a felületet, és szúrtsa meg a levegőt a kóros szálakhoz és csökkentsd a levegőt.
- Ultra-Etch maratószer: Vigyen fel Ultra-Etch maratószert a felületre 2-3 másodpercre, majd öblítsük le a felületet legalább 10 másodpercre. Ne maratsa. Ne öblítse. A nagyobb kötési szilárdság érdekében alkalmazzon Peak ZM primert.
- Porcelánfelületek: 10 másodpercre maratás hidrofluorsavval (ez az alapszer öblítése le. Ne maratsa). Ezt megelőzi a porcelánfelületek elkészítése/tisztítása az Ultra-Etch (35%-os foszforsav maratószer) 5 másodpercig, öblítse le és szárítsa meg. Vigye fel a Peak Universal Bond ragasztót a porcelánfelületre. Ne maratsa. Ne öblítse. A nagyobb kötési szilárdság érdekében alkalmazzon Peak ZM alapozót.
- Porcelánfelületek: 10 másodpercre maratás hidrofluorsavval (ez az alapszer öblítse le. Ne maratsa). Ezt megelőzi a porcelánfelületek elkészítése/tisztítása az Ultra-Etch (35%-os foszforsav maratószer) 5 másodpercig, öblítse le és szárítsa meg. Vigye fel a Peak Universal Bond ragasztót a porcelánfelületre. Ne maratsa. Ne öblítse. A nagyobb kötési szilárdság érdekében alkalmazzon Peak ZM alapozót.

Felhasználás – Közvetlen ragasztási technika

Etch

Dimarsitó technika – Dentin/zománc

1. Izolálja a fogat (fogakat).
2. Öblítse le és szárítsa meg az előkészített felületet.
3. Vigye fel a Peak SE primert Black Mini Brush Tippel a fogpreparátumra 20 másodpercig folyamatos kevenés közben a dentin felületén. Ne fújja szétszórni.
4. Hígítsa/szárítsa meg 3 másodpercig a levegőfúvó fecskendővel vagy a nagy térfogatú szívócső követelmi a felszínhez fél fejet. Folyásszerű szintre. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne öblítse.
5. MEGJEGYZÉS: Ha Consepsis™ oldatot (CHX) alkalmaz a fogra, akkor ezen a ponton alkalmazza. Enyhén szárítsa meg, és hagyja enyhén nedvesen a dentint a kötőanyag felhordása előtt.
6. Folytatása az alábbi „Kötés" lépéssel.

Fénykő Etch technika – Dentin/zománc

1. Izolálja a fogat (fogakat).
2. Öblítse le és szárítsa meg az előkészített felületet.
3. Vigye fel a Peak SE primert Black Mini Brush Tippel a fogpreparátumra 20 másodpercig folyamatos kevenés közben a dentin felületén. Ne fújja szétszórni.
4. Hígítsa/szárítsa meg 3 másodpercig a levegőfúvó fecskendővel vagy a nagy térfogatú szívócső követelmi a felszínhez fél fejet. Folyásszerű szintre. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne öblítse.
5. MEGJEGYZÉS: Ha Consepsis™ oldatot (CHX) alkalmaz a fogra, akkor ezen a ponton alkalmazza. Enyhén szárítsa meg, és hagyja enyhén nedvesen a dentint a kötőanyag felhordása előtt.
6. Folytatása az alábbi „Kötés" lépéssel.

Kötés

1. Vigyen fel egy tisztító hengert Peak Universal Bond ragasztóval. Dörzsölje be a dentinre és fesse a zománcra.
2. Levegőnek és viszkuszmű agressziven fújnia. Ez erősít a kötőanyag ragasztó, mivel forróra, hogy nagyon vékony rétegvastagsága van. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne szétszórni.
3. Fénykeményítés 10–20 másodpercig normál üzemmódban a 800 mW/cm 2 intenzitású lámpa kemény/elastic a 385–515 nm hullámhosszúságtartományban.
4. Cement helyettesítő a kiválasztott anyaggal a gyártó utasításai szerint.

Használat – Tartós protézis javítása – ajtós

1. Tavolítsuk el minden sérült, laza vagy legyengült tömítéket a tönt protézisből.
2. Szórja meg a protézis belső felületét.
3. Kézzel vagy a protézis belső felületét a fent „Alap eltekintése ragasztási javítás előtt" részben leírtak szerint. Fehérítővel kiverse a marás utasításait.
4. Ha a javítás egy fémes termékenyes fogakon történik, kövesse a „Közvetlen ragasztási technikát" a javított megfelelésére vonatkozóan.

Kötés

1. Vigyen fel egy tisztító hengert Peak Universal Bond ragasztóval. Dörzsölje be a dentinre és fesse a zománcra.
2. Levegőnek és viszkuszmű agressziven fújnia. Ez erősít a kötőanyag ragasztó, mivel forróra, hogy nagyon vékony rétegvastagsága van. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne szétszórni.
3. Fénykeményítés 10–20 másodpercig normál üzemmódban a 800 mW/cm 2 intenzitású lámpa kemény/elastic a 385–515 nm hullámhosszúságtartományban.
4. Cement helyettesítő a kiválasztott anyaggal a gyártó utasításai szerint.

Használat – Tartós protézis javítása – szájon kívül

1. Tavolítsuk el minden sérült, laza vagy legyengült tömítéket a tönt protézisből.
2. Szórja meg a protézis belső felületét.
3. Kézzel vagy a protézis belső felületét a fent „Alap eltekintése ragasztási javítás előtt" részben leírtak szerint. Fehérítővel kiverse a marás utasításait.
4. Ha a javítás egy fémes termékenyes fogakon történik, kövesse a „Közvetlen ragasztási technikát" a javított megfelelésére vonatkozóan.

Kötés

1. Vigyen fel egy tisztító hengert Peak Universal Bond ragasztóval. Dörzsölje be a dentinre és fesse a zománcra.
2. Levegőnek és viszkuszmű agressziven fújnia. Ez erősít a kötőanyag ragasztó, mivel forróra, hogy nagyon vékony rétegvastagsága van. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne szétszórni.
3. Fénykeményítés 10–20 másodpercig normál üzemmódban a 800 mW/cm 2 intenzitású lámpa kemény/elastic a 385–515 nm hullámhosszúságtartományban.
4. Cement helyettesítő a kiválasztott anyaggal a gyártó utasításai szerint.

Felhasználás – Szájon kívüli javítás

1. Tavolítsuk el minden sérült, laza vagy legyengült tömítéket a tönt protézisből.
2. Szórja meg a protézis belső felületét.
3. Kézzel vagy a protézis belső felületét a fent „Alap eltekintése ragasztási javítás előtt" részben leírtak szerint. Fehérítővel kiverse a marás utasításait.
4. Ha a javítás egy fémes termékenyes fogakon történik, kövesse a „Közvetlen ragasztási technikát" a javított megfelelésére vonatkozóan.

Kötés

1. Vigyen fel egy tisztító hengert Peak Universal Bond ragasztóval. Dörzsölje be a dentinre és fesse a zománcra.
2. Levegőnek és viszkuszmű agressziven fújnia. Ez erősít a kötőanyag ragasztó, mivel forróra, hogy nagyon vékony rétegvastagsága van. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne szétszórni.
3. Fénykeményítés 10–20 másodpercig normál üzemmódban a 800 mW/cm 2 intenzitású lámpa kemény/elastic a 385–515 nm hullámhosszúságtartományban.
4. Cement helyettesítő a kiválasztott anyaggal a gyártó utasításai szerint.

Mazsolák – Csapos mázsonk

Előkészítések

1. Rögzítsük az szolgáltatott gumiszívókészlet és megfelelő méretű UniCone™ kúrhoz.
2. Alapozan öblítse le az szolgáltatott 10 mikaszopó a Tríkway® Adapter és egy 22ga Endo-Ende™ hegy segítségével. Szárítsa meg Tríkway Adapter és a 22ga Endo-Ende hegy a levegőfúvó fecskendő.
3. Ellenőrizze az szolgáltatott UniCone Post) fleckedesítőit, és igazja le a kívánt hosszra egy nagy sebességű gyémánt tárcsával. MEGJEGYZÉS: A kemény/elastic az operatív fürés kikeményítése a szálban.

Maró utcsmentalókoz

Dimarsitó technika – Dentin/zománc

1. Öblítse le és szárítsa meg az oszlopkhelyet.
2. Csatlakoztassa egy 30 ga-os NaviTip™ XX vezetőjét a Peak SE alapozó fecskendőhöz.
3. Vigye fel az csapra és a kornamegparaticra 20 másodpercig levenő mozdulattal.
4. Használja a finoman vezető szálat, hogy a Endo-Ende hegy szárítsa meg a levegőn, hagyja, hogy az oszlopkör kissé nedves legyen.
5. Ha Consepsis oldatot (CHX) alkalmaz, csatlakoztassan egy 30 ga-os NaviTip FX eszközt/szál a Consepsis oldatos fecskendőhöz, és dörzsölje le a dentin felszín, és hagyja kissé nedvesen.
6. Folytassa az alábbi „Kötés" lépéssel.

Tetsző fénykő technika – Dentin/zománc

1. Öblítse le és szárítsa meg az oszlopkhelyet.
2. Csatlakoztassan egy 30 ga-os NaviTip FX eszközt a Peak SE alapozó fecskendőhöz.
3. Vigye fel az csapra és a kornamegparaticra 20 másodpercig levenő mozdulattal.
4. Használja a finoman vezető szálat, hogy a Endo-Ende hegy szárítsa meg a levegőn, hagyja, hogy az oszlopkör kissé nedves legyen.
5. Ha Consepsis oldatot (CHX) alkalmaz, csatlakoztassan egy 30 ga-os NaviTip FX eszközt/szál a Consepsis oldatos fecskendőhöz, és dörzsölje le a dentin felszín, és hagyja kissé nedvesen.
6. Folytassa az alábbi „Kötés" lépéssel.

Tetsző fénykő technika – Dentin/zománc

1. Öblítse le és szárítsa meg az oszlopkhelyet.
2. Csatlakoztassan egy 30 ga-os NaviTip FX eszközt a Peak SE alapozó fecskendőhöz.
3. Vigye fel az csapra és a kornamegparaticra 20 másodpercig levenő mozdulattal.
4. Szárítsa meg a levegőfúvó fecskendővel vagy a szívócsővel, hogy az oszlopkör kissé nedves legyen.
5. Ha Consepsis oldatot (CHX) alkalmaz a fogra, akkor ezen a ponton alkalmazza. Enyhén szárítsa meg, és hagyja enyhén nedvesen a dentint a kötőanyag felhordása előtt.
6. Folytassa az alábbi „Kötés" lépéssel.

Kötés

1. Vigyen fel egy tisztító hengert Peak Universal Bond ragasztóval. Dörzsölje be a dentinre és fesse a zománcra.
2. Levegőnek és viszkuszmű agressziven fújnia. Ez erősít a kötőanyag ragasztó, mivel forróra, hogy nagyon vékony rétegvastagsága van. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne szétszórni.
3. Fénykeményítés 10–20 másodpercig normál üzemmódban a 800 mW/cm 2 intenzitású lámpa kemény/elastic a 385–515 nm hullámhosszúságtartományban.
4. Cement helyettesítő a kiválasztott anyaggal a gyártó utasításai szerint.

Felhasználás – Szájon kívüli javítás

1. Tavolítsuk el minden sérült, laza vagy legyengült tömítéket a tönt protézisből.
2. Szórja meg a protézis belső felületét.
3. Kézzel vagy a protézis belső felületét a fent „Alap eltekintése ragasztási javítás előtt" részben leírtak szerint. Fehérítővel kiverse a marás utasításait.
4. Ha a javítás egy fémes termékenyes fogakon történik, kövesse a „Közvetlen ragasztási technikát" a javított megfelelésére vonatkozóan.

Kötés

1. Vigyen fel egy tisztító hengert Peak Universal Bond ragasztóval. Dörzsölje be a dentinre és fesse a zománcra.
2. Levegőnek és viszkuszmű agressziven fújnia. Ez erősít a kötőanyag ragasztó, mivel forróra, hogy nagyon vékony rétegvastagsága van. A folyékonyág fontosabb vékony fogja a dentin enyhén nedves. Ne szétszórni.
3. Fénykeményítés 10–20 másodpercig normál üzemmódban a 800 mW/cm 2 intenzitású lámpa kemény/elastic a 385–515 nm hullámhosszúságtartományban.
4. Cement helyettesítő a kiválasztott anyaggal a gyártó utasításai szerint.

**Mazsolák

Peak™ Universal Bond & Peak™ SE

Светоотверждающий клей и самоэтрализующаяся грунтовка

Описание продукта

Peak™ Universal Bond представляет собой светоотверждающий клей, поставляемый во флаконах и шприцах или в виде капсул доз. Его можно использовать как при самостоятельном травлении, так и при полном травлении. Он на 75% заполнен растворителем-носителем на основе этилового спирта и отверждается при использовании большинства источников света высокой интенсивности, включая светодиодные. Универсальный клей Peak содержит 0,2% ингибитора, который может обеспечить долговременную прочность соединения.

Грунтовка Peak™ SE Primer - это самотравливающаяся смесь для склеивания дентина, которая состоит из травителя и грунтовки в одном растворе-носителе.

Ultra-Etch™ и Opal Etch™ содержат 35% гель-травителя на основе фосфорной кислоты с оптимальной вязкостью. Текучесть обеспечивает полное покрытие внесенной, включая микроскопические канавки, но при этом является достаточно жесткой, чтобы предотвратить растекание. Прозрачные растворы Ultra-Etch и Opal Etch самоограничиваются по глубине травления (средняя глубина 1,9 мкм при 15-секундном травлении). Они не содержат стабилизатора и предназначены для быстрого и полного удаления при использовании.

Перед использованием всю описанную изделий внимательно прочтите и ознакомьтесь со всеми инструкциями и паспортом безопасности химической продукции.

Формы/способ доставки

Peak Universal Bond:
- шприц-дозатор 1,2 мл
  - Наконечник (ы) для доставки: Наконечник щетки Inspiral™ или металлический наконечник Dento-Infusor™
- флакон объемом 4 мл
- Капельница для доз
  - Кисть-аппликатор

Пак СЕ
- шприц-дозатор 1,2 мл
  - Наконечник (ы) для доставки: Черный наконечник щетки Mini™

Предназначенный только для клиник:
- шприц-дозатор емкостью 1,2 мл
  - Наконечник (ы) для доставки: Черный наконечник щетки Mini™
  - Синий наконечник Micro™
  - Наконечник Inspiral™
- шприц InfiDispense™

Показания к применению/целевое назначение

Универсальный клей для склеивания Peak
Используется прямым или для всех видов травления и склеивания в восстановительной стоматологии для нижеперечисленных субстратов, включая, но не ограничиваясь:
- дентин и эмаль
- фарфор, диоксид циркония
- металл
- композитный

Грунтовка Peak SE primer:
Для использования в большинстве легкоструктурных процедур склеивания как в передней, так и в задней частях. Грунтовка Peak SE primer предназначена для использования с универсальным адгезивом Peak Bond для склеивания дентина, эмали, фарфора и композитных материалов.
Предназначенный только для клиник: Используется для травления эмали и дентина или для подготовки поверхностей к бондингу для внесенных шприцев.

Противопоказания

- Не применять пациентам с известной чувствительностью к метакрилатам или другим компонентам.
- Пациентам с повышенным, страдающим аллергией, следует сообщить с докторантом об аллергии продукта, дерматиновом или контактном аллергическом ответе. При возникновении аллергической реакции необходимо немедленно прекратить отсрочке лечения и обратиться к своему лечащим врачом.

Предупреждения и меры предосторожности

- Смешивание с другими стоматологическими материалами, которые могут ослабить отверждение, не рекомендуется.
- Избегайте попадания в глаза. Если произошло попадание в глаза, немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
- Не применять у пациентов с известной чувствительностью к компонентам.
- Не допускать прикосновения к коже. Если произошло попадание на кожу, немедленно промыть кожу водой с мылом.
- Не допускать попадания в рот. Если произошло попадание в рот, немедленно прополоскать рот водой.
- Не допускать попадания на слизистые оболочки. Если произошло попадание на слизистые оболочки, немедленно промыть водой.
- Не допускать попадания на одежду. Может вызвать обесцвечивание.
- Не допускать попадания в глаза. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания на кожу. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания в рот. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания на слизистые оболочки. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания на одежду. Может вызвать обесцвечивание.
- Не допускать попадания в глаза. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания на кожу. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания в рот. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания на слизистые оболочки. Может вызвать раздражение.
- Не допускать попадания на одежду. Может вызвать обесцвечивание.

Инструкция по применению

Приготовление: Пиковая универсальная связка

Шприц объемом 1,2 мл
1) Снимите колпачок шприцевого наконечника.
2) Прикрепите к шприцу соответствующий наконечник.
3) Перед интраоральной обработкой проверьте поток, цвет и консистенцию. При обнаружении сопротивления замените насадку и повторите проверку.

Бутылка объемом 4 мл
1) Тщательно встряхните флакон.
2) Снимите колпачок.
3) Выскребите желаемое количество в форму для смешивания.
4) Для нанесения используйте кисть-аппликатор.
5) Перед нанесением проверьте цвет и консистенцию продукта.

Единичная доза
1) Достаньте продукт из упаковки.
2) Извлеките микроаппликатор из сосуда контейнера для единичной дозы.
3) Чтобы открыть, надавите на кружку, чтобы проколоть уплотнение.
4) Растворите продукт с помощью микроаппликатора через отверстие в крышке контейнера для единичной дозы.
5) Перед нанесением проверьте цвет и консистенцию продукта.

Приготовление: Пиковый СЕ

Шприц объемом 1,2 мл
1) Снимите колпачок.
2) Прикрепите соответствующие грунтовки Peak SE primer требуют активации двух компонентов, разделенных в шприце шприц™.
3) Прайимер Peak SE сначала в течение 1,2 дней после активации
4) НЕ СНИМАЙТЕ КОЛПАЧОК ШЕЙ СОСТОЯТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
5) Перед включением напишите при гороскоп на плоской поверхности кончика пальчика.
6) Выстро и с силой удавите "встроенный" поршень в средней шприца.
7) Убедитесь, что поршень находится на одном уровне со средним шейпером.
8) Тщательно перемешайте пастообразную
9) Кадры приоритет рекомендуемый наконечник.
10) Перед включением напишите при гороскоп на плоской поверхности кончика пальчика.
11) Выстро и с силой удавите "встроенный" поршень в средней шприца.
12) Убедитесь, что поршень находится на одном уровне со средним шейпером.
13) Тщательно перемешайте пастообразную
14) Кадры приоритет рекомендуемый наконечник.
15) Перед использованием всех описанных изделий внимательно прочтите и ознакомьтесь со всеми инструкциями и паспортом безопасности химической продукции.

Использование - Метод прямого склеивания

Травление
Эмаль самотравления – Дентин/эмаль.
1) Изолируйте зуб (зубы).
2) Промойте и высушите подготовленный участок.
3) Нанесите на подготовленный участок жидкость самотравления на протравленный зуб в течение 20 секунд, непрерывно перемешивая дентин. Не грите эмаль.
4) Разбавляющуюся в течение 3 секунд с помощью воздушного шприца или поместите вспомогательное устройство большого объема непосредственно на пропитал. Перед нанесением связующего отсасывание дентин слева внимательно. Не высушивайте.
5) ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении раствора Contopro™ (CH) на зуб нанесите в этом месте. Слегка выдуйте и оставьте дентин слева внимательно перед нанесением связующего вещества.
6) Перейдите к шагу "Склеивание", приведенному ниже.

Связь
- Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Втирайте в дентин и нанесите кисть на эмаль.
- Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
- Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.

Использование – Восстановление протезов с пиковыми
1) Удалите все поверхностные, разделенные или особенные фрагменты сложного протеза.
2) Изолируйте зуб (зубы)сложной почти.
3) Подготовьте поверхностные поверхности протеза, как указано выше в разделе "Подготовка подложки перед склеиванием/ремонтом". Обязательно следуйте инструкциям по травлению.
4) Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Втирайте в естественные зубы, следуйте "Прямого склеивания" для опорной области восстановительной.
5) Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
6) Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.
7) Удалите грязь и мусор с поверхности протеза.
8) Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Не высушивайте.
9) Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
10) Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.
11) Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Не высушивайте.
12) Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
13) Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.
14) Удалите грязь и мусор с поверхности протеза.
15) Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Не высушивайте.
16) Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
17) Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.
18) Удалите грязь и мусор с поверхности протеза.
19) Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Не высушивайте.
20) Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
21) Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.
22) Удалите грязь и мусор с поверхности протеза.
23) Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Не высушивайте.
24) Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
25) Отверждение светом в течение 10-20 секунд с помощью прожектора для отверждения светом с интенсивностью 2 800 мВт/см2 в расстоянии для кожи 385-515 нм.

Использование – Метод прямого склеивания

Травление
Эмаль самотравления – Дентин/эмаль.
1) Изолируйте зуб (зубы).
2) Промойте и высушите подготовленный участок.
3) Нанесите на подготовленный участок жидкость самотравления на протравленный зуб в течение 20 секунд, непрерывно перемешивая дентин. Не грите эмаль.
4) Разбавляющуюся в течение 3 секунд с помощью воздушного шприца или поместите вспомогательное устройство большого объема непосредственно на пропитал. Перед нанесением связующего отсасывание дентин слева внимательно. Не высушивайте.
5) ПРИМЕЧАНИЕ: При нанесении раствора Contopro™ (CH) на зуб нанесите в этом месте. Слегка выдуйте и оставьте дентин слева внимательно перед нанесением связующего вещества.
6) Перейдите к шагу "Склеивание", приведенному ниже.

Связь
- Нанесите тонкий слой клея Peak Universal Bond. Втирайте в дентин и нанесите кисть на эмаль.
- Агрегатно распределяйте с помощью воздуха в течение 10 секунд. Это отличается от первого соединения, поскольку важно обеспечить достаточное количество растворителя для испарения растворителя-носителя и воды.
-