

Cement Endo-Eze™ MTAFlow™ (Ošetřovací materiál na kořen a dřeň)

Popis: Systema prášku a kapaliny, jehož **Endo-Eze™ MTAFlow™** je tvrdě oděšeným cementem, pro zajištění nepropustnosti, anorganičným práškem křemičtan třípyrované a dvoypyrované, který se poji gelym na bázi vody pro nespojití umístění.

Indikace k použití: Cement **Endo-Eze MTAFlow** je určen k použití při zubních zákrocích, které jsou v kontaktu se zubní a periodontálními tkáněmi.

- Dentální perforace
- Pulpotomie
- Překýtní dent
- Dentální postupy, které mohou být ve styku s periodontálními tkáněmi.
- Plnění kořenových kanálků.

2. Aplikace
3. Ochrana perforace
4. Kořenová resorpce

Kontraindikace: 1. hypersenzitivita proti živým roztokům (s výskypm grg), nikoliv pro deznické kořenových kanálků.

2. Nepoužívejte pro primární zubní pulpulitomy (ošetření vyplněním kořenového kanálku, pokud není přítomen tvrdý zub).
3. Nepoužívejte pro sekundární zubní pulpulitomy (ošetření vyplněním kořenového kanálku, pokud není přítomen tvrdý zub).

Směr použití: **Dávkovací prášek:** Lzeva použít pouze, abyste prášek načechrali. 2. Pomocí přiložené lžičky použijte 1 lžičku prášku (viz doporučené množství v tabulce 1) na přiloženou směsovací podložku (ze pouzdi skříně). Použijte okraj směsovacího nástroje v směru prášku ve směru.

Dávkovací gel: 3. Lahvičkovitá zátka: Ujistěte se, že je všechny gel koncentrace v hubici lahve předtím, než začne kapat. 4. Každou užítí použijte a dávkujte kapky gelu (viz doporučené množství v tabulce 1) z gelové lahve.

POZNÁMKA: Plastičtá látka je dost drš, aby při vidět gel koncentrací zátka vytlačila všechny bubliny uvnitř gelu. Vyvarujte se vzniku vzdušných bublin uvnitř gelu. Pokud je nutné provádět více pospápných pohybů, zkontrolujte, že gel je ve správné hloubce, před dokončením kapek.

U některých postupů může být požadována řídká konzistence. Níže uvedené množství 1 ml může být použito jako reference pro dosažení řídké konzistence materiálu **Endo-Eze MTAFlow** k umístění.

Tabulka 1. Doporučená přibližná množství prášku a gelu, která se mají používat s různými konfiguracemi, kterých je třeba dosáhnout.					
	Překýtní dent, perforace, dentové komory a pulpotomie	Resorpce, aplikace, plnění kanálků, aplikací	Plnění kořenových kanálků, aplikací		
	Prášek (měřicí lžice)	2 velké kony (0,26 g)	1 velký konec plus 1 malý konec (0,19 g)	1 velký konec plus 1 malý konec (0,19 g)	
	Gelové kapky	2 kapky	3 kapky	1 kapka**	
	Dávkovací hrot	Mikrohrot (20 ga)	Hrot Navitip™ (29 ga)	Dávkovací štítky	
	Konzistence	Hustá	Řídká	Trmel	

*Hrot Navitip™ není součástí sad. **Počítaje 1 kapkou gelu, ale předtím více, dokud se nedosáhne požadované konzistence.

POZNÁMKA: Další prášek nebo gel je přidáván během míchání nebo bry pro smíchání, aby se dosáhlo požadované konzistence.

5. Pomocí kování zvěřky na cement postoupit promíchávací gel do prášku, dokud není dosaženo požadované konzistence. Důkladně promíchejte špatky, abyte zajiště, že jsou všechny částice prášku hydratny. Na rozdíl od jiných cementů MTA, které používají vodu a mají frakci písčovou konzistenci, bude cement **Endo-Eze MTAFlow** po smíchání křemíkem a homogení.

POZNÁMKA: Cement **Endo-Eze MTAFlow** použijte okamžitě po smíchání nebo vložte do dřeň dokováci štítky. Cement **Endo-Eze MTAFlow** může být použit po dobu až 15 minut po smíchání. **Ujistěte se, že uvnitř štítků není žádný vzduch.**

7. Cement umístěte za použití určeného hrotu na místo ošetření.

Aplikace: **Překýtní dřeň a pulpotomie** 1. Dokončete přípravu odvrtou dutinu pod izolaci kompozitní hmoty.

2. Vytvářte vedlekovou zátkovou strukturu za pomoci kruhové frézy při nížke rychlosti nebo použijte ruční nástroj.

Křemíkový dřeň 1. Jemně opláchněte sterilním solným roztokem.

2. Krvácení kontrolujte tlakem na okrajův dřeň pomocí navlečeného tamponu navlečeného fyziologickým roztokem.

3. Prášek a gel **Endo-Eze MTAFlow** musí být uchovávaný dobře utěsněně. Lahvičku otevřete pouze třemi plnými a jediným kořenovým dřeň. Pokud je v mzdě 2 mm pod úrovň spojení cementu a skloviny.

4. Použijte kompozitní materiál (PermaFlo) pro vyplnění kořenového kanálku (bže bodu gutaperčy). Po odstranění kompozitu může být umístěn na dřeň pomocí opakovaného ošetření velmi obtížně.

5. NepOUŽÍVJETE cement **Endo-Eze MTAFlow** v oblastiach zubu, které jsou v kontaktu s gingiválním sulcusem.

6. NepOUŽÍVJETE v pacienti se známou citlivostí na křemíčtan třípyrované.

Nežádoucí účinky: Cement k ústní skříně může způsobit reverzibilní akutní bolest, pokud se dostane do kontaktu s netěsnou pastou.

Interakce s jinými dentálními materiály: Není známa.

Sklovinizace: Sklovinizace při poklovení teplotě (25 °C / 75 °F): neskládaje v chladivé teplotě 25 °C / 75 °F; uzavřené. Vlhkost snižuje trvanlivost materiálu. Expozice gelu způsobí vysušení a případnou tvorbu filmu na spíně lahve.

Kořenová resorpce (externí resorpce iniciovaná v periodontu a dosahující do prostoru zubní dřeň)

Endo-Eze™ MTAFlow™ Cement (시멘트) (치근 및 치수 치료 매뉴얼)

설명: **Endo-Eze™ MTAFlow™** 분말 및 액체 / 응체 체계로 미세한 불투석성 이산화삼 수산화칼슘과 이산화규소로 구성된 고형체로, 설정 시간 동안에 의해 밀착된다.

주: 치근관 흡수 또는 골 결손을 위해서는 Endo-Eze MTAFlow 시멘트를 실제 MTA의 시멘트와는 사용하지 마십시오.

치근관 흡수 또는 골 결손의 회복을 위해선 개관된 치근관 흡수 또는 괴사된 치수 있는 치아에 Endo-Eze MTAFlow를 사용하여 치근관 충전 진행을 통해 유도할 수 있습니다.

근관 치료: 1. 초기 설정 (복합) 2. 가습한 건조 치근관 및 조직에 접촉하는 치과 시술은 Endo-Eze MTAFlow 시멘트와 치과 시술은 다음과 같이 수행됩니다.

POZNÁMKA: NEPOUŽÍVJETE cement **Endo-Eze MTAFlow** nebo jakýkoli cement na bázi MTA k opravě cervikálních resorpce.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Aspekické (k vyplnění kalcifikované bariéry v kořeni s otevřeným vrcholem nebo pokračujícími zubními stěvy) neuplňuje vytvořeného kořenu v zubu s nekrotickou dřeň.

Odstařte pastu s hydroxidem vyplněným UltraCal XS (jednu nebo dvě pasty) pomocí vyplněným hrotem. Umístěte dočasno vyplň. Vělni me doporučení ponechat léčebnou dobu 2 vělni mezi ošetřeními.

Endo-Eze™ MTAFlow™ 粘台剂 (牙根及牙髓治疗材料)

说明: **Endo-Eze™ MTAFlow™** 粉末及液体 / 凝胶体系由极细的不透射线硅酸三钙和硅酸二钙无机粉末组成, 与水基凝胶剂共同安装以改进填充效果。

适应证: **Endo-Eze MTAFlow 粘台剂** 用于使用牙根和根组织相互接触的牙科手术有:

1. 牙髓切断术 2. 根管治疗 3. 根尖成形术 4. 根尖切除术 5. 穿孔修复术 6. 牙根吸收

禁忌症: 1. 牙髓炎 (高 pH) 溶液过敏, 不适用于根管消毒 2. 主要根管侧切 (根管充填治疗, 后续永久齿冠) 不适用 (与侧切无关) 3. 使用 EDTA 18% 溶液进行最终冲洗, 使用具有细管管针的真空转移器有助

使用注意: 1. 推动牙根使粉末变得湿润 2. 使用提供的酒精, 将 1 平方厘米粉末 (参见表 1 中建议的剂量) 放在 所提供的混合凝胶中 (见表 1), 以便与根胶剂混合, 使用牙科刮刀将凝胶中的粉末。

3. 根尖切除术 3. 确保在滴下凝胶之前将注射器尖端浸入 3-4mm 的根管中, 然后将凝胶注入。将凝胶注入后, 将注射器尖端浸入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

4. 穿孔修复术 4. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

5. 牙根吸收 5. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

6. 牙根吸收 6. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

7. 牙根吸收 7. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

8. 牙根吸收 8. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

9. 牙根吸收 9. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

10. 牙根吸收 10. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

11. 牙根吸收 11. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

12. 牙根吸收 12. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

13. 牙根吸收 13. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

14. 牙根吸收 14. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

15. 牙根吸收 15. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

16. 牙根吸收 16. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

17. 牙根吸收 17. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

18. 牙根吸收 18. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

19. 牙根吸收 19. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

20. 牙根吸收 20. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

21. 牙根吸收 21. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

22. 牙根吸收 22. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

23. 牙根吸收 23. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

24. 牙根吸收 24. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

25. 牙根吸收 25. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

26. 牙根吸收 26. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

27. 牙根吸收 27. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

28. 牙根吸收 28. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

29. 牙根吸收 29. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。

30. 牙根吸收 30. 使用 Navitip™ 将凝胶注入根管中, 然后将凝胶注入凝胶中, 从而形成 3-4mm 的根尖凝胶。建议使用低粘度的 **Endo-Eze MTAFlow** 凝胶 (见表 1), 并使用 Navitip™ 传送。