

EN Opalescence® Pro In-Office Professional Whitening System **Product Description:** Opalescence™ Pro 40% hydrogen peroxide whitening gel is for in-office use only. The 2-barrel mixing syringe ensures maximum strength for each application and precise dosing of the activator. One barrel contains a unique chemical activator, which is combined with a second barrel containing hydrogen peroxide. Opalescence™ Pro whitening gel is intended to be used by trained dental professionals and can be used on patients of all ages and conditions requiring whitening treatment other than women who are nursing or pregnant. Any restrictions regarding patient populations can be found below in the Contraindications section. For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use. **Delivery Form(s):** • 1.2 ml Delivery Syringe • Recommended delivery tip • "Black Mini" Tip

Indications for Use/Intended Purpose Opalescence™ Pro whitening is for in-office use only. It is applied by the dental professional for whitening one or more teeth. Opalescence Pro in-office whitening is also used on non-vital teeth, including in-office intracanal whitening. Opalescence Pro in-office whitening is an alternative, conservative method (compared to crowns, veneers, etc.) for whitening dark, internally discolored teeth caused by predisposing factors such as disease, traumatic or iatrogenic injury, congenital, systemic, metabolic, or pharmacological influences. These can include but are not limited to elevated bilirubin levels, tetracycline and adult minocycline stains, porphyria, erythroblastos fetalis, and high fluoride intake during tooth development.

Contraindications • Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products. • Patients with active or pending allergy concerns, refer to product allergen document available at [ultradent.com/resources/product-allergens](#). If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions • Use only recommended tips. • Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow. • For patients with known tooth sensitivity, pre-op and post-op treatment with UltraT™ desensitizing gel, Opalescence™ Whitening Toothpaste Sensitivity Relief, and/or Enamelast™ fluoride varnish is recommended. • Some patients may experience temporary discoloration of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, consult your dental professional. • If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If product is aspirated, seek immediate medical attention. • Inform patients restorative materials will not whiten, and so we recommend whitening dark before restorative placement • Wait at least 7–10 days after whitening procedure before placing restorative materials. • Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to whitening. • Avoid contact with eyes. Rinse immediately if product comes into contact with them. • To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment. • Etching enamel or prophy paste polishing before any whitening procedure is not recommended and does not potentiate the whitening process but can cause additional irritation. • Restorations should be adequately sealed, and all exposed sensitive dentine should be covered. If a history of sensitivity exists, treat with appropriate restorative or blocking agent such as dentin bonding or temporarily with desensitizing agent or fluoride varnish. • Monitor patients' whitening progress to prevent whitening beyond the desired level of whitening or degree of translucency. • Rinse empty syringes and used tips thoroughly with water before disposal to avoid fire hazard. • Bring syringes to room temperature before mixing. • Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields when handling this product. • If gel is not used after mixing, do not use. It will not mix most properly. • If soft tissue sensitivity or irritation occurs, instruct patient to use an OTC oral topical anesthetic gel or vitamin E oil. • Contains sodium fluoride

Warnings Instructions Precautions 1)Do an oral exam and treat areas of concern, including but not limited to exposed dentin, decay, etc., prior to treatment. 2)Determine and record baseline shade. Use photographs when indicated for baseline documentation. **Use – Mixing Opalescence Pro In-Office Whitening** 1)Ensure syringes are securely attached. 2)Press the small clear plunger into the middle small clear syringe to rupture internal membrane and combine whitener and activator. 3)Press the plunger of the red syringe, pushing all contents into the clear syringe. 4)Press the contents of the clear plunger completely back to the red syringe. 5)Thoroughly mix activator with whitening gel, push stems back and forth continually and mix 25 times each side. 6)Press 1ml mixed gel into the red syringe. 7)Twist to separate the two syringes and securely attach the recommended tip (Black Mini) onto the red syringe. 8)Verify flow, consistency, and that the color is red before applying intraorally. If resistance is felt, replace tip and re-check. If gel is not red, do not use and refer to Step 2 in the "Use – Mixing Opalescence Pro In-Office Whitening" section.

Endodontically Treated Teeth: 1)Establish the expectations of the patient. Explain any esthetic limits before proceeding. Before photos are recommended. 2)Verify healthy periodontal tissues and quality endodontic treatment. 3)Remove all restorative and root sealing material from the coronal pulp chamber, 2–3 mm below healthy gingiva. Place a 2 mm thick conventional glass ionomer, resin modified glass ionomer, or bonded flowable composite resin to seal the endodontically treated canal. 4)If use of material before proceeding. 4)Follow "Isolation" instructions above isolating both the labial and lingual sides of the tooth. 5)Express gel into access opening and onto the labial and the lingual surface. Do not seal the access opening. Do not use as a walking bleach. 6)Allow patient to remain for 20 minutes per application. 7)Section gel from the tooth surface and discard. 8)When no gel is visible, lightly rinse and dry. Use caution not to dislodge the isolation barrier or rubber dam seal. 9)Evaluate shade change and repeat, if necessary. 10)Clean "Cleanup" instructions to remove gingival barriers. 11) Seal access with a preferred barrier in access preparation using a cotton pellet and allowing a minimum 2–3 mm thickness for temporary restorative material such as J-Temp™ temporary resin or UltraTemp™ temporary cement. 12) Wait 7–10 days following whitening procedure before placing the permanent restoration as whitening materials interfere with bonding agents.

• If additional whitening is desired, re-schedule and repeat the Opalescence™ Pro in-office whitening procedure above or use Opalescence™ Endo whitening. • Regression is to be expected. Follow-up maintenance treatment every 3–5 years is recommended. • If you have any questions regarding this product, please find additional information at [ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-pro](#).

Pressing Instructions 1)To avoid cross-contamination, wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use. **Storage and Disposal** Store according to outer package label. • Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations. • Before disposal of syringes aspirate water manually, demande au patient d'utiliser un gel d'assèchement et sécher à l'air libre. • Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne l'utilisez pas. Il n'a pas été mélangé correctement. • En cas de sensibilité ou d'irritation des tissus mous, demande au patient d'utiliser un gel d'assèchement et sécher à l'air libre. • Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne l'utilisez pas. Il n'a pas été mélangé correctement. • En cas de sensibilité ou d'irritation des tissus mous, demande au patient d'utiliser un gel d'assèchement et sécher à l'air libre. • Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne l'utilisez pas. Il n'a pas été mélangé correctement.

Miscellaneous Information • Hypocalcified areas (white spot lesions), which may not be visible to the naked eye, will whiten faster, thereby becoming more obvious during whitening. Continue whitening treatment until the unaffected tooth surface blends. Re-evaluate two weeks after whitening treatment when tooth color has stabilized. • For a small percentage of the population, their teeth will not appreciably whiten. • Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal. • Teeth can re-stain over time, so do touch up teeth whitening treatments as necessary. Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority. [ultradent.com / 800.552.5512 / 801.572.4200](#)

Système professionnel d'éclaircissement en cabinet Description du produit Le gel d'éclaircissant au peroxyde d'hydrogène Opalescence™ Pro 40% est réservé à un usage en cabinet. La séringue de mélange à 2 cylindres assure une action maximale pour chaque application et un dosage précis de l'activateur. Un cylindre contient un activateur chimique unique, qui est combiné à un second cylindre contenant du peroxyde d'hydrogène. Le gel d'éclaircissant Opalescence™ Pro est destiné à être utilisé par des professionnels dentaires formés et peut être utilisé chez des patients de tous âges et présentant toutes les affections nécessitant un traitement d'éclaircissement, à l'exception des femmes enceintes ou allaitantes. Toute restriction concernant les populations de patients figure ci-dessous dans la section Contre-indications. Pour tous les produits décrits et avant toute utilisation, veuillez lire attentivement et veiller à bien comprendre toutes les instructions et les informations de la SDS. **Mode(s) d'application** • Séringue d'application de 1,2 ml • Embout d'application recommandé • "Black Mini" Tip

Indications d'utilisation/Utilisation prévue L'éclaircissement Opalescence Pro est réservé à une utilisation en cabinet. Il est appliqué par des professionnels des soins dentaires pour éclaircir une ou plusieurs dents. L'éclaircissement Opalescence™ Pro en cabinet est également utilisé sur les dents non vitales, y compris les dents présentant des facteurs prédisposants tels qu'une maladie, une blessure traumatique ou iatrogène, des influences congénitales, systémiques, métaboliques ou pharmacologiques. Ces dents peuvent être incluses, mais ne sont pas limitées à: l'hyperbilirubinémie, les taches de tétracycline et de minocycline chez l'adulte, de porphyrie, d'érythroblastose fœtale et d'un apport élevé de fluor pendant la période de développement des dents.

Contre-Indications • Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas utiliser de produits d'éclaircissement dentaire. • Pour les patients ou allergies ayant des préoccupations liées aux allergènes, consulter le document sur les allergènes du produit disponible à l'adresse [ultradent.com/resources/product-allergens](#). Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions • N'utiliser que les produits recommandés • Évitez tout contact direct de la surface active du produit d'éclaircissement dentaire avec les gencives et/ou le flux salivaire • Les patients présentant une sensibilité dentaire connue, un traitement préopératoire et postopératoire avec du gel désensibilisant UltraT™, dentifrice éclaircissant Opalescence™ pour dents sensibles et/ou le vernis fluor Enamelast™ doivent être traités avec précaution • Certains patients peuvent ressentir une sensibilité temporaire au niveau des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation, ou en cas de gêne importante, appelez votre professionnel des soins dentaires. • Si le produit est ingéré, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consultez immédiatement un médecin. • Informez les patients que les matériaux de restauration n'éclaircissent pas, nous recommandons d'éclaircir les dents foncées avant la mise en place de la restauration. • Attendez au moins 7 à 10 jours après les procédures d'éclaircissement avant de placer du gel, rincer à l'eau abondamment et sécher à l'air libre. • Les patients souffrant de problèmes de santé graves doivent consulter leur médecin traitant avant le traitement. • Éviter tout contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux. • Pour éviter toute irritation supplémentaire, il convient d'évaluer la santé gingivale et la santé bucco-dentaire générale avant d'entamer le traitement. • Le mordançage de l'émail ou le polissage à l'abrasif abrègent l'efficacité de tout produit d'éclaircissement n'est pas recommandé et ne potentielise pas le processus d'éclaircissement, mais peut provoquer une sensibilité. • Les restaurations doivent être correctement scellées et toute la dentine sensible exposée doit être recouverte. En cas d'antécédents de sensibilité, traiter avec une restauration appropriée ou un agent bloquant tel que le collage de la dentine ou temporairement avec un agent de scellement de la dentine ou un vernis fluore. Surveillez les progrès du patient en matière d'éclaircissement afin d'éviter qu'il ne dépasse le niveau d'éclaircissement ou le degré de translucidité souhaité. • Rincer soigneusement les séringes vides et les embouts utilisés avec de l'eau avant de les jeter pour éviter tout risque d'incendie. • Amener les séringes à température ambiante avant de les mélanger. • Les patients et les professionnels des soins dentaires doivent porter des lunettes de protection avec des écrans latéraux lorsqu'ils manipulent le produit d'éclaircissement. • Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne l'utilisez pas. Il n'a pas été mélangé correctement. • En cas de sensibilité ou d'irritation des tissus mous, demande au patient d'utiliser un gel d'assèchement et sécher à l'air libre. • Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne l'utilisez pas. Il n'a pas été mélangé correctement.

Contraindications • Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas utiliser de produits d'éclaircissement dentaire. • Pour les patients ou allergies ayant des préoccupations liées aux allergènes, consulter le document sur les allergènes du produit disponible à l'adresse [ultradent.com/resources/product-allergens](#). Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions • N'utiliser que les produits recommandés • Évitez tout contact direct de la surface active du produit d'éclaircissement dentaire avec les gencives et/ou le flux salivaire • Les patients présentant une sensibilité dentaire connue, un traitement préopératoire et postopératoire avec du gel désensibilisant UltraT™, dentifrice éclaircissant Opalescence™ pour dents sensibles et/ou le vernis fluor Enamelast™ doivent être traités avec précaution • Certains patients peuvent ressentir une sensibilité temporaire au niveau des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation, ou en cas de gêne importante, appelez votre professionnel des soins dentaires. • Si le produit est ingéré, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consultez immédiatement un médecin. • Informez les patients que les matériaux de restauration n'éclaircissent pas, nous recommandons d'éclaircir les dents foncées avant la mise en place de la restauration. • Attendez au moins 7 à 10 jours après les procédures d'éclaircissement avant de placer du gel, rincer à l'eau abondamment et sécher à l'air libre. • Les patients souffrant de problèmes de santé graves doivent consulter leur médecin traitant avant le traitement. • Éviter tout contact avec les yeux. Rincer immédiatement si le produit entre en contact avec les yeux. • Pour éviter toute irritation supplémentaire, il convient d'évaluer la santé gingivale et la santé bucco-dentaire générale avant d'entamer le traitement. • Le mordançage de l'émail ou le polissage à l'abrasif abrègent l'efficacité de tout produit d'éclaircissement n'est pas recommandé et ne potentielise pas le processus d'éclaircissement, mais peut provoquer une sensibilité. • Les restaurations doivent être correctement scellées et toute la dentine sensible exposée doit être recouverte. En cas d'antécédents de sensibilité, traiter avec une restauration appropriée ou un agent bloquant tel que le collage de la dentine ou temporairement avec un agent de scellement de la dentine ou un vernis fluore. Surveillez les progrès du patient en matière d'éclaircissement afin d'éviter qu'il ne dépasse le niveau d'éclaircissement ou le degré de translucidité souhaité. • Rincer soigneusement les séringes vides et les embouts utilisés avec de l'eau avant de les jeter pour éviter tout risque d'incendie. • Amener les séringes à température ambiante avant de les mélanger. • Les patients et les professionnels des soins dentaires doivent porter des lunettes de protection avec des écrans latéraux lorsqu'ils manipulent le produit d'éclaircissement. • Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne l'utilisez pas. Il n'a pas été mélangé correctement.

1)Appliez le gel des dents à l'aide du Luer Vac et du SST (Surgical Suction Tip) ou d'une pointe d'aspiration chirurgicale. Pour éviter les éblouissements ou le gel, n'utilisez pas d'eau lorsqu'il y a du gel. Lorsqu'il n'y a plus de gel, rincez légèrement et séchez à l'air libre. Veillez à ne pas déloger la barrière d'isolation ou la dique en caoutchouc étanche. 2)Appliez le gel de la surface de la dent et de la cavité d'accès à l'aide du Luer Vac et du SST (Surgical Suction Tip) ou d'une pointe d'aspiration chirurgicale. Pour éviter les éblouissements ou le gel, n'utilisez pas d'eau lorsqu'il y a du gel. Lorsqu'il n'y a plus de gel, rincez légèrement et séchez à l'air libre. Veillez à ne pas déloger la barrière d'isolation ou la dique en caoutchouc étanche. 3)Appliez le gel des dents à l'aide du Luer Vac et du SST (Surgical Suction Tip) ou d'une pointe d'aspiration chirurgicale. Pour éviter les éblouissements ou le gel, n'utilisez pas d'eau lorsqu'il y a du gel. Lorsqu'il n'y a plus de gel, rincez légèrement et séchez à l'air libre. Veillez à ne pas déloger la barrière d'isolation ou la dique en caoutchouc étanche. 4)Évaluez le changement de teinte et répétez si nécessaire. 5)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 6)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 7)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 8)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 9)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 10)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 11)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 12)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 13)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 14)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 15)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 16)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 17)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 18)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 19)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 20)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 21)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 22)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 23)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 24)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 25)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 26)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 27)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 28)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 29)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 30)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 31)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 32)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 33)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 34)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 35)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 36)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 37)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 38)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 39)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 40)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 41)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 42)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 43)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 44)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 45)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 46)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 47)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 48)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 49)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 50)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 51)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 52)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 53)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 54)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 55)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 56)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 57)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 58)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 59)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 60)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 61)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 62)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 63)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 64)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 65)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 66)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 67)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 68)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 69)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 70)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 71)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 72)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 73)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 74)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 75)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 76)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 77)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 78)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 79)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 80)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 81)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 82)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 83)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 84)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 85)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 86)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 87)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 88)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 89)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 90)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 91)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 92)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 93)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 94)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 95)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 96)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 97)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 98)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 99)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 100)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 101)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 102)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 103)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 104)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 105)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 106)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 107)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 108)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 109)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 110)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 111)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 112)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 113)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 114)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 115)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 116)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 117)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 118)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 119)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 120)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 121)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 122)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 123)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 124)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 125)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 126)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 127)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 128)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 129)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 130)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 131)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 132)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 133)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 134)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 135)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 136)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 137)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 138)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 139)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 140)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 141)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 142)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 143)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 144)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 145)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 146)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 147)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 148)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 149)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 150)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 151)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 152)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 153)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 154)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 155)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 156)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 157)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 158)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 159)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 160)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 161)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 162)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 163)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 164)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 165)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 166)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 167)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 168)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 169)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 170)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 171)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 172)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 173)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 174)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 175)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 176)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 177)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 178)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 179)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 180)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 181)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 182)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 183)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 184)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 185)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 186)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 187)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 188)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 189)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 190)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 191)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 192)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 193)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 194)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 195)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 196)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 197)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 198)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 199)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 200)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 201)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 202)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 203)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 204)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 205)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 206)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 207)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 208)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 209)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 210)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 211)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 212)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 213)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 214)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 215)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 216)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 217)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 218)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 219)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 220)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 221)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 222)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 223)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 224)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 225)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 226)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 227)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 228)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 229)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 230)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 231)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 232)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 233)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 234)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 235)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 236)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 237)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 238)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 239)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 240)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 241)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 242)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 243)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire et linguale de la dent. 244)Appliquez le gel dans la cavité d'accès et sur la surface vestibulaire

