

EN UltraTemp™ REZ II Temporary Resin Cement

Product Description
UltraTemp™ REZ II temporary resin cement is a low viscosity, temporary filling/milling material featuring a hydrophilic resin-based formula which is recommended for the retention of provisional restorations or provisional prostheses. UltraTemp REZ II temporary resin cement may also be used for temporary restorative procedures (i.e., provisional crowns, bridges, inlays, and onlays). It is available in Fast Set (1 to 2 minutes) and Regular Set (2 to 3 minutes).

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Forms

- 5 ml Dual Barrel Syringe
 - UltraLent Mixing Tip
 - NOTE: If expressing intraorally, preload a delivery syringe (i.e., 0.5 ml Skin-Spray™) and use intraoral delivery tip (e.g., Black Mini™ tip).
- Indications for Use/Intended Purpose**
For temporization of provisional prosthesis or restorative procedures (i.e., provisional crowns, bridges, inlays, and onlays).

Device	Set Time
UltraTemp REZ II temporary resin cement - Regular Set	2-3 minutes
UltraTemp REZ II temporary resin cement - Fast Set	1-2 minutes

Cleanup

- Remove provisional or temporary restoration.
- Remove residual cement with hand instrument.
- Clean preparation with pump-up-type slurry and cup or put UltraTemp REZ II into a container with chlorhexidine antibacterial slurry with STABrush™ intercoronal brush.
- Follow manufacturer's instructions for cementation.

Warnings and Precautions

- Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with eyes, skin, and soft tissue.
- Do not use on patients with known or suspected sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.
- Do not use UltraTemp REZ II temporary resin cement with peroxide-based chemicals (i.e., walking bleach).
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen information available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have patient consult their physician.

First aid instructions

- Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with eyes, skin, and soft tissue.
- Do not use on patients with known or suspected sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.

Step-by-step instructions
NOTE: Periodics will negatively affect the set of UltraTemp REZ II temporary resin cement.

Preparation

- Prior to attaching mixing tip, verify uniform flow from both syringe orifices by expressing a small amount onto a mixing pad. Use caution not to cross-contaminate.

IT UltraTemp™ REZ II Cemento resino provvisorio

Descrizione del prodotto
UltraTemp™ REZ II temporary resin cement is a low viscosity, temporary filling/milling material featuring a hydrophilic resin-based formula which is recommended for the retention of provisional restorations or provisional prostheses. UltraTemp REZ II temporary resin cement may also be used for temporary restorative procedures (i.e., provisional crowns, bridges, inlays, and onlays). It is available in Fast Set (1 to 2 minutes) and Regular Set (2 to 3 minutes).

Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza prima dell'uso.

Avvertenze e precauzioni

- Resine possono essere sensibilizzanti. Evitare il contatto ripetuto con resine dentali non polimerizzate con occhi, pelle e tessuti molli.
- Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota ad acrilati o ad altri tipi di resine. In caso di reazione allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee, il paziente deve consultare il proprio medico.
- Non utilizzare il cemento resino provvisorio UltraTemp REZ II su sostanze chimiche a base di perossido (per es. agenti sbiancanti).
- Per pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento ai documenti sulle allergie presentati nel prodotto disponibile all'indirizzo www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e far controllare il paziente da un medico.

Istruzioni procedurali

NOTE: I periodici incidono negativamente sull'indimento del cemento resino provvisorio UltraTemp REZ II.

Dispositivo	Tempo di indurimento
Cemento resino provvisorio UltraTemp REZ II - indurimento normale	2-3 minuti
Cemento resino provvisorio UltraTemp REZ II - indurimento rapido	1-2 minuti

Preparazione

- Prima di inserire il puntale di miscelazione, verificare che il flusso del materiale da entrambi gli orifizi della siringa sia uniforme espressiono una piccola quantità sul tavolo di miscelazione. Fare attenzione a non contaminare gli orifizi con il prodotto.

Preparazione

- Prima di inserire il puntale di miscelazione, verificare che il flusso del materiale da entrambi gli orifizi della siringa sia uniforme espressiono una piccola quantità sul tavolo di miscelazione. Fare attenzione a non contaminare gli orifizi con il prodotto.

Preparazione

- Prima di inserire il puntale di miscelazione, verificare che il flusso del materiale da entrambi gli orifizi della siringa sia uniforme espressiono una piccola quantità sul tavolo di miscelazione. Fare attenzione a non contaminare gli orifizi con il prodotto.

DA UltraTemp™ REZ II Midleridigjarkemert

Produktbeskrivelse
UltraTemp™ REZ II midleridigjarkemert er et midleridigt restorations-/fuldmærket med lav viskositet med en hydrofil partikkelbaseret formel, der anbefales til afbæring af midlertidige restorationer eller midlertidige proteseer. UltraTemp REZ II midleridigjarkemert kan også bruges til midlertidige genopretningsprocedurer (dvs. foreløbige kroner, broer, inlays og onlays). Det er tilgængeligt i Fast Set (1-2 minutter) og Regular Set (2-3 minutter).

Læs og forstå alle instruktioner og SDS-informationer for alle de beskrevne produkter omfattende inden brug.

Leveringsudrustning

- 5 ml dobbeltbarrel-sprøjte
- UltraLent blandingspibe
- BEWARE! Hvis det trykkes ind intraoralt, skal du fylde en sprøjte (f.eks. 0,5 ml Skin-Spray™) på forhånd og bruge en intraoral afbæringstip (f.eks. Black Mini™-tip)

Indikationer for brug/brugt formål
For temporær afbæring af midlertidige proteseer og genopretninger (dvs. foreløbige kroner, broer, inlays og onlays).

Advarsler og forsigtighedsregler

- Harpikar kan være sensibiliserende. Undgå gentagende kontakt mellem uhærdet tandharpik og øjne, hud og blødt væv.
- Undgå krysforurening af sprøjtebøjlerne, der kan skyldes gentagne fastgørelser af den samme bøjlerinddeling.
- Skal holdes væk fra øjne.

Trinvis instruktion
BEWARE: Periodics vil påvirke afbindingen af UltraTemp REZ II midleridigjarkemert negativt.

Forberedelse

- Inden båndstændingen sættes på, skal det sikres, at materialet flyder frit ud fra begge orificer. Verificer ved tryk en lille smule på på en blandingsplade. Vær forsigtig med ikke at krydskontaminere åbningerne, når sprøjten lukkes.
- Sæt båndstændingen på ved at justere de indvendige

Enhed	Fastset tidspunkt
UltraTemp REZ II midleridigjarkemert - Almindelig afbinding	2-3 minutter
UltraTemp REZ II midleridigjarkemert - Hurtig afbinding	1-2 minutter

Renigering

- Fjern foreløbig eller midlertidig restorering.
- Fjern resterende cement med håndinstrument.
- Rengør præparatet med en opløsning af pimpsten og/eller UltraLent Consep™[®] Strabrush[™] -klorhexidind antibakteriel opløsning med STABrush™ intercoronal børste.
- Følg producentens anvisninger for cementering.

Forberedelse
Til intraoral brug (sprøjte): Sprøjte og afleveringspudse betrages som et engangsbrug.

Til dobbeltbarrel: Ikke intraoral brug, men sprøjten er med et beskyttelsesdæksel til midlertidige mellem-tidlige anvendelser. Fik alle båndstændinger mellem anvendelser.

Opbevaring og bortskaffelse
Bortskaff alle affald skal være i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapporter eventuel alvorlig hendelse til producenten og den lokale sundhedsmyndighed.

Informations vev
Signale eventuelle krav indsendt af fabrikanten e/til autoritetsinstanser.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

BG UltraTemp™ REZ II Временен резин цемент

Описание на продукта
Временният резин цемент UltraTemp™ REZ II е нисковискозитетен, временен запълваещ/изпълваещ материал с хидрофилна формула, който е препоръчан за временна реставрация или временни протези. Временният резин цемент UltraTemp REZ II може да се използва и за временни реставративни процедури (т.е. временни корони, мостове, вложки и онлай). Той е наличен в Fast Set (1 до 2 минути) и Regular Set (2 до 3 минути).

За всички описани продукти внимателно прочетете и разберете всички инструкции и информацията в SDS(информационен лист за безопасност) преди употреба.

Форми на доставяне

- 5 ml двойна барел спрей
- UltraLent смесителна пипета
- BEWARE! Ако експонирането интраорално, предварително заредете спрейката с достъпа до 0,5 ml спрей (Skin Spray™) и използвайте интраорална апликационна глава (например Black Mini™ наръчник)

Показания за употреба / Предназначение
За временна подготовка или възстановителни процедури (т.е. временни корони, мостове, вложки и онлай).

Предпазни мерки

- Resins могат да бъдат sensibilizing. Избягвайте повторен контакт с неутвърдени зъбни смолы с очите, кожата и меките тъкани.
- Не използвайте на пациенти с известна чувствителност към акрилатите или други типове на смоли. Ако се наблюдава чувствителност към акрилатите или други типове на смоли, пациентите трябва да консултират своя лекар.
- Не използвайте UltraTemp REZ II временен смолен цемент с перокси базирано средство за отбеливане (т.е. бяла паста).

Инструкции за употреба / Предназначение
NOTE: Periodics ще повлияят негативно на компетентността на UltraTemp REZ II временен смолен цемент.

Подготовка

- Преди да приложите върха за смесване, проверете равномерния поток от двете отвори на спрейката, като изстискате малко количество върха подготвена за смесване. Внимавайте да не замърсите пръстите си отвори при повтаряно зареждане на спрейката.

DE UltraTemp™ REZ II Provisorischer Harzement

Produktbeschreibung
UltraTemp™ REZ II ist ein provisorisches Befestigungs-/Fullmalerit mit niedriger Viskosität und einer Formel auf der Basis eines hydrophilen Harzes, das für die Retention provisorischer Restaurationen/Prothesen empfohlen wird. Der provisorische Nachstellzement UltraTemp REZ II kann auch für provisorische Restaurationen/Verfahren (d. h. provisorische Kronen, Brücken, Inlays und Onlays) verwendet werden. Er ist als Schnellhärtend (1 bis 2 Minuten) und als Normalhärtend (2 bis 3 Minuten) erhältlich.

Für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgfältig alle Anweisungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.

Lieferformen

- 5 ml Doppelschmelzspitze
- UltraLent Mischkanüle
- BEWARE! Falls intraoral verwendet werden muss, eine Abgabespritze (z. B. 0,5 ml Skin-Spray™) vorab und eine intraorale Abgabekopfzelle (z. B. Black Mini™) verwenden.

Indikationen/Verwendungszweck
Zur temporären Befestigung provisorischer Prothesen oder restaurativer Verfahren (d. h. provisorische Kronen, Brücken, Inlays und Onlays).

Kontraindikationen

- Nicht bei Patienten mit bekanntem Empfindlichkeits gegen Polycarboylate (Polycarboylat) anwenden.
- Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegen Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss Arzt aufsuchen, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.
- Den provisorischen Harzement UltraTemp REZ II nicht zusammen mit Chemikalien für Permanent-Bleach verwenden (z. B. 8,4 inntern Bleaching).
- Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien Allergien-Informationen verfügbar unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den empfohlenen Branding gründlich reinigen und/oder einen Arzt konsultieren, bevor der Patient seinen Arzt konsultiert.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Häute können sensibilisierend sein. Vermeiden Sie den Kontakt von ungehärtetem Dentalharz mit Augen, Haut und Weichteilgewebe vermeiden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit empfindlichen Oberflächen, die durch wiederholtes Anbringen derselben Mischung entstehen können.
- Von den Augen fernhalten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Häute können sensibilisierend sein. Vermeiden Sie den Kontakt von ungehärtetem Dentalharz mit Augen, Haut und Weichteilgewebe vermeiden.
- Vermeiden Sie Kontakt mit empfindlichen Oberflächen, die durch wiederholtes Anbringen derselben Mischung entstehen können.
- Von den Augen fernhalten.

Schrittweise Anleitung
HNWEEK: Periodics wirken sich negativ auf das Aushärten von provisorischem UltraTemp REZ II-Harzement aus.

Vorbereitung

- Vor dem Anbringen der Mischung den gleichmäßigem Oberflächen aus beiden Spritzenöffnungen überprüfen, indem Sie eine kleine Menge auf einen Amalgamblock herausdrücken. Vorsicht: Waschen lassen, damit Sie beim Verschleiden der Spitze keine Kratzer auf dem Material verursachen.
- Die Mischung anheben, indem Sie die innere

Verarbeitung
Zur intraoralen Anwendung (Abgabespritze): Abgabespritze und Kanüle vor der erstmaligen Gebrauch/Für Doppelspritzen: Nicht zur intraoralen Anwendung verwenden. **Die Spritze zwischen den Anwendungen mit desinfizierender Konzentration waschen. Die Mischkanüle nicht zwischen den Anwendungen entfernen.**

Laugung
ENTWASSERUNG: (Hier die Anforderungen zur Lagerung aus der Produktspezifikation entnehmen.)

Sonstige Angaben
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle Hersteller- und zuständigen Behörden zu melden. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

ES UltraTemp™ REZ II Cemento de resina temporal

Descripción del producto
UltraTemp™ REZ II temporary resin cement is a low viscosity, temporary filling/milling material featuring a hydrophilic resin-based formula which is recommended for the retention of provisional restorations or provisional prostheses. UltraTemp REZ II temporary resin cement may also be used for temporary restorative procedures (i.e., provisional crowns, bridges, inlays, and onlays). It is available in Fast Set (1 to 2 minutes) and Regular Set (2 to 3 minutes).

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

Preparación

- Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la siringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mezcladora.

FI UltraTemp™ REZ II Välikäsitelmä harjamentti

Tuotteen kuvaus
UltraTemp™ REZ II välikäsitelmä harjamentti on alhaisen viskositeettin välikäsitelmä (medi) aluviskositeettin välikäsitelmä, joka sisällyttää hydrofiilisen hartosäätöaineen koostumuksen, joka suostuttaa välikäsitelmä restorointiin tai välikäsitelmä proteseisiin. UltraTemp REZ II välikäsitelmä harjamentti voidaan käyttää myös tilapäisiin korjauksitempporeihin (eli välikäsitelmä kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti). Se on saatavana Fast Set (1-2 minuuttia) ja tavallisessa sarjassa (2-3 minuuttia).
Lue ennen käyttöä huolellisesti ja ymmärrä kaikki kuvausten sisältämät ohjeet ja käyttöohjeet valmistajan kanssa.

Toimitusluokitus/luokittelu

- 5 ml kaksoisruokaspray
- UltraLent annostelupöytä
- BEWARE! Jos intraorally käytetään, tulee käyttää suojaspray (esim. 0,5 ml Skin-Spray™) etukäteen ja intraorallinen sovelmuspäätä (esim. Black Mini™-kärki).

Käyttö- ja varoitustiedot/turvatiedot

- Älä käytä potilaita, joilla on tunnettu herkkyys polykarboylateille (polykarboylaatille).
- Älä käytä potilaita, joilla on tunnettu herkkyys akrylaateille tai muille hartesille, joihin allerginen reaktio, ihottuma tai ihottuma kehityy, kehota potilasta ottaa yhteyttä lääkäriin.
- Älä käytä välikäsitelmä UltraTemp REZ II -hartesmenttiä samaan aikaan välikäsitelmä kemikaalien kanssa (esim. Permanent Bleach™).
- Käsittele allergioita koskevia tuotteen turvallisuusohjeita, joihin on saatavana lisätietoja www.ultradent.com.
- Älä käytä välikäsitelmä UltraTemp REZ II välikäsitelmä harjamenttia korjauksien yhteydessä.
- Säilytä materiaali viileässä, suojattu valolta ja kosteudesta.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

Välikäsitelne/turvatiedot
Välikäsitelne/turvatiedot (eli välikäsitelne kruunuihin, silloihin, upotuksiin ja päällekiikasti) on suojattu.

FR UltraTemp™ REZ II Ciment provisoire en résine

Description du produit
Le ciment provisoire en résine UltraTemp™ REZ II est un matériau de scellement/obturation provisoire à faible viscosité doté d'une formule à base de résine hydrophile qui est recommandé pour la rétention des restaurations provisoires ou des prothèses provisoires. Lc ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II peut également être utilisé pour les procédures de restauration provisoires (c-à-d couronnes provisoires, bridges, inlays et onlays). Il est disponible avec temps de prise rapide (1 à 2 minutes) et avec temps de prise normale (2 à 3 minutes).

Pour tous les produits décrits, lire attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la SDS avant utilisation.

Typé(s) d'application

- Seringa à double cylindre de 5 ml
- UltraLent mélangeuse
- REMARQUE: En cas d'application intra-orale, précharger une seringue d'application (par exemple, une seringue Skin Spray™ de 0,5 ml) et utiliser une pointe d'application intra-orale (par exemple, embout Mini™) avant.

Indications d'utilisation/Utilisation prévue
Pour la temporisation des protèses provisoires ou de procédures de restauration (c-à-couronnes provisoires, bridges, inlays et onlays).

Contre-indications

- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue à l'acide poly-carboxylique (poly-carboxylate).
- Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates ou à d'autres résines. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développent, le patient doit consulter un médecin.
- Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue à l'acide poly-carboxylique (poly-carboxylate).
- UltraTemp REZ II ne doit pas être utilisé en même temps que des produits chimiques à base de peroxyde.
- Ne pas utiliser sur des patients présentant une sensibilité connue aux acrylates ou à d'autres résines. Si une réaction allergique est observée, rinses abondamment la zone exposée à l'eau et demandez au patient de consulter son médecin.

Avvertissements et précautions

- Les résines peuvent être sensibilisantes. Éviter le contact répétitif des résines dentales non polymérisées avec les yeux, la peau et les tissus mous.
- Éviter la contamination croisée des orifices de la seringue ou d'autres outils restants. Se rincer les mains avec de l'eau avant de mélanger.
- Ne pas utiliser de produits contenant des agents oxydants avec les yeux.

Instructions de précaution
REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

REMARQUE: Les périodes affecteront négativement la prise du ciment provisoire en résine UltraTemp REZ II.

