

EN UltraTemp™ REZ II Temporary Resin Cement

Product Description
UltraTemp™ REZ II temporary resin cement is a low viscosity, thymol-free/filling material featuring a hydrophilic resin-based formula which is recommended for the retention of provisional restorations or procedural prostheses. UltraTemp REZ II temporary resin cement may also be used for temporary restorative procedures (i.e., provisional crowns, bridges, inlays, and onlays). It is available in Fast Set (1 to 2 minutes) and Regular Set (2 to 3 minutes).

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Forms

- 5 ml Dual Barrel Syringe
 - UltraLid Mixing Tip
 - NOTE: If expressing intraorally, pre-load a delivery syringe (3 cc, 0.5 ml Sani-Spray®) and use intraoral delivery tip (e.g., Black Mini™ Tip)
- Indications for Use/Intended Purpose**
For temporization of provisional prosthesis or restorative or prosthetic (i.e., provisional crowns, bridges, inlays, and onlays).

Contraindications
Do not use on patients with known sensitivities to polycrylic acid (polyacryloylate).
Do not use on patients with known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.
Do not use UltraTemp REZ II temporary resin cement with peroxide-based chemicals (e.g., walking bleach).

For patients or users with allergy concerns, refer to product allergic reaction information available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions
Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with eyes, skin, and soft tissue.
Do not cross-contaminate any restorative material which could result from repeatedly attaching the same mixing tip.
Keep away from eyes.

Step-by-Step Instructions
NOTE: Peroxide will negatively affect the set of UltraTemp REZ II temporary resin cement.

Preparation
1) Prior to attaching mixing tip, verify uniform flow from both syringe orifices by expressing a small amount onto a mixing pad. Use caution not to cross-

contaminate orifices when re-capping syringe.

- Attach mixing tip by lining up internal cap seams with syringe orifices. Twist clockwise to lock.
 - Clean, rinse, and dry preparation.
- Use – Temporary Cementation**

- Express desired amount of UltraTemp REZ II temporary resin cement into provisional restorations.
 - Seat provisional.
 - As material sets, remove all excess cement around provisional with a hand instrument.
- Use – Temporary Restoration**

- Preload delivery syringe and firmly attach delivery tip.
- Verify flow prior to applying intraorally. If resistance occurs, replace tip of syringe orifice.
- Express desired amount of UltraTemp REZ II temporary resin cement into preparation.
- After complete set, adjust occlusion if necessary.

Cleanup

- Remove provisional or temporary restoration.
- Remove residual cement with hand instrument.
- Clean preparation with pump-cure-type acrylic and cure per UltraTemp REZ II instructions.
- Apply chlorhexidine antibacterial slurry with STABrush™ intercoronal brush.
- Follow manufacturer’s instructions for cementation.

Processing

For intraoral use (delivery syringe): Delivery syringe and UltraTemp REZ II resin cement are single-use items. **Do not dilute/bare!**
Not for intraoral use, wine syringe with an intermediate level disinfectant between uses. Do not remove mixing tip between uses.

Storage and Disposal
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information
Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultradent.com | 1-800-552-5512 | 801-572-4200

IT UltraTemp™ REZ II Cemento resino provvisorio

Descrizione del prodotto
UltraTemp™ REZ II è un cemento resinopolimerizzabile a bassa viscosità caratterizzato da una formula a base di resina idrofili, consigliata per la ritenzione di restaurazioni provvisorie e protesi procedurali. UltraTemp REZ II può essere utilizzato anche per procedure di restauro temporaneo (ad es. corone, ponti, inlay e onlay provvisori). È disponibile in tempo di indurimento rapido (da 1 a 2 minuti) e cemento a indurimento normale (da 2 a 3 minuti).

Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza prima dell'uso.

Formita

- Siringa a doppia camera da 5 ml
- Punta di miscelazione UltraLid
- NOTA: Se occorre la testina intraorale, precaricare una siringa di somministrazione (ad es. Siringa Skin da 0,5 ml) e utilizzare la punta di erogazione intraorale (ad es. la punta Black Mini™)

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto
Per la temporizzazione di protesi provvisoria o procedure di restauro (ad es. corone, ponti, inlay e onlay provvisori).

Controindicazioni

- Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota all'acido poliacrilico (poliacrilato).
- Non utilizzare su pazienti con sensibilità nota agli acrilati o ad altri tipi di resine. In caso di reazione allergiche, dermatiti o eruzioni cutanee, il paziente deve consultare il proprio medico.
- Non utilizzare i cementi resinopolimerizzabili UltraTemp REZ II su sostanze chimiche a base di perossido (per es. agenti sbiancanti).
- Per i pazienti o utenti con problemi di allergie, fare riferimento ai documenti sul rischio allergico, reperibili nel prodotto descritto all'indirizzo www.ultradent.com. Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la pelle interessata e far controllare il paziente da un medico.

Avvertenze e precauzioni
Le resine possono essere sensibilizzanti. Evitare il contatto ripetuto con resine dentali non polimerizzate con occhi, pelle e tessuti molli.
Evitare la contaminazione incrociata degli orifizi della siringa.
Non utilizzare la stessa siringa per applicazioni ripetute, poiché ciò potrebbe portare all'accumulo di residui di miscelazione.
Tenere lontano dagli occhi.

Informazioni procedurali
NOTA: I perossidi incidono negativamente sull'indurimento del cemento resinopolimerizzabile UltraTemp REZ II.

Preparazione
1) Prima di inserire il puntale di miscelazione, verificare che il flusso del materiale da entrambi gli orifizi della siringa sia uniforme erogando un piccolo quantitativo di materiale. Fare attenzione a non contaminare gli orifizi.

Dispositivo	Tempo di indurimento
Cemento resino provvisorio UltraTemp REZ II - Indurimento normale	2-3 minuti
Cemento resino provvisorio UltraTemp REZ II - Cura rapida	1-2 minuti

Polita
Previsivo:

- Remove il restauro provvisorio o temporaneo.
- Remove il cemento residuo con uno strumento man mano.
- Pulire la preparazione con pasta a base di pomice applicata su una cospina e la pasta antibatterica ad acqua a base di clorexidina (Ultradent Consep™-E-penello) intracoronal STABrush™.
- Seguire le istruzioni del produttore per la cementazione.

Conoscere l'ambiente di lavoro
Informazioni varie
Segnalare eventuali gravi incidenti al produttore e alle autorità competenti.
www.ultradent.com | 1-800-552-5512 | 801-572-4200

Nota: I perossidi incidono negativamente sull'indurimento del cemento resinopolimerizzabile UltraTemp REZ II.

DA UltraTemp™ REZ II Midlertidig hæringscement

Produktbeskrivelse
UltraTemp™ REZ II midlertidig hæringscement er et midlertidig hæringscement-fyllmateriale med lav viskøsitet med en hydrofil hæringscement-formel, der anbefales til afbæring af midlertidige restaureringer eller midlertidige proteseer. UltraTemp REZ II er tilgængeligt i hurtig sætning og normalt sætningstid.
UltraTemp REZ II er også tilgængeligt til midlertidige genopretningsprocedurer (dvs. foreløbige kroner, broer, inlays og onlays).
Det er tilgængeligt i hurtig sætning (1 til 2 minutter) og Regular Set (2 til 3 minutter).

Læs og forstå alle instruktioner og oplysninger for alle de beskrevne produkter omfattende indligning brug.

Levingsbetingelser

- 5 ml dobbeltbarrel - sprøjte
- UltraLid blandingspibe
- BEMÆK: Hvis det kræves en intraoral, skal du fylde en sprøjte (fx 0,5 ml Sani-Spray®) på forhånd og bruge en intraoral afløbingsrør (fx Black Mini™-sp)

Indikationer for brug/brugst formål
For temporær cementation af midlertidige proteseer eller genopretningsprocedurer (dvs. foreløbige kroner, broer, inlays og onlays).

Contraindikationer

- Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed overfor polyacrylate (polyacrylat).
- Må ikke anvendes på patienter med kendt følsomhed overfor acrylates eller andre hæringsmaterialer. Hvis der opstår allergiske reaktioner, dermatitis eller udslæt, skal patienten konsultere deres læge.
- Brug ikke UltraTemp REZ II midlertidig hæringscement med peroxidbaserede kemikalier (dvs. gule blegemiddel).

For patienter eller brugere med allergi problemer, henvises til produkt allergi information, tilgængelig på www.ultradent.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion syntes det eksterne område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.

Advarsel og forsigtighedsregler
Hæringsmaterialer kan være sensibiliserende. Undgå gentagende kontakt mellem uhærdet tandhængs med øjne, hud og blødt væv.
Undgå krydskontaminering af sprøjtebænder, der kan skyldes gentagne fastgørelser af den samme blandingspibe.
Skal holdes væk fra øjne.

Trivise instruktioner
BEMÆK: Peroxid vil påvirke afbindingen af UltraTemp REZ II midlertidig hæringscement.
Førebredelse

- Inden blandingen sættes på, skal det sikres, at materialet flyder jævnt ud af begge orificier. For at sikre et ensartet udtryk er det vigtigt at bruge UltraTemp REZ II materialer med samme blandingspibe.
- Sæt blandingspibe på ved at justere de indvendige

hættekåber med sprøjtebænderne. Drej den i urets retning og tryk den på plads.

Bruk - Midlertidig cementering
1) Udfør den ønskede mængde midlertidig UltraTemp REZ II i midlertidig hæringscement.
Sæt servopapir på plads.
Fjern alt overskyedende cement omkring midlertidig restorering og pålæknings.
2) Efter fuldstændig afbinding syntes okkulation, hvis det er nødvendigt.

Opskrivning og bortskaffelse
Bortskaff alle affald skal være i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger
Rapportér eventuelle alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.
www.ultradent.com | 1-800-552-5512 | 801-572-4200

BG UltraTemp™ REZ II Временен стоматол цемент

Описание на продукта
Временният стоматол цемент UltraTemp™ REZ II е нисковискозитетен материал с хидрофилна формула, който се препоръчва за задържане на временни реставрации или временни протези. Временният стоматол UltraTemp REZ II може да се използва и за временни възстановителни процедури (т.е., временни корони, мостове, вливайки и онлай). Той е наличен в бърз и нормален режим на curing (2 до 3 минути).

За всички описани процедури внимателно прочетете и разберете всички инструкции и информацията в SDS (информационен лист за безопасност) преди употребата.

Формата и доставката

- 5 мл сдвоен barrels - spray
- UltraLid mixing tip
- BEMARK: Ако е необходимо, използвайте интраорална, предварително зарежена с пръчка за доставка (напр. 0,5 ml SaniSpray®) и интраорален отливачен тръка (напр. Black Mini™). Наредбата

Показания за употреба / Предназначение
За временна протезия или възстановителни процедури (т.е., временни корони, мостове, вливайки и онлай).

Противопоказания

- Да не се използва при пациенти с известна чувствителност или непоносимост към полиакрилат (полякрилат).
- Не използвайте при пациенти с известна чувствителност към акрилати или други смоли. Ако се наблюдават алергични реакции или обрив, помолете Вашия лекар да се консултира с Вашия лекар.

Помислене

- Премахнете временното покритие или временното възстановяване.
- Отстранете остатъците (смоли) с ръчни инструменти.
- Формирайте чистота конструкция.
- Използвайте UltraLid Consep™-E скрабче.
- Използвайте UltraLid Consep™-E скрабче интракоронално антибактериално скраб с миделна четка STABrush™ интракоронално скрабче.
- Следвайте инструкциите за предотвратяване за циментация.

Обработване
За интраорална употреба (потиска Спринк):
За интраорална употреба, изпреварете първо интраоралната употреба, след което използвайте пръчката за доставка за външна употреба.
За двойна цвят:
Не преработвайте материал в интраорална употреба, ако материалът вече е използван за външна употреба. Не преработвайте смесването във външна употреба.

Помислене инструкции
BEMARK: Пероксидите ще повлияят негативно на композитния слой на UltraTemp REZ II.

Подготовка
1) Преди да приложите върха за смесване, проверете равномерното поле от двете отвора на съринката, като нанесете малко количество върха подготвка за съхранение. Внимавайте да не замърсите пръчката със слези отвор при повтаряно зареждане на съринката.

DE UltraTemp™ REZ II Provisorisches Härzungemittel

Produktbeschreibung
UltraTemp™ REZ II ist ein provisorisches Befestigungs-Füllmaterial mit niedriger Viskosität und einer Formel auf der Basis eines hydrophilen Harzes, das für die Retention provisorischer Restaurationen/Prothesen empfohlen wird. Der provisorische temporäre UltraTemp REZ II kann auch für provisorische Restorative Verfahren (d. h., provisorische Kronen, Brücken, Inlays und Onlays) verwendet werden. Er ist als schnellhärtend (1 bis 2 Minuten) und als normalhärtend (2 bis 3 Minuten) erhältlich.

Für alle beschriebenen Produkte zur Verwendung sorgfältig alle Anweisungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.

Lieferformen

- 5 ml Doppelfarbiges Mischspritz
- UltraLid Mischspitze
- BEMARK: Falls intraoral verwendet werden muss, eine Abgabespitze (z. B. 0,5 ml SaniSpray®) und eine intraorale Abflöhrtröhre (z. B. Black Mini™) verwenden.

Indikationen/Verwendungsgebiete
Für die temporäre Befestigung provisorischer Prothesen oder restaurativer Verfahren (d. h., provisorische Kronen, Brücken, Inlays und Onlays).

Contraindikationen

- Nicht bei Patienten mit bekanntem Empfindlichkeits gegen Polyacrylate (Polyacrylat) anwenden.
- Nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegen Acrylate oder andere Harze anwenden. Der Patient muss seinen Arzt konsultieren, wenn allergische Reaktionen, Dermatitis oder Hautausschlag auftreten.
- Den provisorischen Härzungemittel UltraTemp REZ II nicht zusammen mit Chlorhexidin-antibakterieller Spülung (z. B. bei interkoronaler Spülung) verwenden.
- Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien oder bei Allergiesymptomen konsultieren Sie Ihren Arzt unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser und Seife waschen und den Arzt konsultieren.

Warnhinweise und Vorichtsmaßnahmen

- Harze können sensibilisierend sein. Das wiederholte Kontakt von ungehärtetem Dentalharz mit Augen, Haut und Weichteilgewebe vermeiden.
- Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen vermeiden, die durch wiederholtes Anbringen derselben Mischkanüle entstehen kann.
- Von den Augen fernhalten.

Schrittweise Anleitung
HINWEIS: Peroxide wirken sich negativ auf das Aushärten von provisorischem UltraTemp REZ II-Härzungemittel aus.

Vorbereitung
Vor der Anwendung des Härzungemittels den gleichnamigen Anweisungen aus beiden Sprachversionen überlesen, indem Sie eine kleine Menge auf einen Amalgamblock herausdrücken. Vorsicht wachen lassen, damit kein Verschleiser der Spitze durch kleine Kratzer entstehen. Waschen Sie die Mischkanüle ausbreiten, indem Sie sie innen

reinigen.
Verarbeitung

- Harze können sensibilisierend sein. Das wiederholte Kontakt von ungehärtetem Dentalharz mit Augen, Haut und Weichteilgewebe vermeiden.
- Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen vermeiden, die durch wiederholtes Anbringen derselben Mischkanüle entstehen kann.
- Von den Augen fernhalten.

Schrittweise Anleitung
HINWEIS: Peroxide wirken sich negativ auf das Aushärten von provisorischem UltraTemp REZ II-Härzungemittel aus.

Vorbereitung
Vor der Anwendung des Härzungemittels den gleichnamigen Anweisungen aus beiden Sprachversionen überlesen, indem Sie eine kleine Menge auf einen Amalgamblock herausdrücken. Vorsicht wachen lassen, damit kein Verschleiser der Spitze durch kleine Kratzer entstehen. Waschen Sie die Mischkanüle ausbreiten, indem Sie sie innen

reinigen.
Verarbeitung

- Harze können sensibilisierend sein. Das wiederholte Kontakt von ungehärtetem Dentalharz mit Augen, Haut und Weichteilgewebe vermeiden.
- Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen vermeiden, die durch wiederholtes Anbringen derselben Mischkanüle entstehen kann.
- Von den Augen fernhalten.

Schrittweise Anleitung
HINWEIS: Peroxide wirken sich negativ auf das Aushärten von provisorischem UltraTemp REZ II-Härzungemittel aus.

ES UltraTemp™ REZ II Cemento de resina temporaria

Descripción del producto
UltraTemp™ REZ II es un material de cemento/temporización de baja viscosidad con una fórmula a base de resina hidrofílica que se recomienda para la retención de restauraciones provisionales y protesis provisionales. UltraTemp REZ II también se puede utilizar para procedimientos de restauración temporales (por ej. coronas provisionales, puentes provisionales). Está disponible en fraguado rápido (de 1 a 2 minutos) y fraguado regular (de 2 a 3 minutos).

Por todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Presentación

- Jeringa de doble barril de 5 ml
- Punta de mezcla UltraLid
- NOTA: Si se necesita usar intraoral, precargue una jeringa de 0,5 ml y use una punta de administración intraoral (por ejemplo, la punta Black Mini™)

Indicaciones de uso/Fin previsto
Para la temporización de protesis provisionales o procedimientos de restauración (de dietis, coronas, puentes, inlays y onlays provisionales).

Contraindicaciones

- No usar en pacientes con sensibilidades conocidas al ácido poliacrílico (poliacrilato).
- No utilizar en pacientes con una sensibilidad conocida a los acrilatos u otras resinas. Si se desarrolla una reacción alérgica, dermatitis o erupción, haga que el paciente consulte a su médico.
- No use cemento de resina temporal UltraTemp REZ II en productos químicos a base de peróxido (por ejemplo, blanqueadores dentales).

Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, referirse al documento de información sobre reacciones alérgicas disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, lavar minuciosamente con agua y jabón que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones

- Las resinas pueden ser sensibilizantes. Evite el contacto repetido de la resina dental sin curar con los ojos, la piel y los tejidos blandos.
- Evite la contaminación cruzada de los orificios de la jeringa que podría resultar de colocar repetidamente la misma punta mezcladora.
- Manténgase alejado de los ojos.

Instrucciones paso a paso
NOTA: Los peróxidos afectan negativamente el fraguado del cemento de resina temporal UltraTemp REZ II.

Preparación
1) Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la jeringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mojada.

Preparación
1) Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la jeringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mojada.

Preparación
1) Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la jeringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mojada.

Preparación
1) Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la jeringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mojada.

Preparación
1) Antes de colocar la punta mezcladora, verifique el flujo uniforme de ambos orificios de la jeringa administrando una pequeña cantidad en una almohadilla mojada.

FI UltraTemp™ REZ II Väikikesktemporaine

Tuote kuvaus
UltraTemp™ REZ II väikikesktemporaine on alhaisen viskositeetin väikikesktemporaine. Väikikesktemporaine, joka sisältää hydrofiilisen hartosäätöainekseen, suositellaan väikikesktemporaineiden, temporeiden ja protsessien säätöaineksenä. UltraTemp REZ II väikikesktemporaine voidaan käyttää myös tilapäisiin korjauksiin/tempporeihin (eli väliaikainen kruunutus, silloitus, upotukset) ja väikikesktemporaineita käytetään (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja intraorale poistopöytä (esim. Black Mini™-kärki).

Käyttö - väikikesktemporaine
1) Purista haluttu määrä väikikesktempo UltraTemp REZ II väikikesktemporaineita korjauksien kohtaan.
2) Suojaa väikikesktemporaineita.
3) Kun materiaali on kuivaunut, poista kaikki ylimääräinen seos materiaalin vakausta ja kiinnittävyyttä lisäämällä.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Toimitusolosuhteet

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

Käyttö - väikikesktemporaine

- 5 ml kaksoisruuven suukappale
- UltraLid sekoituspöytä
- HUOMAUTUS: Jos tarvitaan intraorale käyttöä, lataa suukappale (esim. 0,5 ml Sani-Spray®) ja käytä suukappale antotehkä korjauksien kohtaan.

</

