

Gleo Fluord lakk 5% nátrium-fluorid lak

Termékleírás

Az Gleo Fluord lakk (szettelt, vízellátó tartályú, 5%-os nátrium-fluorid tartalmú) szettelt formában valóban tartósan, illetve leírás szerinti használati elől figyelemmel a használati és az értelmezése az összes utasítás és a biztonsági ajánlat (SDS) alapján.

Szállítási körök (pak)

- 10 l-es műanyag
- Feherítő ecet

Használati javallatok/ellenjavallatok

Az Gleo Fluord lakk 5% nátrium-fluorid lakkezelőanyag, amely mechanikus eltarozódó okra a dentinbelsőszobokba a fogak eltarozódásának kezelésében.

Ellenjavallatok

Nem fogynálkodó állapotban vagy gyulladásgátló szerekkel (antibiotikumok) nem lehet használni. Nem használja olyan betegnek, akik szívet érintő enyhén az egészségre, beleértve a fenyőgátakat (kolofonumot) illetve gyógyszerkezelést. Ha allergia reakció, rögzítés vagy bőrirritáció létezik forduljon orvoshoz.

A vámalány allergiával küzdő betegek számára a termék használatát a termék leírás a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A betegnek, a szakszónak és az orvostudományi felsővezetőnek az alábbiak szerint kell eljárni:

Részt esetében először a dextrán tartályt be kell tölteni Fluord lakk szettelt, majd a dextrán tartályt szettelt be kell tölteni az asztmás gyermekével. Ha az előírt, alaposan mosson fogat, hogy a dextrán tartályt szettelt be kell tölteni, és kerje meg a beteg, hogy forduljon orvosához.

A gyermekek számára a termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

Utasítás

Utasítás, ha az érzékelés továbbra is fennáll, ez esetben alaposan öblítse le a lakkezelőt.

Nem használja más helyi fluoridok kezelését, illetve igazgatója a nagy és utasítás a csoporthoz, hogy a kezelés után 4 (négy) napig ne használja az orális fluoridok kezelését, így a fluoridok kezelését.

Csak tiszta és fertőtlenített műszert használjon a cső felvételéhez.

Használati elől ne találja el a pupákat a tubusról.

Lépekénti útmutató

- 1) Alaposan mosson fogat, polírozza le a fogakat, vagy törölje le a gézzel a fogakat, hogy a fluoridok kezelését.
- 2) Használati elől (a páza fel a cső).

Használat

- 1) Száraz kezelési terület.
- 2) Helyezze a tubuscső a szájba, és vágja fel a cső hegyét egy tiszta és fertőtlenített műszert.
- 3) Vezesse a terméket egy tiszta felületre.
- 4) Egy eldobható fluorid tartályt vegyen le helyére, miközben a fluorid lakk a lehető legjobban lefolyik.

MEGJEGYZÉS

Az Gleo Fluord lakk 5% nátrium-fluorid lakkezelőanyag után 4-6 órával a betegnek kerülniük kell a fogmosást és a fogkezelést használatát. Ha a beteg nem jár orvoshoz, akkor a termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokumentumot, amely a termék használatát, az orvos által tanácsot, ha allergia reakció, rögzítés, az érintett területet alaposan öblítse le a termék használatát a beteges kezelésre az orvos.

A termék használatát a termék leírásának utasításokhoz dokument

Gleo Fluora laka 5% nātrija fluorida laka

Produkta apraksts

Gleo fluora laka ir aromatizēta, ar šķīdinātāju saturīga 5% nātrija fluorida sveķu šķīdums. Attiecībā uz visiem aprakstajam produktam pirmās līmēšanas rūgpiņi jābūt uz līmēšanas visus norādījumus un SDS instrukcijas.

Piegādes veidlapai(-s)

- 10 ml tīrība
- 100 ml tīrība
- 1000 ml tīrība

Līmēšanas indikācija/ pretzādzes ierībe

Gleo fluora laka ir 5% nātrija fluorida laka, kas rada mehānisku iedarbību karstā zobu šķīdumā, ārstējot zobu paaugstinātu jutību.

Kontraindikācijas

- Nelietot pacientiem ar čaulu ingurīnu vai stomatitu.
- Nelietot pacientiem ar zīmdu jūtību pret daudzu sastāvdaļu kā kolofonijas (kolophonium) un/vai rūsas, ja rodas alerģiska reakcija, dermatīts vai astūsmi, konsultējieties ar ārstu.
- Pacientiem vai lietotājiem ar alerģisku šķaudītu produktiem, kas satur nātriju, konsultējieties ar ārstu.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

- Pacientam, ārstam un asistentam jāvalkā aizsargbrilles.
- Pretto, ja pacientam pēc pāris minūšu laka lietošanas ir ānās parastu zobu bērnām ar astmu ir norādīts uzlabot.
- Ja tas notiek, rūpīgi iztīrīt zobus, lai novērstu laka iedarbību.
- Pacientiem sāpīgākas ar savu ārstu.
- Dāzeim pacientiem pēc uzlabošanas ar laka lietošanu jābūt ānās, ja nepieciešams, rūpīgi iztīrīt zobus, lai novērstu laka iedarbību.
- Pēc laka lietošanas lokālu lokālu fluora izdevumiem jābūt pāda dienā un norādīta pacientiem no perorālo fluora piederu lietošanas 4 (četrās) dienās ar ānās ānās.
- Caurules pārģiešana izmantojot tikai

uz to specifisku instrumentu.

- Nepieciešams vārdus no bērnības, kamēr nesāc gatavot zobu izmanto.

Pakāpiens instrukcijas

Sagatavošana

- 1) Pirms laka izmantošanas rūpīgi notīrīt zobus, norīrīt zobus ar gumijas kausiņu vai nosaukiet zobus ar fluoru.
- 2) Pirms līmēšanas labi sakarīt zobu virsmu.

Izmantošana

- 1) Atspirdzina zobus ar zonu.
- 2) Norimētos zobus vārdus un nogriezt zobus gaisa ar tīru un definītu instrumentu.
- 3) Izspiediet produktus uz tīras virsmas.
- 4) Izspiediet vienreizējo izmantojamu aplikatoru vai, lai iegādājamies vairākus virsmas uzlabu, gludu Gleo fluora laka šķīdumu.

PIEZĪME:

- Pacientiem jābūt ar zobu tīrību un zobu diegu lietošanas 4-6 stundas pēc ārstēšanas, ja iespējams, pagaidiet līdz nokāmajam rītam.
- Pacientiem jābūt norādītiem, ka karstiem ēdieniem un dzērieniem, kas ar lieliem saturiem saturīem (piemēram, dzeriem, mēks skābošanos izdevumiem) 1-4-6 stundas pēc ārstēšanas.
- Gleo fluora laka sāc līmēties ar katru skalu.
- Lai iegūtu maksimālu labumu, Gleo laka ar atkārtot uzskatīt ik pēc 3-4 dienām.

Uzglābšana un iztīrīšana

Uzglābāt saskaņā ar ārāja ieteikumiem etiēti.

Izmēliet atzīmētos saskaņā ar vietējiem noteikumiem, vajadzīgu un noteikumiem.

Uzglābšanas informācija

Zinoties ražotājam un kompetētajai iestādei par šīs laka lietošanu, lūdzam raksturot šīs laka lietošanu.

www.gleo-adult.com / 1 800 552 5512 / 801.572.4200

[illegible][illegible][illegible]

Gleo Lac cu fluor lac cu fluorură de sodiu 5%

Descrierea produsului

Gleo Lacul cu fluor este o fluorură de sodiu amorfă, indicată ca vitiolul, 5% într-un purtător de apă.

Pentru toate produsele descrise, atât cu aterosclerose și înalți în considerare toate informațiile și informațiile 125 înainte de utilizare.

Formă(e) de eliberare

- Tub de 10 ml
- Rezervă de aplicare

Indicații de utilizare/Scop prezoncat

Gleo Lacul cu fluor este 5% fluorură de sodiu într-un purtător de lac care produce o acțiune mică a tubului dentar în tratamentul hiperseparabilității dentare.

Contraindicații

- Nu se utilizează la pacienți cu o gingivită ulcerată sau stomatită.
- Nu se folosează la pacienți cu sensibilitate cunoscută la ingredientele, și/sau coloranți (polipropilenă). Dacă apar reacții alergice, consultați un medic după epuizarea tuturor surselor de informații.

Atenționări și precauții

- Pacienții, clinicienți și asistenții trebuie să poarte ochelari de protecție.
- În cazul unei umflături edematoase a țesuturilor după o rată raportată după un tratament extras cu lac de fluorizare și de despicare a țesuturilor, după aplicarea.
- Dacă se întâmplă acest lucru, spălați-vă bine de două ori pentru a îndepărta peluclă de lac și cereți pacientului să contacteze furnizorul medical.
- Unii pacienți pot prezenta greață și vomă.
- Dacă greața persistă, trebuie pentru a îndepărta peluclă de lac.
- Nu utilizați cu alte tratamente topice de lac în fluor în aceeași și în instruiți

pacienții să se abțină de la utilizarea suplimentelor orale cu fluor timp de 2 (patru) zile după tratament.

- Pacienții trebuie să utilizeze un instrument curăț și igienizat pentru a descheia tubul.
- Nu scoateți capacul din tub până când este complet uscat.
- Nu utilizați tubul de apă.

Instrucțiuni pas cu pas

Prescripție

- 1) Spălați-vă bine pe dinți, lăsați dinții uscați.
- 2) Aplicați un strat subțire de 1-2 mm sau stergeți dinți cu oțet înainte de aplicare.
- 3) Aplicați bine tubul înainte de utilizare.

Utilizare

- 1) Zona uscată de tratat.
- 2) Scoateți capacul tubului și țineți-l în vârful tubului cu un instrument curăț și igienizat.
- 3) Aplicați produsul pe o suprafață curată.
- 4) Utilizați o perie aplicată pe o suprafață uscată, folosiți pentru a aplica un strat subțire și neted de lac de Gleo pe cel mai mare suprafețe posibile.

NOTĂ:

- Pacienții trebuie să evite periaj și folosirea apă dentară timp de 6 ore după tratament. Dacă este posibil, așteptați până a doua zi dimineață.
- Pacienții trebuie să evite alimentele dure și fierbinți, pentru a evita posibilele reacții cunoscute alcool (de exemplu, băuturi, clătiri) care este timp de 4-6 ore după tratament.
- Pacienții trebuie să evite să se desprindă la fiecare aplicare.
- Pentru beneficii maxime, lacul Gleo 5% trebuie aplicat la fiecare 3-6 luni.

Depozitare și eliminare

A se păstra conform informațiilor de pe etichetă ambalajului original.

Eliminați deseurile în conformitate cu instrucțiunile de descărcare și reglementările locale.

Informații diverse

Raportat din cauza incident grav productiv și autorități competente.

www.rosnet.ro / 1 800 552 5512 / 801 572 4000

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ZH

Gleo 氟化漆 5% 氟化保护漆

产品描述

Gleo 氟化漆是一种加味的、水磨、增稠后的、树脂载体中含有 5% 氟化钠的漆。

对于所有涉及本产品, 请在阅读完下列说明并理解所有说明和 SDS 信息后, 再进行使用。

罐体标识

10 升装
20 升装

使用说明/预期用途

Gleo 氟化漆是将 5% 的氟化钠溶于漆中, 对木质小管产生机械磨损, 用于防止木材开裂。

禁忌

- 请勿用于患有过敏性哮喘或类似过敏的患者。
- 请勿用于已知对松香 (kopalohumen) 和/或树脂等成分敏感的患者。如果出现过敏反应, 请立即就医。
- 对于有过敏问题的患者, 在使用前, 请咨询您的产品供应商。
- 本产品提供的用户数据文件, 如果出现过敏反应, 请使用水彻底冲洗皮肤, 并让患者咨询医生。

警告和注意事项

- 患者、临床医生和手术必须戴防护眼镜。
- 在少数情况下, 经过广泛使用后, 患者可能会出现过敏反应, 并伴有皮疹。也有报告出现哮喘问题。如果发生这种情况, 请彻底刷牙以去除漆垢残留, 并让患者咨询他们的医生。
- 有些患者抹漆可能会感到恶心, 如果这种感觉仍然存在, 请彻底刷牙保护牙齿。
- 请勿在同一天与其他局部氟化物治疗一起使用, 并指导患者用治疗后 4 小时内不要使用任何氟化物补充剂。
- 仅使用清洁且无毒过的器械来

切牙管

- 在准备使用之前, 请取下管子的盖子。

分步说明

准备

1. 涂漆前彻底刷牙、用橡皮擦牙线检查或改用布擦拭牙管。
2. 使用前请充分湿润输送器。

操作

1. 干燥待治疗区域。
2. 打开盖子并用干净且消毒过的器械小心地刮去牙管上的漆。
3. 将产品挤至到牙管的表面上。
4. 使用一次性的涂抹器在尽可能多的表面上涂抹一层薄而光滑的 Gleo 氟化物清漆。

注意:

- 患者在治疗后的 4.6 小时内应避免刷牙或使用牙线, 如果可能的话, 等到第二天早上。
- 治疗后 4.6 小时内, 患者应避免食用热食和软饮料以及含酒精的产品 (例如饮料、果汁和啤酒)。
- Gleo 氟化物清漆每次刷牙时都会开始剥落。
- 为了获得最大效果, 可以每 3-6 个月重新涂漆一层 Gleo 清漆。

贮存和处置

按外包装标签规定条件贮存。
请遵守当地的法规, 准则和当地处理废物。

其他信息

向制造商和主审当局报告任何严重事件。

1.800.552.5512 / 801.572.4200

[illegible][illegible]

Gleo Florür Vernik %5 Sodium Florür Vernik

Ürün Açıklaması

Gleo Florür Vernik, bir reçine taşıyıcısına akrasol, kesiltili ile tanılamlarını %5 oranında içeren verniktir.

Açıklanan tüm ürünler için, kullanım öncesinde tüm zeminler ve SÖS (Göçürme Formları) tanımları ve alan bilgilerini dikkatlice okuyunuz ve anlayınız.

İletim Seçenekleri

- 10 m tip
- Uygulama larası

Kullanım Talimatları /

Kullanım Alanı

Gleo Florür Vernik, %5 asit hassasiyetinin tedavisinde derin bulaşmaların mekanik olarak çıkarılması ve ardından vernik taşıyıcısı %5 Sodium Florür Vernik.

Kontrendikasyonlar

- Ulsatırıcı dişi iletilahı veya stomatiti teşhisi olan hastalarda kullanılmıy.
- Alerjik reaksiyon (dermatit) veya reçine benzeri bileşenlere karşı baki bilinen bir hassasiyet olan hastalarda kullanılmıy.
- Hastanın derisi, gözleri, ağız ve burun dermatiti veya kızamıkçık gelişirse, bir doktora danışınız.
- Alerji testleri olan hastalar veya kulacın için için, www.ultradent.com/de bulunan ürün alerjisiye belgesine bakın. Alerjik reaksiyon gelişirse, maruz buloşu sonlandırmayı ve durulayın ve hastanın doktora danışmasını sağlayınız.

Uyarılar ve Notlar

- Hasta, kimyevi ve asistan koruyucu gözlük takmalıdır.
- Hasta duvarlarda, kapamları florür vernik kullanmadan önce derin dişlik ve astımlı cökürdeceksa önce derinli bıldırılmalıdır. Boyle bir durumda, vernik florür vernik kullanılmıy dişleri fırçalayın ve ağızdan tıbbi yardımı alınması sağlanıy.
- Bası hastalarında uygulama sonrası mide bulantısı görülebilir. Mide bulantısı devam ederse, vernik florür vernik kullanılmıy dişleri fırçalayınız.
- Ayn ve aynalı ağızda florür vernik tedavisi ile kullanılmıy ve hastaya tedavide

sonrakı 4 (dört) gün boyunca oral florür taşıyıcısı kullanılmakna kaçınılması söyleniy.

- Hastanın ağızda asit taşıyıcı ve sterilize edilmiş bir alet kullanılmıy.
- Kullanıma hazır olan dokta tipini kullanıy.

Görev Altı Talimatlar

Hazırlık

- 1) Yerleştirilmiş önce dişleri fırçalayın, lastik kap ile dişleri parlatıy ve dişleri gözle baki silin.
- 2) Kullanılmıy önce dişleri yıkayın.

Kullanım

- 1) Kiri aına uygulayınız.
- 2) Tüm kaplamı (kapın ve tipin ucunu temiz ve sterilize edilmiş bir aletle) temizleyiniz.
- 3) Üstünüm tırnağı yüzüne silin, pürüzsüz bir okuzuma (ok yüzüne) için, pürüzsüz bir Gleo Florür vernik tabakası uygulayınız. (ok tabakası kullanılmıy) aplikatör fırçası kullanılmı.

NOT:

- HASTA: Hastaların sonrasına 4-6 saat boyunca diş fırçalamıy ve diş için kullanılmakna kaçınılmazdır. Mükemmence etresi sabaha kadar bulaşır.
- Hastalar tedaviden sonrakı 4-6 saat boyunca sıkı yiyecek veya içecekleri yeme asırlı kereden ürütülür (örneğin, tıccesler, soğuk parçaları vb.) kaçınılmazdır.
- Gleo Florür vernik bir fırçalamada çok ileri dokulmaya bulaşır.
- Maksimum florür GİO Gleo vernik her 3-6 ayda bir yenisi uygulanıyabilir.

Depolama ve İmha

- Diş ağızla etkileşime girecek saklayın, tıccaz yerleri kurutunuz, yığılmeyeceği yerlere saklayınız.

Çerahi Bilgi
Herhangi bir ciddi ağız üreticisi ve yetkili makama bildiriniz.

www.ultradent.com / 1.800.552.5512 /

801.572.4200