EN

Opalescence™ Boost™ 40%

In-Office Tooth Whitening System

Product Description: Opalescence™ Boost™ 40% hydrogen peroxide whitening gel is for in-office use only. The 2-barrel jet mix syringe ensures maximum strength for each application and precise dosing of the activator. One barrel contains a unique chemical activator, which is combined with a second barrel containing hydrogen peroxide.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s):
- 1.2 ml Delivery Syringe
- Recommended Delivery Tip
  - Black Mini™ Tip.

Indications for Use/Intended Purpose
Opalescence Boost 40% whitening is for medical in-office use only. It is applied by the dental professional for bleaching one or more teeth. Opalescence Boost in-office whitening is also used on non-vital teeth, including in-office intracoronal bleaching. Opalescence Boost in-office whitening is an alternative, conservative method (compared to crowns, veneers, etc.) for bleaching dark, internally discolored teeth caused by predisposing factors such as disease, traumatic or iatrogenic injury, congenital, systemic, metabolic, or pharmacological influences. These can include but are not limited to elevated bilirubin levels, tetracycline and adult minocycline staining, porphyria, erythroblastosis fetalis and high fluoride intake during tooth development.

Contraindications
- Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
- For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, cease product use and immediately wash away with water and have the patient consult their physician

Warnings and Precautions
- Use only recommended tips.
- Avoid direct contact of the active surface of the tooth whitening product with the gums and/or salivary flow.
- For patients with known tooth sensitivity, pre-op and post-op treatment with Ultrafill™ desensitizing gel, Opalescence™ Whitening Toothpaste with Sensitivity Relief, and/or Enamelast™ fluoride varnish is recommended. Depending on the severity of sensitivity, other treatment options are available

Endodontically Treated Teeth:
1. Establish the extent/scope of the patient. Explain any esthetic limits before proceeding. Before photos are recommended.
2. Verify healthy periodontal tissues and quality endodontic treatment.
3. Remove all restorative and root sealing material from the coronal pulp chamber. 2–3 mm below healthy gingiva. Place a 2 mm thick conventional glass ionomer, resin modified glass ionomer, or bonded flowable composite resin to seal the endodontically treated root. Excess gel into a wet cotton pellet and discard.
4. Follow "Isolation" instructions above isolating both the labial and lingual sides of the tooth.
5. Express gel into access opening, and onto the labial and the lingual surface. Do not seal the access opening. Do not use as a walking bleach.
6. Allow gel to remain for 20 minutes per application.
7. Suction gel from the tooth surface and access opening using the Luer Vac and SST (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel splatter, do not use water while suctioning gel. When no gel is visible, thoroughly rinse and suction.
8. If using OpalBrush resin barrier, gently slide the tip beneath the resin barrier to remove or remove rubber dam
Notes: For patients with known tooth sensitivity, treatments pre- and post-tooth whitening with Ultrafill desensitizing gel, Opalescence Whitening Toothpaste with Sensitivity Relief, and/or Enamelast fluoride varnish is recommended. Depending on the severity of sensitivity, other treatment options are available

Endodontically Treated Teeth:
1. Establish the extent/scope of the patient. Explain any esthetic limits before proceeding. Before photos are recommended.
2. Verify healthy periodontal tissues and quality endodontic treatment.
3. Remove all restorative and root sealing material from the coronal pulp chamber. 2–3 mm below healthy gingiva. Place a 2 mm thick conventional glass ionomer, resin modified glass ionomer, or bonded flowable composite resin to seal the endodontically treated root. Express gel into a wet cotton pellet and discard.
4. Follow "Isolation" instructions above isolating both the labial and lingual sides of the tooth.
5. Express gel into access opening, and onto the labial and the lingual surface. Do not seal the access opening. Do not use as a walking bleach.
6. Allow gel to remain for 20 minutes per application.
7. Suction gel from the tooth surface and access opening using the Luer Vac and SST (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel splatter, do not use water while suctioning gel.
8. When no gel is visible, lightly rinse and air dry. Use caution not to dislodge the isolation barrier or rubber dam seal.
9. Evaluate shade change after each application and monitor patient for sensitivity and irritation. If persistent sensitivity occurs, discontinue use.
10. Repeat steps under section "Applying Opalescence Boost 40% In-Office Whitening" for no more than 3 applications if desired results have not been achieved. Do not exceed 3 applications per visit.
6. Refer as necessary using professional judgment.

Cleanup
1. Suction gel from teeth using the Luer Vac and SST (Surgical Suction Tip) or a surgical suction tip. To avoid gel splatter, do not use water while suctioning gel. When no gel is visible, thoroughly rinse and suction.
2. If using OpalBrush resin barrier, gently slide the tip beneath the resin barrier to remove or remove rubber dam
Notes: For patients with known tooth sensitivity, treatments pre- and post-tooth whitening with Ultrafill desensitizing gel, Opalescence Whitening Toothpaste with Sensitivity Relief, and/or Enamelast fluoride varnish is recommended. Depending on the severity of sensitivity, other treatment options are available

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
- Verwenden Sie nur empfohlene Applikationstipps.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der aktiven Oberfläche des Zahnaufhellungsprodukts mit dem Zahnfleisch und/oder dem Speichelfluss.
- Bei Patienten mit bekannter Zahnempfindlichkeit wird die Behandlung vor und nach der Anwendung mit Ultrafill™ Desensibilisierungsgel, Opalescence™ Sensitivity-Relief-Aufhellungszahnpasta und/oder Enamelast™ Fluoridlack empfohlen. Je nach dem Schweregrad der Empfindlichkeit stehen weitere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Endodontisch behandelte Zähne
1. Klären Sie die Erwartungen des Patienten. Erläutern Sie alle ästhetischen Einschränkungen, bevor Sie fortfahren. Vorher-Fotos werden empfohlen.
2. Überprüfen Sie gesundes parodontales Gewebe und eine qualitativ hochwertige endodontische Behandlung.
3. Entfernen Sie das gesamte Restaurations- und Wurzelverschlussgelmaterial aus der koronalen Pulpakammer, 2–3 mm unterhalb der gesunden Gingiva. Verseigeln Sie den endodontisch behandelten Zahn mit einem 2 mm dicken konventionellen Glasionomer, einem kunststoffmodifizierten Glasionomer oder einem verkleideten fließfähigen Kompositharz. Überprüfen Sie den Materialsatz, bevor Sie fortfahren.
4. Befolgen Sie die obigen Anweisungen zum Isolieren, um sowohl die labiale als auch die linguale Seite des Zahns zu isolieren. Drücken Sie das Gel in die Zugangsöffnung und auf die labiale und linguale Oberfläche. Zugangsöffnung nicht verschließen. Nicht als Gehbleichmittel verwenden.
6. Lassen Sie das Gel pro Anwendung 20 Minuten einwirken.
7. Absaugen von Gel von der Zahnoberfläche und der Zugangsöffnung mit Luer Vac und SST (Surgical Suction Tip) oder einer chirurgischen Absaugspitze. Um Gelspritzer zu vermeiden, verwenden Sie beim Absaugen des Gels kein Wasser.
8. Wenn kein Gel sichtbar ist, leicht abspülen und an der Luft trocknen. Gehen Sie vorsichtig vor, um die Isolationsbarriere oder die Kofferdamdichtung nicht zu lösen.
9. Farbveränderung nach jeder Anwendung auf wiederholen.
10. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Reinigung", um Zahnfleischverfärbungen zu entfernen.
11. Verschließen Sie die Zugangs mit einer bevorzugten Barriere in der Zugangspräparation mit einem Wattepellet und lassen Sie eine Mindeststärke von 2–3 mm für provisorisches Restaurationsmaterial frei.
   Jtemp™-Provisorien oder UltraTemp Regular-Befestigungszement können verwendet werden.
12. Warten Sie nach der Anfüllung 7–10 Tage, bevor Sie eine dauerhafte Restauration einsetzen, da Aufhellungsmaterialien Restaurationen interferieren.

Hinweise
- Wenn eine zusätzliche Aufhellung gewünscht wird, planen Sie das oben beschriebene Intervallverfahren zur Aufhellung von Opalescence Boost 40 % neu und wiederholen Sie es oder verwenden Sie die Aufhellung Opalescence™ Endo.
- Eine Rückbildung zu einer dunkleren Farbe kann innerhalb von 3–5 Jahre wird empfohlen.
- Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, finden Sie weitere Informationen unter www.ultradent.com/products/category-sites/whitening/in-office/opalescence-endo

Verarbeitung
Um Restaurationsmaterialien zu vermeiden, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle. Wenn Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze zu einem Winkel verwendet werden

Lagerung und Entsorgung
Gemäß dem Etikett der äußeren Verpackung lagern. Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Gesetzen entsorgen.

- Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.
- Bevor Sie Spritzen entsorgen, saugen Sie Wasser in die Spritze und drücken Sie die Flüssigkeit in den Abfluss. Wiederholen Sie dies einige Male, bevor Sie die Spritze entsorgen. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Spritzen und Spitzen entsorgt werden.

Verschiedene Informationen
- Hypokalzifizierte Bereiche (Weiß-Fleck-Läsionen), die mit bloßem Auge möglicherweise nicht sichtbar sind, werden schneller weiß und dadurch auffälliger der Aufhellung deutlicher sichtbar. Führen Sie mit der Aufhellungsbehandlung fort, bis sich die nicht betroffene Zahnoberfläche nicht mehr abhebt. Bewerten Sie das Ergebnis zwei Wochen nach der Aufhellungsbehandlung erneut, wenn sich die Zahnfarbe stabilisiert hat.
- Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung werden die Zähne mit einem Hellwerden nicht weiß.
- Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe in Ihrer Aufhellungsschiene hinterlassen.
- Die Zähne können sich im Laufe der Zeit wieder verfärben, insbesondere bei Personen, die Produkte mit Tee, Kaffee oder Wein verwenden müssen
Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

DE

Opalescence™ Boost™ 40%

Zahnaufhellungssystem zur Anwendung in der Zahnarztpraxis

Produktbeschreibung
Opalescence™ Boost™ 40 % PF Zahnaufhellungsgel mit Wasserstoffperoxid ist nur für den Gebrauch in der Praxis bestimmt. Das 2-Zylinder-Mix-Spritze sorgt für maximale Kraft jeder Anwendung und präzise Dosierung des Aktivators. Ein Zylinder enthält einen einzigartigen chemischen Aktivator, der mit einem zweiten Zylinder kombiniert wird, das Wasserstoffperoxid enthält.
Lesen Sie für alle beschriebenen Produkte vor der Verwendung sorgfältig alle Informationen und SDB-Informationen durch.

Verwendungs-/Applikationsform(en)
- 1,2 ml-Abgabespritze
- Empfohlener Verabreichungstipp
  - Schwarze Mini™-Applikationsspitze

Hinweise für den Gebrauch / Verwendungszweck
Opalescence™ Boost™ 40 % Zahnaufhellung ist nur für den Gebrauch in der Praxis bestimmt. Es wird vom Zahnarzt zum Bleichen eines oder mehrerer Zähne angewendet. Opalescence-Boost-Zahnaufhellung für die Zahnarztpraxis wird auch bei devitalen Zähnen verwendet, einschließlich intrakoronalem Bleaching in der Praxis. Opalescence-Boost-Zahnaufhellung für die Zahnarztpraxis bietet eine alternative konservative Methode (im Vergleich zu Kronen, Veneers etc.) zur Behandlung dunkler, verfärbter Zähne, die durch prädisponierende Faktoren wie Krankheit, traumatische oder iatogene Verletzungen, angeborene, systemische, metabolische oder pharmakologische Einflüsse verursacht werden. Dazu gehören unter anderem erhöhte Bilirubinwerte, Tetracyclin- und Minocyclin-Färbungen bei Erwachsenen, Porphyrie, Erythroblastosis fetalis und eine hohe Fluoridaufnahme während der Zahnentwicklung.

Kontraindikationen
- Schwangere und stillende Mütter sollten keine Zahnaufhellungsprodukte verwenden.
- Bei Patienten oder Anwender mit Allergieproblemen lesen Sie bitte das Produktallergendokument unter www.ultradent.com. Wenn eine allergische Reaktion vorkommt, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab und verständigen Sie den Patienten, einen Arzt aufzusuchen.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
- Verwenden Sie nur empfohlene Applikationstipps.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der aktiven Oberfläche des Zahnaufhellungsprodukts mit dem Zahnfleisch und/oder dem Speichelfluss.
- Bei Patienten mit bekannter Zahnempfindlichkeit wird die Behandlung vor und nach der Anwendung mit Ultrafill™ Desensibilisierungsgel, Opalescence™ Sensitivity Relief Aufhellungszahnpasta und/oder Enamelast™ Fluoridlack empfohlen. Je nach dem Schweregrad der Empfindlichkeit stehen weitere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Endodontisch behandelte Zähne
1. Klären Sie die Erwartungen des Patienten. Erläutern Sie alle ästhetischen Einschränkungen, bevor Sie fortfahren. Vorher-Fotos werden empfohlen.
2. Überprüfen Sie gesundes parodontales Gewebe und eine qualitativ hochwertige endodontische Behandlung.
3. Entfernen Sie das gesamte Restaurations- und Wurzelverseigelungsmaterial aus der koronalen Pulpakammer, 2–3 mm unterhalb der gesunden Gingiva. Verseigeln Sie den endodontisch behandelten Zahn mit einem 2 mm dicken konventionellen Glasionomer, einem kunststoffmodifizierten Glasionomer oder einem verkleideten fließfähigen Kompositharz. Überprüfen Sie den Materialsatz, bevor Sie fortfahren.
4. Befolgen Sie die obigen Anweisungen zum Isolieren, um sowohl die labiale als auch die linguale Seite des Zahns zu isolieren. Drücken Sie das Gel in die Zugangsöffnung und auf die labiale und linguale Oberfläche. Zugangsöffnung nicht verschließen. Nicht als Gehbleichmittel verwenden.
6. Lassen Sie das Gel pro Anwendung 20 Minuten einwirken.
7. Absaugen von Gel von der Zahnoberfläche und der Zugangsöffnung mit Luer Vac und SST (Surgical Suction Tip) oder einer chirurgischen Absaugspitze. Um Gelspritzer zu vermeiden, verwenden Sie beim Absaugen des Gels kein Wasser.
8. Wenn kein Gel sichtbar ist, leicht abspülen und an der Luft trocknen. Gehen Sie vorsichtig vor, um die Isolationsbarriere oder die Kofferdamdichtung nicht zu lösen.
9. Farbveränderung nach jeder Anwendung auf wiederholen.
10. Befolgen Sie die Anweisungen unter „Reinigung", um Zahnfleischverfärbungen zu entfernen.
11. Verschließen Sie die Zugangs mit einer bevorzugten Barriere in der Zugangspräparation mit einem Wattepellet und lassen Sie eine Mindeststärke von 2–3 mm für provisorisches Restaurationsmaterial frei.
   Jtemp™-Provisorien oder UltraTemp Regular-Befestigungszement können verwendet werden.
12. Warten Sie nach der Anfüllung 7–10 Tage, bevor Sie eine dauerhafte Restauration einsetzen, da Aufhellungsmaterialien Restaurationen interferieren.

Hinweise
- Wenn eine zusätzliche Aufhellung gewünscht wird, planen Sie das oben beschriebene Intervallverfahren zur Aufhellung von Opalescence Boost 40 % neu und wiederholen Sie es oder verwenden Sie die Aufhellung Opalescence™ Endo.
- Eine Rückbildung zu einer dunkleren Farbe kann innerhalb von 3–5 Jahre wird empfohlen.
- Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, finden Sie weitere Informationen unter www.ultradent.com/products/category-sites/whitening/in-office/opalescence-endo

Verarbeitung
Um Restaurationsmaterialien zu vermeiden, wischen Sie die Spritze zwischen den Anwendungen mit einem mittelstarken Desinfektionsmittel ab und verwenden Sie eine Einwegschutzhülle. Wenn eine Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze zu einem Winkel verwendet werden

Lagerung und Entsorgung
Gemäß dem Etikett der äußeren Verpackung lagern. Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.

- Den Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen entsorgen.
- Bevor Sie Spritzen entsorgen, saugen Sie Wasser in die Spritze und drücken Sie die Flüssigkeit in den Abfluss. Wiederholen Sie dies einige Male, bevor Sie die Spritze entsorgen. Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Spritzen und Spitzen entsorgt werden.

Verschiedene Informationen
- Hypokalzifizierte Bereiche (Weiß-Fleck-Läsionen), die mit bloßem Auge möglicherweise nicht sichtbar sind, werden schneller weiß und dadurch auffälliger der Aufhellung deutlicher sichtbar. Führen Sie mit der Aufhellungsbehandlung fort, bis sich die nicht betroffene Zahnoberfläche nicht mehr abhebt. Bewerten Sie das Ergebnis zwei Wochen nach der Aufhellungsbehandlung erneut, wenn sich die Zahnfarbe stabilisiert hat.
- Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung werden die Zähne mit einem Hellwerden nicht weiß.
- Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe in Ihrer Aufhellungsschiene hinterlassen.
- Die Zähne können sich im Laufe der Zeit wieder verfärben, insbesondere bei Personen, die Produkte mit Tee, Kaffee oder Wein verwenden müssen
Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

FR

Opalescence™ Boost™ 40%

Système d'éclaircissement des dents en cabinet

Description du produit
Le gel d'éclaircissement Opalescence™ Boost™ 40 % peroxyde d'hydrogène est destiné à une utilisation en cabinet uniquement. La seringue de mélange à double cylindre et jet assure une résistance maximale pour chaque application et un dosage précis de l'activateur. Chaque cylindre contient un activateur chimique unique associé à un deuxième cylindre contenant du peroxyde d'hydrogène.
Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

Mode(s) d'application
- Seringue d'application de 1,2 ml
- Embout d'application recommandé
  - Embout Mini™ noir.

Indications d'utilisation/Utilisation prévue
Le système d'éclaircissement Opalescence Boost 40 % est destiné à une utilisation médicale en cabinet uniquement. Il est appliqué par le professionnel dentaire pourblanchir une ou plusieurs dents. Le système d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost est également utilisé sur les dents non vitales, y compris l'éclaircissement intracoronaire en cabinet. Le système d'éclaircissement Opalescence Boost est une méthode alternative et conservatrice (par rapport aux couronnes, facettes, etc.) pour l'éclaircissement des dents sombres et décolorées en interne causées par des facteurs prédisposants tels qu'une maladie, une blessure traumatique ou iatrogène, des influences congénitales, systémiques, métaboliques ou pharmacologiques. Ceux-ci peuvent inclure, mais sans y limiter, des niveaux importants de bilirubine, des taches de tétracycline et de minocycline adulte, la porphyrie, l'érythroblastose fœtale et un apport élevé en fluorure pendant le développement des dents.

Contre-indications
Les femmes enceintes ou qui allaitent ne doivent pas utiliser de produits d'éclaircissement des dents.
Pour les patients ou les utilisateurs ayant des problèmes d'allergie, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions
- Utiliser uniquement les embouts recommandés.
- Éviter le contact direct de la surface active du produit d'éclaircissement dentaire avec les gencives et/ou le flux salivaire.
- Pour les patients ayant une sensibilité dentaire connue, un traitement préopératoire et postopératoire avec le gel désensibilisant Ultrafill™, le dentifrice blanchissant Opalescence Sensitivity Relief et/ou le vernis fluoré Enamelast™ est recommandé.
- Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des dents et/ou de la gorge, de la langue et des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'incertitude grave, contactez votre dentiste.
- En cas d'ingestion du produit, boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est aspiré, consulter immédiatement un médecin.
- Informer les patients sur le fait que les matériaux de restauration n'éclaircissent pas ; nous recommandons donc d'éclaircir les dents foncées avant la mise en place de la restauration.
- Attendre au moins 7 à 10 jours après les procédures d'éclaircissement avant de placer les restaurations adhésives.
- Les patients ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur médecin traitant avant le traitement.
- Éviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement le produit entré en contact avec les yeux.
- Pour éviter toute irritation supplémentaire, la santé gingivale et bucco-dentaire générale doit être évaluée avant de commencer le traitement.
- Le mordançage de l'émail ou le polissage à base de pâte prophylactique avant la procédure d'éclaircissement n'est pas recommandé en raison de le potentialise pas le processus d'éclaircissement, mais peut provoquer une sensibilité.
- Les restaurations existantes doivent être inspectées et toute la dentine sensible exposée doit être recouverte. S'il existe des antécédents de sensibilité, traiter le patient au moyen d'une vitazolamide orale ou de gel agent blanchissant du type bioactif dentinaire ou temporairement avec un agent adhésif dentinaire ou un vernis fluoré.
- Surveiller fréquemment de l'éclaircissement des patients afin d'éviter un éclaircissement supérieur au niveau d'éclaircissement ou au degré de transluidité souhaité.
- Rincer soigneusement les instruments vides et les embouts usagés à l'eau avant de les jeter pour éviter tout risque d'incendie.
- Laisser les seringues atteindre la température ambiante avant d'effectuer le mélange.
- Les patients et les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de protection avec écrans latéraux lors de l'utilisation de ce produit.
- Si le gel n'est pas rouge après le mélange, ne pas l'utiliser. Il n'a pas été analysé correctement.
- En cas de sensibilité ou d'irritation des tissus mous, demander au patient d'utiliser un gel anesthésique topique oral en vente libre ou de l'huile de vitamine E.
- Contient du fluorure de sodium.

Instructions pas-à-pas

Préparation
1. Effectuer un examen buccal et traiter les zones préoccupantes, y compris, mais sans s'y limiter, la dentine exposée, les caries, etc. avant le traitement.
2. Déterminer et enregistrer la teinte de base. Utiliser des photographies lorsque cela est indiqué pour la documentation de base.

Utilisation – Mélange du gel d'éclaircissement Opalescence Boost pour utilisation en cabinet
1. Cassurer que les seringues sont bien fixées.
2. Appuyer sur le petit piston transparent dans la petite seringue transparente du milieu pour pomper la membrane interne et combiner le produit d'éclaircissement et l'activateur.
3. Appuyer sur le piston du mélangeur, une seule fois, en poussant tout le contenu dans la seringue transparente.
4. Exprimer complètement le contenu du piston transparent dans la seringue rouge.
5. Pour bien mélanger l'activateur avec le gel d'éclaircissant, pousser les pistons d'avant en arrière continuellement et mélanger 25 fois de chaque côté.
6. Exprimer tout le gel mélangé dans la seringue rouge.
7. Tourner pour séparer le deux seringues et fixer soigneusement l'embout recommandé (embout Mini noir) sur la seringue rouge.
8. Vérifier le débit, la consistance et que la couleur est rouge avant l'application intra-orale. En cas de résistance, remplacer l'embout et vérifier à nouveau. Si le gel ne coule pas, remplacer le tube et se référer à l'étape 2 de la section « Utilisation - Mélange du gel d'éclaircissement Opalescence Boost pour utilisation en cabinet.

REMARQUE:
- Le gel d'éclaircissement Opalescence Boost pour utilisation en cabinet doit être utilisé dans les 10 jours suivant le mélange. Conserver au réfrigérateur, si pas utilisé immédiatement.
- Se référer à la carte de mélange incluse.

Isolation – OpalDam™ Resin Barrier Isolation – Barrière en résine OpalDam™ (isolation recommandée)
1. Retirer le capuchon Luer lock de la barrière en résine OpalDam™ et fixer soigneusement l'embout d'application recommandé. Se référer à la section Avertissements et précautions.
2. Vérifier le débit avant l'application intra-orale.
3. Rincer et sécher soigneusement les dents et les gencives. Placer la languette (recommandée) et les écarteurs buccaux (ou autoportants ou l'écarteur Ultradent Umbrella™) pour éviter que le gel blanchissant Opalescence Boost n'entre en contact avec les tissus mous.
4. Appliquer la barrière de résine OpalDam le long de la limite gingivale, en la recouvrant d'environ 2 à 3 mm sur l'émail. Commencer et terminer une dent à la fois afin de bien la plus étalée que est éclaircie. Utiliser une barrière pour isoler la ou les dents à traiter.
5. Exprimer la résine à travers toutes les embrasures ouvertes sur le tissu gingival pour sceller et couvrir complètement la papille interdentaire.
6. Utiliser le miroir bucccal pour s'assurer qu'il n'y a pas d'espace exposant la gencive sous-jacente. Si c'est le cas, appliquer de la résine sur l'espace.
7. Photopolymériser pendant 20 secondes par arcade en effectuant un mouvement de balayage. Lors de l'isolation d'une seule dent, faire un balayage pendant 5 secondes. Vérifier soigneusement le durcissement de la résine à l'aide d'un instrument.

Isolation – Digue dentaire (isolation alternative)
1. Placer une digue dentaire pour isoler les dents à éclaircir.

Utilisation - Application du gel d'éclaircissement Opalescence Boost 40 % pour utilisation en cabinet
1. Appliquer une couche de gel de 0,5 à 1,0 mm d'épaisseur sur la surface vestibulaire de la dent.
2. Laisser agir le gel sur les dents pendant 20 minutes par application, en répétant régulièrement le confort du patient et l'aspiration de la salive.

REMARQUE : Limiter le contact avec les tissus mous ou le flux salivaire. En cas d'irritation chimique due au contact des tissus mous intra-oraux avec le gel de peroxyde, essuyer immédiatement le gel du tissu à l'aide d'une gaze humide et soigneusement rincer la zone. Les tissus devraient revenir à la normale dans les 20 à 30 minutes. Se référer à la section Avertissements et précautions.
3. Aspirer le gel présent sur les dents à l'aide du Luer Vac et du SST™ (embout d'aspiration chirurgical) ou d'un embout d'aspiration chirurgical. Pour éviter les éclaboussures de gel, ne pas utiliser d'eau pendant l'aspiration du gel. Lorsqu'aucun gel n'est visible, rincer légèrement et sécher à l'air. Veiller à ne pas déloger la barrière d'isolation ou le joint de la digue dentaire.
4. Évaluer le changement de teinte après chaque application et surveiller la sensibilité et l'irritation du patient. En cas de sensibilité persistante, cesser l'utilisation.
5. Répéter les étapes de la section « Application du gel d'éclaircissement Opalescence Boost 40 % pour utilisation en cabinet » pour un maximum de 3 applications si les résultats souhaités n'ont pas été atteints. Ne pas dépasser 3 applications par visite.
6. Retraiter si nécessaire selon votre jugement professionnel

Nettoyage
1. Aspirer le gel des dents à l'aide du Luer Vac et du SST (embout d'aspiration chirurgical) ou d'un embout d'aspiration chirurgical. Pour éviter les éclaboussures de gel, ne pas utiliser d'eau pendant l'aspiration du gel. Lorsqu'aucun gel n'est visible, rincer soigneusement et sécher à l'air.
2. En cas d'utilisation de la barrière en résine OpalDam, faire glisser doucement l'embout sous la barrière en résine pour retirer le digue dentaire

Remarques
- Pour les patients présentant une sensibilité dentaire connue, un traitement préopératoire et postopératoire avec le gel désensibilisant Ultra‑Z, le dentifrice blanchissant Opalescence Soulagement de la sensibilité et/ou le vernis fluoré Enamelast est recommandé. Toutes possibilités de traitement sont disponibles en fonction de la gravité de la sensibilité du patient

Dents traitées par endodontie
1. Établir les attentes du patient. Expliquer toutes les limites esthétiques avant de continuer. Il est recommandé de prendre des photos au préalable.
2. Vérifier les tissus parodontaux sains et la qualité du traitement endodontique.
3. Retirer tout le matériau de restauration et de scellement radiculaire de la chambre pulpaire coronaire, 2 à 3 mm sous la gencive saine. Placer un verre ionomère conventionnel de 2 mm d'épaisseur, un verre ionomère modifié à la résine ou une résine composite fluide liée afin de sceller le canal traité endodontiquement.Verifier l'ensemble du matériel avant de continuer.
4. Suivre les instructions « Isolation » ci-dessus pour isoler les faces vestibulaire et linguale de la dent.
5. Exprimer le gel dans l'ouverture d'accès et sur la surface labiale et linguale. Ne pas sceller l'ouverture d'accès. Ne pas utiliser pour l'éclaircissementinterne.
6. Laisser le gel agir pendant 20 minutes par application.
7. Aspirer le gel de la surface de la dent et de la cavité d'accès à l'aide du Luer Vac et du SST (embout d'aspiration chirurgical) ou d'un embout d'aspiration chirurgical. Pour éviter les éclaboussures de gel, ne pas utiliser d'eau pendant l'aspiration du gel.
8. Lorsqu'aucun gel n'est visible, rincer légèrement et sécher à l'air. Veiller à ne pas déloger la barrière d'isolation ou le joint de la digue dentaire.
9. Évaluer le changement de teinte et répéter si nécessaire.
10. Suivre les instructions de « nettoyage » pour retirer les barrières gingivales.
11. Sceller l'accès avec la protection souhaitée dans la cavité d'accès : Utiliser du matériau provisoire de restauration en quantité minimale de 2 à 3 mm pour le matériau de restauration temporaire tel que la résine temporaire Jtemp™ ou le matériau de scellement UltraTemp™ Regular
12. Attendre 7 à 10 jours après les procédures d'éclaircissement avant de placer une restauration permanente, car les matériaux d'éclaircissement interfèrent avec les restaurations.

Remarques
- Si un blanchiment supplémentaire est souhaité, reprogrammer et répéter la procédure d'éclaircissement en cabinet Opalescence Boost 40 % ci-dessus ou utiliser le système d'éclaircissement Opalescence™ Endo
- Une légère récidive est à possible. Il est recommandé de faire un traitement d'éclaircissement de suivi tous les 3 à 5 ans.
- Il y a have any questions regarding this product, please find additional information at www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost.
- Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez trouver des informations supplémentaires sur https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost

Traitement
Pour éviter la contamination croisée, essuyer la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations et utiliser un manchon protecteur jetable. Si un manchon protecteur n'est pas utilisé, la seringue doit être traitée comme une seringue à usage unique.

Stockage et élimination
Stocker conformément aux informations de l'étiquette de l'emballage extérieur.
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

- Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.
- Avant de jeter les seringues, aspirer de l'eau dans la seringue et évacuer le liquide dans le drain. Répéter plusieurs fois avant de jeter la seringue. S'assurer que toutes les gazes utilisées sont mises à l'eau.

Informations diverses
- Les zones hypocalcifiées (lésions sous forme de points blancs), qui peuvent ne pas être visibles à l'œil nu,éclaircont plus rapidement (devenant ainsi plus évidentes lors de l'éclaircissement). Continuez le traitement d'éclaircissement jusqu'à ce que la surface de la dent non affectée se fonde avec le reste. Réévaluer deux semaines après le traitement d'éclaircissement lorsque la teinte des dents s'est stabilisée.
- Chez un petit pourcentage de la population, les dents neéclaircissent pas sensiblement.
- Certains amalgames d'obturations peuvent laisser une couleur violet foncé dans votre gouttière d'éclaircissement ; cela est normal.
- Les dents peuvent se recolorer avec le temps ; il convient alors d'éclaircir le traitement d'éclaircissement des dents si nécessaire.

Signaler tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

NL

Opalescence™ Boost™ 40%

Bleekgel voor in de tandartspraktijk

Productbeschrijving:
Opalescence™ Boost™ bleekgel met 40% waterstofperoxide is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de tandartspraktijk. De jetmix-spuit met twee cilinders zorgt voor maximale sterkte bij elke applicatie en nauwkeurige dosering van de activator. De ene cilinder bevat een unieke chemische activator die wordt gecombineerd met de andere cilinder met waterstofperoxide.
Lees alle instructies en veiligheidsinformatiebladen van de genoemde producten zorgvuldig door voor gebruik en zorg dat u ze begrijpt.

Applicatievorm(en)
- 1,2 ml applicatiespuit
- Aanbevolen applicatietip
  - zWack Mini™ tip

Indicaties voor gebruik/beoogd doel
Opalescence Boost-bleekgel 40% is uitsluitend bestemd voor medisch gebruik in de tandartspraktijk. Het wordt door de dental professional aangebracht op de tand of tanden die moeten worden gebleekt. Opalescence Boost-bleekgel wordt ook gebruikt voor niet-vitale gebleekte tanden, inclusief intracoronal bleken. De bleekbehandeling Opalescence Boost is een alternatief, conservatiever methode (vergeleken met kronen, veneers enz.) voor het bleken van gebleekte tanden die van binnenuit donker zijn verkleurd als gevolg van predisponerende factoren zoals ziekten, traumatisch of iatrogeen letsel, en aangeboren, systemische, metabolische of farmacologische factoren. Deze kunnen onder andere zijn: verhoogd bilirubine, tetracycline- en minocyclineklekken bij volwassenen, porfyrie, erythroblastosis foetalis en hoge fluoride-inname tijdens de gebitsontwikkeling.

Contra-indicaties
- Zwangere of zogende vrouwen die bortvoeding geven, mogen geen gebitsbleekproducten gebruiken.
- Voor patiënten of gebruikers met allergieën, raadpleeg het productallergeendocument op www.ultradent.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en laat de patiënt een arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
- Gebruik alleen aanbevolen tips.
- Vermijd direct contact van het actieve oppervlak van het bleekprodukt met tandvlees en/of speeksel.
- Bij patiënten met een bekende gevoeligheid van het gebit is het aanbeveling om voor en na de behandeling Ultra‑Z™ desensitizing gel, Opalescence™ Whitening Toothpaste Sensitivity Relief en/of Enamelast™ fluoridelak te gebruiken.
- Sommige patiënten kunnen tijdelijk ongemak van het tandvlees, de lippen, de keel, de tong of de gebitselementen ervaren. Als een van deze symptomen aanhoudt of verergert, stop dan met het gebruik van het product is gestaakt, of in geval van ernstig ongemak, dient de patiënt contact op te nemen met de dental professional.
- Bij inslikken van het product, drink dan een aantal keer een glas water en neem dan contact op met een arts. Bij inademen van het product: zoek onmiddellijk medische hulp.
- Informeer patiënten dat restaurateriamaterial niet wit wordt. Wie raden aan om donkere tanden te bleken voordat de restauratieve behandeling plaatsvindt.
- Wacht ten minste 7-10 dagen na de bleekbehandeling voordat u adhesieve restaurations plaatst.
- Patiënten met ernstige gezondheidsproblemen moeten hun huisarts raadplegen voorafgaand aan de behandeling.
- Vermijd contact met de ogen. Spoel onmiddellijk als het product in aanraking komt met de ogen.
- De gezondheid van het tandvlees en de algehele mondgezondheid moet voorafgaand aan de bleekbehandeling worden beoordeeld om extra irritatie te voorkomen.
- Het vetten van glazuur of het polijsten met profylaxepasta voorafgaand aan een bleekbehandeling kan het aanhechtvermogen zorgt niet voor een beter bleekresultaat (maar kan wel gevoeligheid veroorzaken).
- Restauraties moeten adequaat worden verzegeld en alle blootgelegde gevoelige dentine moet

4) Lisää OpalDam -resinisuoja tasaisesti ienreunan myötäisesti ulottaen sen noin 2-3 mm kiilteelle sauman suojaamiseksi. Aloita ja ohjeistele jokaisen hampaan kuuntelemaa oikean valkaisevan hampaan jälkeen. Käytä resinisä eristämään käsiteltävät hammas/hampaat.
5) Purista hartsia kaikkien avointen aukkojen kautta kiellkudokselle sulkeaksesi ja petsilöisen paljaan papillari kokonaan.
6) Varmista suojelemin avulla, että ienrajassa ei ole aukkoja resinissä. Jos näin on, lisätä hartsia rakoon.
7) Koveta valoilla 20 sekunnin ajan kutakin hammasriivä käytäen skannaaavaa liiketä. Kun eristät yhden hampaan, skannaa 5 sekuntia. Varmista, että resiini on kovettunut instrumentin avulla.

Eristys – kumipato (vaihtoehtoinen eristys)
1) Aseta kumipato ja käytäkseen eristäkseesi yksittäisen valkaistava hammas.
Opalescence™ Boost™ 40%
1) Levitä 0,5–1,0 mm paksu kerros geeliä hampaan labiaalisen pintaan.
2) Anna geelin jäädä hampaalle 20 minuutia käyttökerta kohti ja tarkista säännöllisesti poistaan mukauus ja sijeen imeminen.
HUOMAUTUS: Vältä kiskeutusa pehmykudoksen tai syljenrjyksen kanssa. Jos kontakti pehmykudokseen aiheutaa kemiallisia ärsytystä, pyhi geeli valittomästi pois märällä sideharsolla ja huuhtele alue huolellisesti. Kudoksen pitäisi palautua normaaliksi 20–30 minuutissa. Katso vaatutukset ja varotoimet
3) Ime geeli hampaista Ultradent Luer -imuadapterilla ja SST™ -kärjellä (Surgical Suction Tip) tai kirurgisella imukärjellä. Älä käytä vettä imemisen aikana, jotta roiskeita ei muodostusi. Kun geeliä ei näy, huuhtele kevyesti ja kuivaa ilmassa. Ole varovainen, ettei ntrota eristysesteitä tai kumivistetä.
4) Arvioi säyn mutoss jokaisen käyttökerran jälkeen ja tarkkaile potilaasta merkkejen ja ärsytyksen varalta. Jos herkkyyttä ilmenee jatkuaisti, lopeta kyytä.
5) Toista vaiheet kohdassa "Opalescence Boost 40% In-Office Whitening -valkaisun kulkeminen" eristäkä lohmella käytäkseesi, jos haluttaja tulokisia ei ole saavutettu. Ala yltä kolmea lisäyksertaa yhden vastaanottokäynnin aikana.
6) Käsittele uudelleen ammalliisen arvioi nuksan.

Puhdistus
1) Ime geeli hampaista Luer Vac -imuadapterilla ja SST™ -kärjellä (Surgical Suction Tip) tai kirurgisella imukärjellä. Älä käytä vettä imemisen aikana, jotta roiskeita ei muodostusi. Kun geeliä ei ole enää silmin havaitavissa hampailla, huuhtele kevyesti vedellä ja kuivaa ilmapuutsilla.
2) Jos Opalda -resinisuojausta on käytetty, liu'uta varoen kärkeä resiinisuojan alle poistaaksesi resiini tai kumipato.
Huomautuksia
• Poltalle, jolla on vihlovat hampaat, suosittelaan esi- ja jälkikäsittely LyteAttac™ desensitiivisa geeillä, vihlomista estävällä, valkaisevilla Opalescence™ Whitening Toothpaste with Sensitivity Relief -hammastahnalla ja/tai Enamelast™ -fluoridiakalla. Rippuen hampaiden vihlonsan voimakuudesta, muita käsittelyvaihtoehtoja on tarjolla.

Jäärrlöidettävä hampaan
1) Käy läpi potilaan odotukset. Kerro kaikista esteettisistä ongelmista ennen aloittamista. Ennen hoitoa -kuvat ovat suositeltavia.
2) Varmista hammaskuodosten terveys ja korkeatasoinen juuritoito.
3) Poista kaikki korjauksessa käytetty materiaali ja juureen eristysmateriaali puplaanontelosta, 2–3 mm terveen ikenen alapuolelle. Aseta 2 mm paksu perinteinen lasi-ionomeerisementti modifiolitu lasi-ionomeeri tai juoksevan sidoksom-positiittihartsi täyteämään endodontiöitäesti käsitelty kanava. Tarkista materiaalit ennen jatkamista.
4) Noudata yllä oleva eristysohjeita eristäessäsi seká hampaan labiaaliset että lingvaaliset puolet.
5) Purista geeliä pulpaonteloon, labiaali- ja lingvaalipinnoille. Ala tiivistä pääsyaukoksa. Ala käytä kaveityräkaisuaineena.
6) Anna geelin vaikuttaa 20 minuutta käyttökerta kohti.
7) Ime geeli hampaista ja pulpaontelosta Luer Vac -imuadapterilla ja SST™-kärjellä (Surgical Suction Tip) tai kirurgisella imukärjellä. Älä käytä vettä imemisen aikana, jotta roiskeita ei muodostusi.
8) Kun geeliä ei näy, huuhtele kevyesti ja kuivaa ilmassa. Ole varovainen, ettei ntrota eristysesteitä tai kumitiivistetä.
9) Arvioi säyn muutosta ja toista tarvittaessa.
10) Noudata "Puhdistus"-ohjeita poistaaksesi ienesteet.
11) Sulje pulpaontelo haluttila materaalilla. Aseta vanupallo pulpaontelon ja ainostele vähintään 2–3 mm pakkauvet kerros valikaisella täytemateriaalla, kuten esimerkiksi J-Temp™-resiinia tai Opalescence™ Regular -täytemateriaalia.
12) Odota 7–10 päivää valkaisun jälkeen ennen kuin aloitat pysyvät korjausmateriaalit hampaisiin, koska valkaisuaine heikentää sidosaineiden vaikutusta.
Huomautuksia
• Jos potilas haluaa lisävalkaisua, varaa uusi aika ja toista yllä oleva Opalescence Boost 40% -valkaisu tai käytä Opalescence™ Endo -valkaisua.
• Regressio on odotettavissa. Hampaiden säyn kirkastaminen on suositeltaa 3–5 vuoden väliin.
• Jos simulla on kysyttävää tästä tuotteesta, katso lisätietoja osoitteesta http://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost.

Käsittely
Vältä risiikontaminaatio pyyhimällä ruisku keskitason desinfiointiaineella käyttökertojen välillä ja käytä kertakäyttöisiä suojia. Jos kertakäyttöisiä suojia ei ole mahdollista käyttää, ruiskua taleé käsitellä kertakäyttöisenä.

Säilytys ja häviittäminen
Säilytä pakettei etiketissä ilmoitetulla tavalla.
Hävitä paikallisten säintöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
• Hävitä paikallisten säintöjen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
• Täytä ruiskut vedellä ja ruiskuta vesi viemärin ennen häviittämistä. Toista muutaman kerran ennen ruiskun häviittämistä. Varmista, että käytetyt sideharsot huuhdellaan vedellä.

Muita tietoja
• Hypopiaisät (valkoiset laikut), jotka eivät vältämättä näy paljaalla silmällä, vaikeemat muuta hammasta noemmaksi ja saattavat sisten tulla enemmän näkyvin valkaisuhoidon aikana. Jatka valkaisuhoitoa, kunnes vahingoittumaton hampaan pinnan vari vastaa hypokalsifioituneita alueita. Arvioi tilanne uudelleen kahden päästä valkaisusta, kun hampaiden vari on asettunut.
• Pienellä osalla väestöstä hampaat eivät vaaleene merkittävästi.
• Jotkut ambulanssityötteet voivat jättää tumman violetin värin valkaisuhoitoa varten.
• Hampaat voivat värjäytyä uudelleen ajan myötä. Täydennä hampaiden valkaisuhoitoja tarpeen mukaan.

Raportoi kaikki vakavat vahingot valmistajalle ja vasaavalle viranomaiselle.
www.ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200

Opalescence™ Boost™ 40% EL

Σύστημα λεύκανσης δοντιών στο ιατρείο

Περιγραφή προϊόντος
Η γέλη λεύκανσης με υπεροξείδιο του υδρογόνου Opalescence™ Boost™ 40% προορίζεται μόνο για χρήση στο ιατρείο. Η σύριγγα διπλού κυλίνδρου αυτόματης ανάμιξης διασφαλίζει τη μίγανση για κάθε εφαρμογή και την ακριβή δοσολογία του ενεργειακού.
Ένας από τους κυλίνδρους περιέχει έναν μοναδικό χημικό καταλύτη, ο οποίος ανιχνεύεται με ένα δεύτερο κύλινδρο, που περιέχει το υπεροξείδιο του υδρογόνου.
Όταν από τη χρήση, για όλα τα πρόσθετα που περιγράφονται, διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και τις πληροφορίες στα Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας (SDS).

Μορφή/ές χορήγησης
• Σύριγγα χορήγησης 1,2 ml
• Συνεπάσμενο μύρος χορήγησης
* "Φύγκς Black Min"

Ενδείξεις χρήσης/Σκοπός για τον οποίο προορίζεται
Το σύστημα λεύκανσης Opalescence Boost 40% προορίζεται μόνο για ιατρική χρήση στο ιατρείο. Εφαρμόζεται σε ασθενείς σταγνίζματα οδοντόπορα για τη λεύκανση των δοντιών τους. Το σύστημα λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost προορίζεται για στα νεφρά δόντια, τα μόνιμα δόντια/δοκιμάζοντας της ενδοφαιβή λεύκανσης που γίνεται στο ιατρείο. Το σύστημα λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost παρέχει μια ενιαλλάκτική, συντεταγμένη μέθοδο για σύγκριση με μεμονωμένες σάρες. Αν μια η λεύκανση σκούρων, εναιτεπικά απορρωσταιαμένων δοντιών που οφείλονται σε προϋφιστάμενες τραυματικές σάρωσε, ασθένειες, τραυματικά ή ιατρογενής βλάβη, σιωγνιτές, ανοσιτιμές, μεταβολικές ή φαρμακολογικές επιδράσεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενδοκαπιά μεταβολή άλλων, ανιδιγένιες κηλίδες χαλαρωμένης, τετρακλίνης και μικκακλίνης ενηλίκων, πορφυρία, ηωβόφιλικό ερυθροβλάστωση και υψηλή πρόσληψη φθορίου κατά την ανάπτυξη των δοντιών.

Αντενδείξεις
• Οι εγκυμονούσες ή θηλάζουσες γυναίκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν προϊόντα λεύκανσης δοντιών.
• Ιστοί ούρφοι τους ασθενείς ή τους χρήστες με προβλήματα αλλεργίας, ανιαξτρέτε στο ίργκρισο αλλεργιογόνων του προϊόντος που διατίθεται στη διεύθυνση www.ultradent.com. Εάν παρατηρηθεί αλλεργική ανεξίφωση, ξπτλίνετε καλά την εκπεθεμένη περιοχή με νερό και ζητήστε από τον ασθενή να συμβουλευτεί τον γιατρό του.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα χύρμη.
• Αποφύγετε την άμεση επαφή της ανοιχτού επιφάνειας του προϊόντος λεύκανσης δοντιών με τα αύλα ή/και τη φυή ασίδου.
• Για ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στα δόντια, συνιστάται η θεραπεία πριν και μετά την θεραπεία με αποευαισθητοποιητικό ζέλ Ultra™, οδοντόκρεμα λεύκανσης ανακούφισης ευαισθησίας Opalescence™ Whitening Toothpaste with Sensitivity Relief ή/και φθοριούχο βερνίκι Enamelast™.
• Μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν προμγωγή ενόχληση στα αύλα, τη φυή, τον λαιμό, τη μύτη ή τα δόντια. Εν σπάνιοι αάτοι αυτά τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώθεί μετά τη διακοπή της χρήσης ή σε περιπτώσεις σοβαρής ενόχλησης, καλέστε τον οδοντίατρό σας.
• Εάν το πρόϊόν κατασπθεί, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Εάν το πρόϊόν αναρροφηθεί, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Ενημερώστε τους ασθενείς ότι δεν είναι δυνατή η λεύκανση των λευκών αποκαταστάσεων και γι' αυτό συνιστώ τη λεύκανση των ακόμα δοντιών πριν από την τοποθέτηση του υλικού αποκατάστασης.
• Περιμένετε τουλάχιστον 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης πριν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκαταστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε τα κάτοπτρα για τη βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχουν κενά που να υλίκτονο τα υπολείμματα ούλα. Ούτε η γεμάτη ιστοσελίδα, εφαρμόστε ρητίνη σε αυτά.
• Τηρείστε σε φωτογραφίες ή σε ηλεκτρονικές φωτογραφίες.

Κανονικές χρήσεις
Ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται ένας αναγνώστης. Συνιστάται επαναληπτική θεραπεία λεύκανσης κάθε 3-5 χρόνια.
• Εάν έχετε αποοοιδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost.

Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διασταυρομόλυνση μόλυνση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα απολυμαντικό μέτριας ισχύος μπταζίν των χρήσεων και χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα, η σύριγγα θα πρέπει να ανταμπαστίζεται ως πρώτο μέρος και μόνο χρήση.

Αποθήκευση και απόρριψη
Αποθηκεύετε ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας της εξωτερικής συσκευασίας.
Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Πριν από την απόρριψη του σύριγγα, αναρροφήστε νερό στη σύριγγα και αδειάστε το υγρό στην αποχέτευση. Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο τουλάχιστον φορές πριν πετάξετε τη σύριγγα. Βεβαιωθείτε ότι οι γέλες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ξπλωθεί με νερό.

Διάφορες πληροφορίες
1. Καθίσεις ασθενούς πρέπει πρώτα η θεραπεία.
2. Πρώτα ασθενή θεραπεία, πραγματοποιήστε μια σπουδαία εξέταση και πρόβεστε στη θεραπεία των περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων: ενδοστικά μεταξύ δόντων, τις ανεπίβαρες οδοντίνες, της τερηδόνας κ.λπ.
2. Προσδιορίστε και καταγράψτε τη βασική σκίαση χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, στον ενδεικτικός, για τη δημιουργία μιας βάσης για την ταχυρύθμιση.

Χρήση - Ανιμμέτη συστήματος λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost
1. Βεβαιωθείτε ότι οι σύριγγες είναι βιδωμένες σφιχτά.
2. Πάστε τη σφιχτό δάχαμο (κίβολο) μέσα στη σύριγγα μέσαία δάχαμο σύριγγα για να προκληθεί ρήξη της εσωτερικής μεμβράνης και να ανοιχθεί το λειανκτικό μα του ενεργειακού.
3. Πάστε τις σύριγγες στο κόκκινο σύριγγες, σπρώχνοντας όλο το περιεχόμενο στην διάφανη σύριγγα.
4. Πάστε τα περιεχόμενα της διάφανης σύριγγας εντός της κόκκινης σύριγγας.
5. Για να αναμίξετε καλά τον ενεργειακοπιέστε μη τη γέλη λεύκανσης, πιέστε τα σπλήρη εμπρός και πίσω σουκιά και αναμίξτε 25 φορές για κάθε σύριγγα.
6. Πάστε ολίγο την αναμιγμένη γέλη εντός της κόκκινης σύριγγας.
7. Παρατηρήστε για να διαφαρμέτετε τις φυσαλίδες αέρα. Εάν φυσαλίδες υπάρχουν, πάστε τις σύριγγες (μόνο Black Min) στην κόκκινη σύριγγα.
8. Επαλλήλιστε τη ρυή, τη σιωνγή και τη σε γράμμα είναι πλάκκα ώστε η γέλη λεύκανσης μόλις φτάσει στο κάτω μέρος.
9. Επαλλήλιστε τη ρυή, τη σιωνγή και τη σε γράμμα είναι πλάκκα ώστε η γέλη λεύκανσης μόλις φτάσει στο κάτω μέρος.
10. Ακολούθησε τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός» για τα ιαρφάρετα του σπιμάνιωστων ούλων.
11. Εφαρμόστε την πρόσβαση με το προτιμώμενο υλικό απόφραξης κατά την παρασκευή πρόσβασης χρησιμοποιώντας ένα ιαρφάβο βάμβακα και αφήνοντας ένα ελάχιστο πάχος 2-3 mm για το προσωρινό υλικό αποκατάστασης. Σπως είναι για παράδειγμα ένα προσωρινό ρητίνη.) J-Temp ή την προσωρινή κόλλα UltraTemp Regular.
12. Περιμένετε 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης, προτού τοποθετήσετε τη μόνιμη αποκατάσταση. Εάν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκατάστασεις, κατάνε τα ούλα τα σωστά ή τα δόντια. Εν σπάνιοι αάτοι αυτά τα συμπτώματα επιμένει ή επιδεινώθεί μετά τη διακοπή της χρήσης ή σε περιπτώσεις σοβαρής ενόχλησης, καλέστε τον οδοντίατρό σας.
• Εάν το πρόϊόν κατασπθεί, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Εάν το πρόϊόν αναρροφηθεί, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Ενημερώστε τους ασθενείς ότι δεν είναι δυνατή η λεύκανση των λευκών αποκαταστάσεις και γι' αυτό συνιστώ τη λεύκανση των ακόμα δοντιών πριν από την τοποθέτηση του υλικού αποκατάστασης.
• Περιμένετε τουλάχιστον 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης πριν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκαταστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε τα κάτοπτρα για τη βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχουν κενά που να υλίκτονο τα υπολείμματα ούλα. Ούτε η γεμάτη ιστοσελίδα, εφαρμόστε ρητίνη σε αυτά.
• Τηρείστε σε φωτογραφίες ή σε ηλεκτρονικές φωτογραφίες.

Κανονικές χρήσεις
Ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται ένας αναγνώστης. Συνιστάται επαναληπτική θεραπεία λεύκανσης κάθε 3-5 χρόνια.
• Εάν έχετε αποοοιδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost.

Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διασταυρομόλυνση μόλυνση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα απολυμαντικό μέτριας ισχύος μπταζίν των χρήσεων και χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα, η σύριγγα θα πρέπει να ανταμπαστίζεται ως πρώτο μέρος και μόνο χρήση.

Αποθήκευση και απόρριψη
Αποθηκεύετε ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας της εξωτερικής συσκευασίας.
Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Πριν από την απόρριψη του σύριγγα, αναρροφήστε νερό στη σύριγγα και αδειάστε το υγρό στην αποχέτευση. Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο τουλάχιστον φορές πριν πετάξετε τη σύριγγα. Βεβαιωθείτε ότι οι γέλες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ξπλωθεί με νερό.

Διάφορες πληροφορίες
1. Γρεσνοσήμα σε ανώ υπερσελκίδα σε δηλαδή ρετσινέλλα ή ρετσινέλλα.
2. Ασκείστε από κοιλιακός τη βαθιά ημιλιοφάνεια;
3. Σπλύνετε καλά τα δόντι σύριγγες και τα χρησιμοποιήσεις ένγκρι μη νέρο πριν από την απόχρωση για την σπιμάνιωστη πυρκαγιές.
• Πριν από την ανάμιξη, η σύριγγα πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου.
• Ο ασθενής και οι οδοντίατροι πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά με πλευρές ασπίδες κατά τη χρήση του προϊόντος.
• Εάν η γέλη μπτό την ανάμιξη δεν γίνει κόκκινη, μην τη χρησιμοποιήσετε. Δεν είχε αναμιχθεί σωστά.
• Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία ή ερεθισμός γαν μαλακών ιστών, διάστε οδηγίες στον ασθενή ώστε να τεμαχισοποιεί ένα μη συνταγογραφούμενο (OTC) σταματικό τοπικό αναισθητικό τζέλ ή λάδι βιταμίνης Ε.
• Περιέχει φθορίνιο ιστού.

Οδηγίες βήματα προς βήμα
Προετοιμασία
1. Πριν από τη θεραπεία, πραγματοποιήστε μια σπουδαία εξέταση και πρόβεστε στη θεραπεία των περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων: ενδοστικά μεταξύ δόντων, τις ανεπίβαρες οδοντίνες, της τερηδόνας κ.λπ.
2. Προσδιορίστε και καταγράψτε τη βασική σκίαση χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, στον ενδεικτικός, για τη δημιουργία μιας βάσης για την ταχυρύθμιση.

Χρήση - Ανιμμέτη συστήματος λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost
1. Βεβαιωθείτε ότι οι σύριγγες είναι βιδωμένες σφιχτά.
2. Πάστε τη σφιχτό δάχαμο (κίβολο) μέσα στη σύριγγα μέσαία δάχαμο σύριγγα για να προκληθεί ρήξη της εσωτερικής μεμβράνης και να ανοιχθεί το λειανκτικό μα του ενεργειακού.
3. Πάστε τις σύριγγες στο κόκκινο σύριγγες, σπρώχνοντας όλο το περιεχόμενο στην διάφανη σύριγγα.
4. Πάστε τα περιεχόμενα της διάφανης σύριγγας εντός της κόκκινης σύριγγας.
5. Για να αναμίξετε καλά τον ενεργειακοπιέστε μη τη γέλη λεύκανσης, πιέστε τα σπλήρη εμπρός και πίσω σουκιά και αναμίξτε 25 φορές για κάθε σύριγγα.
6. Πάστε ολίγο την αναμιγμένη γέλη εντός της κόκκινης σύριγγας.
7. Παρατηρήστε για να διαφαρμέτετε τις φυσαλίδες αέρα. Εάν φυσαλίδες υπάρχουν, πάστε τις σύριγγες (μόνο Black Min) στην κόκκινη σύριγγα.
8. Επαλλήλιστε τη ρυή, τη σιωνγή και τη σε γράμμα είναι πλάκκα ώστε η γέλη λεύκανσης μόλις φτάσει στο κάτω μέρος.
9. Επαλλήλιστε τη ρυή, τη σιωνγή και τη σε γράμμα είναι πλάκκα ώστε η γέλη λεύκανσης μόλις φτάσει στο κάτω μέρος.
10. Ακολούθησε τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός» για τα ιαρφάρετα του σπιμάνιωστων ούλων.
11. Εφαρμόστε την πρόσβαση με το προτιμώμενο υλικό απόφραξης κατά την παρασκευή πρόσβασης χρησιμοποιώντας ένα ιαρφάβο βάμβακα και αφήνοντας ένα ελάχιστο πάχος 2-3 mm για το προσωρινό υλικό αποκατάστασης. Σπως είναι για παράδειγμα ένα προσωρινό ρητίνη.) J-Temp ή την προσωρινή κόλλα UltraTemp Regular.
12. Περιμένετε 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης, προτού τοποθετήσετε τη μόνιμη αποκατάσταση. Εάν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκατάστασεις, κατάνε τα ούλα τα σωστά ή τα δόντια. Εν σπάνιοι αάτοι αυτά τα συμπτώματα επιμένει ή επιδεινώθεί μετά τη διακοπή της χρήσης ή σε περιπτώσεις σοβαρής ενόχλησης, καλέστε τον οδοντίατρό σας.
• Εάν το πρόϊόν κατασπθεί, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Εάν το πρόϊόν αναρροφηθεί, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Ενημερώστε τους ασθενείς ότι δεν είναι δυνατή η λεύκανση των λευκών αποκαταστάσεις και γι' αυτό συνιστώ τη λεύκανση των ακόμα δοντιών πριν από την τοποθέτηση του υλικού αποκατάστασης.
• Περιμένετε τουλάχιστον 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης πριν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκαταστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε τα κάτοπτρα για τη βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχουν κενά που να υλίκτονο τα υπολείμματα ούλα. Ούτε η γεμάτη ιστοσελίδα, εφαρμόστε ρητίνη σε αυτά.
• Τηρείστε σε φωτογραφίες ή σε ηλεκτρονικές φωτογραφίες.

Κανονικές χρήσεις
Ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται ένας αναγνώστης. Συνιστάται επαναληπτική θεραπεία λεύκανσης κάθε 3-5 χρόνια.
• Εάν έχετε αποοοιδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost.

Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διασταυρομόλυνση μόλυνση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα απολυμαντικό μέτριας ισχύος μπταζίν των χρήσεων και χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα, η σύριγγα θα πρέπει να ανταμπαστίζεται ως πρώτο μέρος και μόνο χρήση.

Αποθήκευση και απόρριψη
Αποθηκεύετε ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας της εξωτερικής συσκευασίας.
Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Πριν από την απόρριψη του σύριγγα, αναρροφήστε νερό στη σύριγγα και αδειάστε το υγρό στην αποχέτευση. Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο τουλάχιστον φορές πριν πετάξετε τη σύριγγα. Βεβαιωθείτε ότι οι γέλες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ξπλωθεί με νερό.

Διάφορες πληροφορίες
1. Γρεσνοσήμα σε ανώ υπερσελκίδα σε δηλαδή ρετσινέλλα ή ρετσινέλλα.
2. Ασκείστε από κοιλιακός τη βαθιά ημιλιοφάνεια;
3. Σπλύνετε καλά τα δόντι σύριγγες και τα χρησιμοποιήσεις ένγκρι μη νέρο πριν από την απόχρωση για την σπιμάνιωστη πυρκαγιές.
• Πριν από την ανάμιξη, η σύριγγα πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου.
• Ο ασθενής και οι οδοντίατροι πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά με πλευρές ασπίδες κατά τη χρήση του προϊόντος.
• Εάν η γέλη μπτό την ανάμιξη δεν γίνει κόκκινη, μην τη χρησιμοποιήσετε. Δεν είχε αναμιχθεί σωστά.
• Εάν παρουσιαστεί ευαισθησία ή ερεθισμός γαν μαλακών ιστών, διάστε οδηγίες στον ασθενή ώστε να τεμαχισοποιεί ένα μη συνταγογραφούμενο (OTC) σταματικό τοπικό αναισθητικό τζέλ ή λάδι βιταμίνης Ε.
• Περιέχει φθορίνιο ιστού.

Οδηγίες βήματα προς βήμα
Προετοιμασία
1. Πριν από τη θεραπεία, πραγματοποιήστε μια σπουδαία εξέταση και πρόβεστε στη θεραπεία των περιοχών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων: ενδοστικά μεταξύ δόντων, τις ανεπίβαρες οδοντίνες, της τερηδόνας κ.λπ.
2. Προσδιορίστε και καταγράψτε τη βασική σκίαση χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, στον ενδεικτικός, για τη δημιουργία μιας βάσης για την ταχυρύθμιση.

Χρήση - Ανιμμέτη συστήματος λεύκανσης ιατρείου Opalescence Boost
1. Βεβαιωθείτε ότι οι σύριγγες είναι βιδωμένες σφιχτά.
2. Πάστε τη σφιχτό δάχαμο (κίβολο) μέσα στη σύριγγα μέσαία δάχαμο σύριγγα για να προκληθεί ρήξη της εσωτερικής μεμβράνης και να ανοιχθεί το λειανκτικό μα του ενεργειακού.
3. Πάστε τις σύριγγες στο κόκκινο σύριγγες, σπρώχνοντας όλο το περιεχόμενο στην διάφανη σύριγγα.
4. Πάστε τα περιεχόμενα της διάφανης σύριγγας εντός της κόκκινης σύριγγας.
5. Για να αναμίξετε καλά τον ενεργειακοπιέστε μη τη γέλη λεύκανσης, πιέστε τα σπλήρη εμπρός και πίσω σουκιά και αναμίξτε 25 φορές για κάθε σύριγγα.
6. Πάστε ολίγο την αναμιγμένη γέλη εντός της κόκκινης σύριγγας.
7. Παρατηρήστε για να διαφαρμέτετε τις φυσαλίδες αέρα. Εάν φυσαλίδες υπάρχουν, πάστε τις σύριγγες (μόνο Black Min) στην κόκκινη σύριγγα.
8. Επαλλήλιστε τη ρυή, τη σιωνγή και τη σε γράμμα είναι πλάκκα ώστε η γέλη λεύκανσης μόλις φτάσει στο κάτω μέρος.
9. Επαλλήλιστε τη ρυή, τη σιωνγή και τη σε γράμμα είναι πλάκκα ώστε η γέλη λεύκανσης μόλις φτάσει στο κάτω μέρος.
10. Ακολούθησε τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός» για τα ιαρφάρετα του σπιμάνιωστων ούλων.
11. Εφαρμόστε την πρόσβαση με το προτιμώμενο υλικό απόφραξης κατά την παρασκευή πρόσβασης χρησιμοποιώντας ένα ιαρφάβο βάμβακα και αφήνοντας ένα ελάχιστο πάχος 2-3 mm για το προσωρινό υλικό αποκατάστασης. Σπως είναι για παράδειγμα ένα προσωρινό ρητίνη.) J-Temp ή την προσωρινή κόλλα UltraTemp Regular.
12. Περιμένετε 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης, προτού τοποθετήσετε τη μόνιμη αποκατάσταση. Εάν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκατάστασεις, κατάνε τα ούλα τα σωστά ή τα δόντια. Εν σπάνιοι αάτοι αυτά τα συμπτώματα επιμένει ή επιδεινώθεί μετά τη διακοπή της χρήσης ή σε περιπτώσεις σοβαρής ενόχλησης, καλέστε τον οδοντίατρό σας.
• Εάν το πρόϊόν κατασπθεί, πιείτε μεγάλες ποσότητες νερού και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. Εάν το πρόϊόν αναρροφηθεί, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Ενημερώστε τους ασθενείς ότι δεν είναι δυνατή η λεύκανση των λευκών αποκαταστάσεις και γι' αυτό συνιστώ τη λεύκανση των ακόμα δοντιών πριν από την τοποθέτηση του υλικού αποκατάστασης.
• Περιμένετε τουλάχιστον 7–10 ημέρες μετά τη διαδικασία λεύκανσης πριν τοποθετήσετε τα μόνιμα αποκαταστάσεις.
• Μη χρησιμοποιείτε τα κάτοπτρα για τη βιβλιοθήκη ότι δεν υπάρχουν κενά που να υλίκτονο τα υπολείμματα ούλα. Ούτε η γεμάτη ιστοσελίδα, εφαρμόστε ρητίνη σε αυτά.
• Τηρείστε σε φωτογραφίες ή σε ηλεκτρονικές φωτογραφίες.

Κανονικές χρήσεις
Ο ασθενής πρέπει να εξετάζεται ένας αναγνώστης. Συνιστάται επαναληπτική θεραπεία λεύκανσης κάθε 3-5 χρόνια.
• Εάν έχετε αποοοιδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το προϊόν, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/in-office/opalescence-boost.

Επεξεργασία
Για να αποφύγετε τη διασταυρομόλυνση μόλυνση, καθαρίστε τη συσκευή με ένα απολυμαντικό μέτριας ισχύος μπταζίν των χρήσεων και χρησιμοποιήστε προστατευτικό κάλυμμα μίας χρήσης. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί προστατευτικό κάλυμμα, η σύριγγα θα πρέπει να ανταμπαστίζεται ως πρώτο μέρος και μόνο χρήση.

Αποθήκευση και απόρριψη
Αποθηκεύετε ακολουθώντας τις οδηγίες της ετικέτας της εξωτερικής συσκευασίας.
Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Απορρίπτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες, οδηγίες και κανονισμούς.
• Πριν από την απόρριψη του σύριγγα, αναρροφήστε νερό στη σύριγγα και αδειάστε το υγρό στην αποχέτευση. Επαναλάβετε τη διαδικασία δύο τουλάχιστον φορές πριν πετάξετε τη σύριγγα. Βεβαιωθείτε ότι οι γέλες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ξπλωθεί με νερό.

Διάφορες πληροφορίες
1. Γρεσνοσήμα σε ανώ υπερσελκίδα σε δηλαδή ρετσινέλλα ή ρετσινέλλα.
2. Ασκείστε από κοιλιακός τη βαθιά ημιλιοφάνεια;
3. Σπλύνετε καλά τα δόντι σύριγγες και τα χρησιμοποιήσεις ένγκρι μη νέρο πριν από την απόχρωση για την σπιμάνιωστη πυρκαγιές.
• Πριν από την ανάμιξη, η σύριγγα πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου.
• Ο ασθενής και οι οδοντίατροι πρέπει να φορούν προστατευτικά γυαλιά με πλευρές ασπίδες κ