

Ultra-Etch™ 35% Phosphoric Acid	EN	Ultra-Etch™ 35% Phosphorsäure	DE	Ultra-Etch™ Acide phosphorique à 35%	FR	Ultra-Etch™ 35% fosforzuur	NL	Ultra-Etch™ Acido fosforico al 35%	IT
Description: Ultra-Etch is a 35% phosphoric etchant solution with an optimum viscosity. The flowability allows precise placement, including occlusal grooves, yet is viscous enough to prevent migration. Ultra-Etch is self-limiting in its depth of etch (average depth of 1.9μ with 15 second etch). This etchant contains no glycerin and is designed for rapid and complete removal upon rinsing.									
Indications for Use: Used for etching enamel and dentin prior to applying bonding adhesives and placing composite restorations or dental sealants.									
Directions for Use:									
1. For 1.2 syringe a. Remove Luer cap. b. Securely attach working tip of choice (Blue Micro™ or Inspiral™ Brush tip). c. Verify etchant flow prior to applying intraorally. d. Verify the color and consistency of the product flow before applying. Initially a small amount of clear liquid may express from the syringe; this is normal. 2. For IndiSpense™ Syringe (Figure 1 & 2) a. Remove Luer cap from IndiSpense syringe. b. Attach 1.2 syringe to the male threads of the IndiSpense syringe. c. Depress IndiSpense plunger while guiding 1.2ml syringe plunger to desired fill. d. Separate syringes and re-cap IndiSpense syringe with Luer cap. e. Securely attach working tip (Blue Micro™ or Inspiral Brush tip) to 1.2ml syringe. 3. Direct placement instructions a. Isolate tooth (teeth). b. Use pumice, disk or diamond bur on uncut enamel. c. Rinse and dry prepared area. d. Verify etchant flow prior to applying intraorally. e. Apply etchant to enamel and dentin (15 seconds). f. Rinse thoroughly, dry and proceed per adhesive manufacturer's instructions. 4. Restorative phosphoric acid cleansing a. Apply etch to inside of porcelain veneer or crown for 5-10 seconds. b. Rinse and dry Precautions and Warnings: 1. Carefully read and understand all instructions before using. 2. Keep out of reach of children. 3. If product comes in contact with any soft tissue, IMMEDIATELY rinse area with copious amounts of water. 4. Near pulp exposures should be treated with a protective base prior to placing etchant. 5. Re-cap, disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses. If syringe cover is used, remove tip, re-cap, and discard syringe cover. 6. Dispose of tip and empty syringe properly. 7. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips. To avoid cross contamination, do not re-use tips. 8. Store at room temperature. 9. Do not use after expiration date noted on container. NOTE: For SDS and additional information about using Ultra-Etch, please go to www.ultradent.com									
Beschreibung: Ultra-Etch ist ein Ätzpräparat mit 35% Phosphorsäure und einer optimalen Viskosität. Die Fließfähigkeit erlaubt eine präzise Platzierung auch in okklusale Fissuren, aber es ist anderseits viskos genug, um ein Ablauen zu verhindern. Ultra-Etch ist selbstlimitierend in der Attztiefe (durchschnittliche Attztiefe von 1,9 μ bei einer Attzung von 15 Sekunden). Diese Attflüssigkeit enthält kein Glycerin und ist für eine schnelle und vollständige Entfernung durch Abspraysen entwickelt worden.									
Indikationen für die Verwendung: Für das Ätzen von Zahnschmelz und Dentin vor der Aufbringung von Bondings und der Platzierung von Komposit-Restorationen oder Zahnhversiegelungen.									
Verwendungsanweisungen:									
1. Für 1,2 ml-Spritze: a. Luer-Kappe entfernen. b. Befestigen Sie den Ansatz Ihrer Wahl sicher (Blue Micro™ oder Inspiral™ Brush Tip). c. Stellen Sie den korrekten Fluss des Attzels sicher, bevor Sie es intraoral applizieren. d. Farbe und Konsistenz des Produktflusses sicherstellen, indem Sie eine kleine Menge auf einen Mischblock oder auf Gaze ausspreßen. Eventuell ausgesprezzte klare Flüssigkeit überwerfen. 2. Für IndiSpense™ -Spritze (Abbildung 1 & 2): a. Entfernen Sie die Kappe von der IndiSpense-Spritze. b. Befestigen Sie eine 1,2 ml-Spritze auf dem Außengewinde der IndiSpense-Spritze. c. Drücken Sie den Kolben der IndiSpense-Spritze ein, während Sie den Kolben der 1,2 ml Spritze bis zum gewünschten Füllstand herauswandern lassen. d. Trennen Sie die Spritzen und verschließen Sie die IndiSpense-Spritze wieder mit der Luer-Kappe. e. Befestigen Sie Ihre Ansatz (Blue Micro™ oder Inspiral Brush Tip) sicher auf der 1,2 ml Spritze. 3. Anleitung für direkte Restaurierungen a. Isolieren Sie den Zahn / die Zähne. b. Benutzen Sie Bimssteinmehl, Schleif-Disk oder Diamantschleifer bei unpräpariertem Zahnschmelz. c. Spulen und trocknen Sie den vorbereiteten Bereich sorgfältig. d. Stellen Sie den korrekten Fluss des Attzels sicher, bevor Sie es intraoral applizieren. e. Tragen Sie das Attzel auf Zahnschmelz und Dentin auf (15 Sekunden). f. Reinigung von Restaurierungen mit Phosphorsäure Bringt Sie das Attzel auf die Innenseite des Veneers aus Keramik oder der Krone für 5-10 Sekunden auf. g. Spulen und trocknen Sie. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: 1. Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen. 2. Von Kindern fernhalten. 3. Sollte das Produkt mit Haut oder mit Schleimhäuten in Berührung kommen, muss SOFORT mit viel Wasser nachgespült werden. 4. Beim Arbeiten in unmittelbarer Pulpa-Nähe sollte vor dem Auftragen des Ätzmittels eine schützende Unterfüllung gelegt werden. 5. Stecken Sie zwischen den Verwendungen die Kappe wieder auf, desinfizieren Sie die Spritze und waschen Sie sie ab. Benutzen Sie der Desinfektion ein übliches Flächendesinfektionsmittel. Wenn eine Spritzhülle benutzt wird, entfernen Sie den Ansatz zusammen mit der Hülle und entsorgen Sie dann verschließen Sie die Spritze wieder mit der Luer Lock Cap. 6. Entsorgen Sie den Spritzensatz und die leere Spritze ordnungsgemäß. 7. Prüfen Sie den Durchfluss aller Spritzen, bevor Sie diese intraoral anwenden. Sollte es einen Widerstand geben, wechseln Sie den Ansatz aus und prüfen Sie den Durchfluss erneut. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Ansätze. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie die Ansätze nicht wiederholt. 8. Bei Raumtemperatur lagern. 9. Nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum benutzen. HINWEIS: Materialicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz von Ultra-Etch finden Sie auf www.ultradent.com .									
Description : Ultra-Etch est une solution décapante phosphorique à 35% avec une viscosité optimale. La coulabilité permet un placement précis, y compris dans les rainures occlusales, mais il est suffisamment visqueux pour éviter le déplacement. Ultra-Etch est auto-limitant dans sa profondeur d'attaque (profondeur moyenne de 1,9μ pour 15 secondes de décapage). Ce décapant ne contient pas de glycérine et est conçu pour être enlevé rapidement et complètement pendant le rinçage.									
Indications d'emploi : Utilisé pour décaper l'émail et la dentine avant d'appliquer des adhésifs de liaison et de placer des restaurations composites ou des agents d'étanchéité dentaire.									
Mode d'emploi :									
1. Pour une seringue de 1,2 ml a. Enlevez le capuchon Luer b. Fixez fermement l'embout de travail de votre choix (embout pinceau Blue Micro™ ou Inspiral™). c. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-orale. d. Vérifiez la couleur et la consistance de l'écoulement du produit avant d'appliquer en exprimant une petite quantité sur un bloc de mélange ou sur de la gaze. Jetez tout liquide clair qui est exprimé. 2. Pour la seringue IndiSpense (figures 1 & 2) a. Enlevez le capuchon Luer lock de la seringue IndiSpense. b. Fixez la seringue de 1,2 ml sur le filetage mâle de la seringue IndiSpense. c. Enforcez le piston IndiSpense tout en guidant le piston de la seringue de 1,2ml à la marque de remplissage voulue. d. Séparez les seringues et rebouchez la seringue IndiSpense avec le capuchon Luer. e. Fixez fermement l'embout de travail (l'embout pinceau Blue Micro™ ou Inspiral™) sur la seringue de 1,2 ml. 3. Instructions de placement direct a. Isolez la(s) dent(s) b. Utilisez la pierre ponce, une fraise disque ou diamant sur l'émail sans coupe. c. Rincez et séchez la zone préparée. d. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-buccale. e. Appliquez le décapant sur l'émail et la dentine (15 secondes). f. Rincez soigneusement, séchez et continuez selon les instructions du fabricant de l'adhésif. 4. Nettoyage des restaurations à l'acide phosphorique a. Appliquez le décapant à l'intérieur de la facette ou la couronne en porcelaine pendant 5 à 10 secondes. b. Rincez et séchez. Précautions et Avertissements : 1. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits. 2. A garder hors de la portée des enfants. 3. Si le produit entre en contact avec des parties molles, rincez IMMEDIATEMENT la zone affectée avec une grande quantité d'eau. 4. Traitez les parties exposées près de la pulpe avec une base protectrice avant de placer le décapant. 5. Rebouchez, désinfectez et essuyez la seringue avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation. Si le manchon à seringue est utilisé, enlevez l'embout, rebouchez et jetez le manchon de la seringue. 6. Jetez les embouts et les seringues vides. 7. Vérifiez l'écoulement de toutes les seringues avant l'application intra-orale. En cas de résistance, remplacez l'embout et ré-évaluez. N'utilisez que les embouts recommandés. Pour éviter toute contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts. 8. Entreposez à température ambiante. 9. Ne pas utiliser après la date d'expiration notée sur la boîte. NOTE : Pour la fiche technique de santé et de sécurité ou des informations supplémentaires sur l'Ultra-Etch™, veuillez visiter www.ultradent.com									
Beschreibung: Ultra-Etch ist eine Lösung des Äcidos fosforico al 35% mit einer Viscosität optimale. Seine Fließfähigkeit ermöglicht eine präzise Platzierung, einschließlich okklusaler Fissuren, aber es ist auch ausreichend viskos, um ein Ablauen zu verhindern. Ultra-Etch ist selbstlimitierend in der Attztiefe (durchschnittliche Attztiefe von 1,9 μ bei einer Attzung von 15 Sekunden). Diese Attflüssigkeit enthält kein Glycerin und ist für eine schnelle und vollständige Entfernung durch Abspraysen entwickelt worden.									
Indikationen für die Verwendung: Für das Ätzen von Zahnschmelz und Dentin vor der Aufbringung von Bondings und der Platzierung von Komposit-Restorationen oder Zahnhversiegelungen.									
Verwendungsanweisungen:									
1. Für 1,2 ml-Spritze: a. Entfernen Sie die Kappe. b. Befestigen Sie die Spritze an der gewählten Arbeitsspitze (Blue Micro™ oder Inspiral™ Brush tip). c. Überprüfen Sie den Fluss des Acids vor der intraorale Anwendung. d. Überprüfen Sie die Farbe und Konsistenz des Produkts vor der Anwendung, indem Sie eine geringe Menge auf einen Mischblock oder auf Gaze ausspreizen. Eventuell ausgesprezzte klare Flüssigkeit überwerfen. 2. Für Indispense™ Syringe (Figure 1 & 2) a. Entfernen Sie die Kappe von der Indispense syringe. b. Führen Sie die Spritze an den männlichen Gewinden der Indispense syringe an. c. Drücken Sie den Plungern der Indispense syringe, während Sie die Spritze an der gewählten Arbeitsspitze (Blue Micro™ oder Inspiral™ Brush tip) ansetzen. d. Trennen Sie die Spritzen und schließen Sie die Indispense spritze wieder mit der Luer-Kappe. e. Befestigen Sie die Spritze an der gewählten Arbeitsspitze (Blue Micro™ oder Inspiral™ Brush tip). 3. Anleitung für direkte Restaurierungen a. Isolieren Sie die Zähne. b. Benutzen Sie Pumice, Disk oder Diamantfräser auf ungeschliffenen Zahnschmelz. c. Spülen und trocknen Sie den vorbereiteten Bereich sorgfältig. d. Stellen Sie den korrekten Fluss des Attzels sicher, bevor Sie es intraoral anwenden. e. Tragen Sie das Attzel auf Zahnschmelz und Dentin auf (15 Sekunden). f. Reinigen Sie die Restaurierung mit Phosphorsäure. Bringt Sie das Attzel auf die Innenseite des Veneers aus Keramik oder der Krone für 5-10 Sekunden auf. g. Spülen und trocknen Sie. Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise: 1. Lesen und verstehen Sie alle Anleitungen, bevor Sie das Produkt benutzen. 2. Von Kindern fernhalten. 3. Wenn das Produkt mit Haut oder mit Schleimhäuten in Berührung kommt, muss SOFORT mit viel Wasser nachgespült werden. 4. Beim Arbeiten in unmittelbarer Pulpa-Nähe sollte vor dem Auftragen des Ätzmittels eine schützende Unterfüllung gelegt werden. 5. Stecken Sie zwischen den Verwendungen die Kappe wieder auf, desinfizieren Sie die Spritze und waschen Sie sie ab. Benutzen Sie der Desinfektion ein übliches Flächendesinfektionsmittel. Wenn eine Spritzhülle benutzt wird, entfernen Sie den Ansatz zusammen mit der Hülle und entsorgen Sie dann verschließen Sie die Spritze wieder mit der Luer Lock Cap. 6. Entsorgen Sie den Spritzensatz und die leere Spritze ordnungsgemäß. 7. Prüfen Sie den Durchfluss aller Spritzen, bevor Sie diese intraoral anwenden. Sollte es einen Widerstand geben, wechseln Sie den Ansatz aus und prüfen Sie den Durchfluss erneut. Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Ansätze. Um Kreuzkontamination zu vermeiden, verwenden Sie die Ansätze nicht wiederholt. 8. Bei Raumtemperatur lagern. 9. Nicht nach dem auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum benutzen. HINWEIS: Materialicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz von Ultra-Etch finden Sie auf www.ultradent.com .									
Beschreibung: Ultra-Etch è una soluzione decapante di acido fosforico al 35% con viscosità ottimale. Il fluido permette la colocation precisa inclusa nelle fessure occlusali, però lo è sufficientemente viscoso come per evitare che migre. Ultra-Etch è auto-limitante nel suo profondità di grabado (profondità media di 1,9 μ con un grabado di 15 secondi). Questo grabador non contiene glicerina e è disegnato per una rimozione rapida e completa dopo l'assaggio.									
Indicazioni di uso: Per il trattamento dell'etanazione dell'amelto e del dentino prima di applicare gli adesivi e posizionare i restauri in composito o i sigillanti dentali.									
Istruzioni per l'uso:									
1. Per 1,2 ml-spruzzo: a. Rimuovere il cappuccio Luer. b. Inserire saldamente il puntale scelto (puntale Blue Micro™ o Inspiral™). c. Verificare l'apertura del flusso prima di applicare. d. Befestigare la seringa Indispense (Figura 1 & 2): a. Rimuovere il cappuccio Luer dal cappuccio Indispense. b. Inserire la seringa da 1,2 ml nella flettatura maschiola della siringa Indispense. c. Premere lo stantuffo della siringa Indispense e riempire la siringa da 1,2 ml al livello desiderato. d. Separare le siringe e reinserirne il cappuccio Luer sulla siringa Indispense. e. Inserire saldamente il puntale di lavoro (puntale Blue Micro™ o Inspiral Brush) sulla siringa da 1,2 ml. 3. Istruzioni per posizionamento diretto a. Isolare il dente (i denti). b. Preparare lo smalto con pomice, dischi o una spesa diamantata. c. Risciacquare e asciugare l'area preparata. d. Controllare lo scorrimento del mordenzante prima di applicarlo intraoralm. e. Aprire il mordenzante su smalto e dentina (15 secondi). f. Risciacquare accuratamente, asciugare e applicare l'adesivo seguendo le istruzioni del produttore. 4. Pulizia/Deteriorazione del restauro con acido fosforico a. Aprire il mordenzante all'interno della facetta o della corona per 5-10 secondi. b. Risciacquare e asciugare c. Precauzioni ed avvertenze: 1. Leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso. 2. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 3. Nel caso in cui il prodotto dovesse venire in contatto con tessuti molli, sciaccquare IMMEDIATAMENTE con ampia quantità d'acqua. 4. Parti esposte in prossimità pulpare devono essere protette preventivamente con una base prima dell'applicazione del mordenzante. 5. Riciducere e disinettare la siringa, poi pulirne l'esterno con un disinettante di livello medio tra uno e l'altro. Se è stata usata una protezione della siringa, togliere la siringa e ricidurla con il cappuccio e smaltire la protezione. 6. Smaltire il cappuccio e la siringa vuota in maniera corretta. 7. Verificare lo scorrimento del mordenzante prima dell'applicazione intraorale. Se si dovesse sentire della resistenza, sostituire il puntale e riprovare. Usare solo puntali consigliati. Per prevenire la contaminazione crociata, non riutilizzare i puntali. 8. Conservare a temperatura ambiente. 9. Non usare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.									
Precauzioni e avvertenze: 1. Legere attentamente e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso. 2. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 3. Nel caso in cui il prodotto dovesse venire in contatto con tessuti molli, sciaccquare IMMEDIATAMENTE con ampia quantità d'acqua. 4. Parti esposte in prossimità pulpare devono essere protette preventivamente con una base prima dell'applicazione del mordenzante. 5. Riciducere e disinettare la siringa, poi pulirne l'esterno con un disinettante di livello medio tra uno e l'altro. Se è stata usata una protezione della siringa, togliere la siringa e ricidurla con il cappuccio e smaltire la protezione. 6. Smaltire il cappuccio e la siringa vuota in maniera corretta. 7. Verificare lo scorrimento del mordenzante prima dell'applicazione intraorale. Se si dovesse sentire della resistenza, sostituire il puntale e riprovare. Usare solo puntali consigliati. Per prevenire la contaminazione crociata, non riutilizzare i puntali. 8. Conservare a temperatura ambiente. 9. Non usare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione.									
NOTA: Per ottenere la Hoja de Seguridad Médica (SDS) e informaciones adicionales sobre el uso de Ultra-Etch, por favor visite www.ultradent.com									
Beschreibung: Ultra-Etch ist eine 35% fosforhaltende etsplossung mit optimaler Viscosität. Die Viscosität ermöglicht eine leichtere Anwendung in okklusale Fissuren, während sie gleichzeitig genug ist, um Verlagerung zu verhindern. Ultra-Etch ist selbstbegrenzend in seiner Wirkung auf die Attztiefe (durchschnittliche Attztiefe von 1,9 μ bei 15 Sekunden). Diese Attflüssigkeit enthält kein Glycerin und ist für eine schnelle und vollständige Entfernung entwickelt worden.									

Ultra-Etch™ 35% Fosforik oξύ

Περιγραφή:
Το Ultra-Etch είναι ένα διάλυμα αδροποιησής από 35% φωσφορικό οξύ με βέλτιστο ίζωδες. Η διανοτητή ροής επιτρέπει την ακρίβη τοποθέτηση, ακόμη και σ σχοινές σύγκλεισης αλλά είναι αρκετά ίζωδες για να αποτρέπει την μετατοπιση. Το Ultra-Etch αυτοπεριορίζει το βάθος αδροποιησής (μέσος βάθος 1.9μ) με αδροποιησή 15 δευτερόλεπτων. Αυτό το αδροποιητικό δεν περιέχει γλυκερίνη και έχει σχεδιαστεί για ταχεία και πλήρη αφαίρεση κατά την έκπληση.

Ενδείξεις για χρήση:

Χρησιμοποιείται για την αδροποιηση αδαμαντίνης και σοντίνη πριν από την τοποθέτηση συγκόλλητικών ουσιών και την τοποθέτηση σύνθετων αποκαταστάσεων ή σοντάτικων στεγανωτικών υλικών.

Οδηγίες χρήσης:

1. Για αύριγγα 1.2
 - a. Αφαρέστε το πώμα Luer.
 - b. Συνθέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας που θέλετε (άκρο Blue Micro™ ή Inspiral® Brush).
 - c. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποιητικού προτού το θέσετε ενδοστοματικά.
 - d. Επιβεβαιώστε το χώμα κα την πυκνότητα ροής του προϊόντος προτού το απλώσετε, τοποθετώντας ένα μικρό ποσοτό σε επιθέμα ανάμερης ή γάζα. Πετάξτε όλο το διάυγες υγρό που βγαίνει.
 - e. Σύριγγα 1.2 (Εικόνα 1 & 2)
 - f. Αφαρέστε το πώμα Luer από τη σύριγγα Indispense.
 - g. Συνθέστε τη σύριγγα 1.2 στη αρσακή σπειρώματα της σύριγγας Indispense.
 - h. Πιέστε το εμβόλιο Indispense ενώ κατευθύνετε το έμβολο της σύριγγας 1.2ml στην επιθέματη πλήρωση.
 - i. Ξεκινήστε τις ασφαλώς το άκρο εργασίας (άκρο Blue Micro™ ή Inspiral Brush) στη σύριγγα 1.2ml.
 - j. Οδηγήστε τη σύριγγα για την αποτοποιησης.
 - k. Απορροφήστε το δόντι (τα δόντια).

Β. Χρησιμοποιήστε έλαστρόπετρα, διάκο ή γλύφανο από διάυγες στην άκρη άδαμαντίνη.

γ. Ξεπλένετε και στεγνώστε την προετοιμασμένη περιοχή.

δ. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποιητικού προτού το τοποθετήστε ενδοστοματικά.

ε. Απλώστε το αδροποιητικό στην αδαμαντίνη και την σοντίνη (επί 15 δευτερόλεπτα)

στ. Επιβεβαιώστε καλές στεγνώσεις και συνεχίζετε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή συγκόλλητης ουσιάς.

4. Καθαρίστε αποκαταστάσεων με φωσφορικό οξύ

α. Απλώστε το αδροποιητικό στο εσωτερικό μέρος του καπλάνων από πορελάση ή στη στεγάνη επί 5-10 δευτερόλεπτα.

β. Ξεπλένετε και στεγνώνετε.

γ. Συνθέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας (άκρο Blue Micro™ ή Inspiral Brush) στη σύριγγα 1.2ml.

δ. Ξεκινήστε τη σύριγγα για την αποτοποιησης.

ε. Συνθέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας (άκρο Blue Micro™ ή Inspiral Brush) στη σύριγγα 1.2ml.

ζ. Οδηγήστε τη σύριγγα για την αποτοποιησης.

η. Απορροφήστε το δόντι (τα δόντια).

θ. Ξεπλένετε και στεγνώνετε.

ι. Προσφέρετε τη σύριγγα για την αποτοποιηση.

κ. Διαβάστε και κατανοήστε προεποιησές:

1. Διαβάστε και κατανοήστε προεποιησές.

2. Φυλάξτε το μακρά πατινόπιστο από τη πατινόπιστη.

3. Εάν το πορώ έρθει σε επαγγέλμα τη μάτια, ξεπλύνετε με ΑΜΕΣΩΣ τη μάτια με άφρονα νερό.

4. Οι εκθέσεις πλούτου που παρούν πρέπει να θεραπεύονται με προταστική βάση πριν από την τοποθέτηση αδροποιητικού.

5. Επιταποτοπεύστε το πώμα, απολυμάνετε και σκούψτε τη σύριγγα με ένα απολυμαντικό μεριδιανό βαθμού μεταξύ των χρήσεων. Εάν χρησιμοποιείται καλύμμα στη σύριγγα, βγάλτε το άκρο, επιταποτοπεύστε το πώμα και πετάξτε το καλύμμα στη σύριγγα.

6. Πετάξτε το άκρο και αδειάστε τη σύριγγα με τον καταλόπλο τρόπο.

7. Επαγγελμάτε τη ροή όλων των συριγών προτού τις τοποθετήσετε εντός του στόματος. Εάν αυθανάθετε αντίσταση, αντικαταστατεί την άκρη και επανελέγετε. Χρησιμοποιήστε μόνο συντινητικά ακρά. Προς αποφύγη αλληλομάλουνση, μην επαναρριχημοποιείτε τα άκρα.

8. Φυλάξτε το δέρμα της σύριγγας σωματικού.

9. Μην το χρησιμοποιείτε σφράνετε από δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το Φύλλο Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας (SDS) και πρόσθιες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ultra-Etch, παρακαλούμε δέτε τη διεύθυνση www.ultradent.com

Ultra-Etch™ %35 Fosforik Asit

Tanım:

Ultra-Etch, yüksek viskozitesi %35 fosforik etchant solüsyonudur. Aksıkan olmasi sayesinde okulöz oyuşuklar dahi olmak üzere hasarles yerleşmesiyle olanağı sağlar, bunun yanı sıra migrasyonu önlemeyek kaderdir. Ultra-Etch, etch derinliğinde kendi kendini kısıtlar (ortalama derinlik 1,9y / 15 saniye etch). Etch etchant, gliserin serbesti ve kompozitlerdeki sivularla hızla durulmaya başlamaktır. Kullanımı Endikasyonları:

Bonding yapıştırıcı ve kompozit restorasyon veya diş dolgu maddeleri uygulamadan önce mine ve dentine etching yapmak için kullanılır.

Kullanım Talipleri:

1. 1,2lik sırlıq içi.

a. Luer kapaklı çırkınlı.

b. Seçtiğiniz çalışma ucunu (Blue Micro™ veya Inspiral® Brush) tipi içi.

c. Ağız içine uyguladıktan önce etchant akıp akmadığına tıpkı.

d. Uygulamadan önce, karıştırma pedine veya gazlı bez kükürd bir miktar sıkarak akan ürünün rengini kırmızıya dönüştürün. Sıkılan şeffaf sırlı.

2. Indispense® Sırlıq (İşek 1 ve 2)

a. Luer kapaklı Indispense sırlıqdan çıkarın.

b. 1,2lik sırlıq İndispense sırlıqdan çıkarın.

c. Indispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

d. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

e. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

f. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

g. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

h. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

i. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

j. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

k. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

l. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

m. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

n. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

o. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

p. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

q. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

r. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

s. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

t. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

u. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

v. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

w. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

x. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

y. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

z. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

aa. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

bb. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

cc. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

dd. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

ee. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

ff. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

gg. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

hh. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

ii. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

jj. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

kk. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

ll. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

mm. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

nn. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

oo. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

pp. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

qq. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

rr. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

ss. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

tt. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

uu. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

vv. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

ww. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

xx. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

yy. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

zz. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

aa. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

bb. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.

cc. İndispense sırlıq kapağından Luer kapılı bir İndispense sırlıq içi çıkarın.