

Grupos de riesgo

- Mayores de 65 años.
- Niños/as entre 6 meses y 2 años (un año y 364 días).
- Gestantes (en cualquier momento del embarazo).
- Puérperas (hasta 30 días posteriores al parto, si no la hubieran recibido en el embarazo durante el 2024).
- Personas entre 2 y 64 años inclusive que presenten alguna de las siguientes condiciones:

Enfermedades respiratorias:

- a)** Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, EPOC, Enfisema Congénito, Displasia Broncopulmonar, Traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.).
- b)** Asma

Enfermedades cardíacas:

- a)** Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía.
- b)** Cardiopatías congénitas.

Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas:

- a)** Infección por VIH.
- b)** Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides a altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días).
- c)** Inmunodeficiencia congénita.
- d)** Asplenia funcional o anatómica.
- e)** Desnutrición severa.

Pacientes oncohematológicos y trasplantados:

- a)** Tumor de órgano sólido en tratamiento
- b)** Enfermedad oncohematológica hasta 6 meses posteriores a la remisión completa.
- c)** Trasplantados de órganos sólidos o tejido

Personas con:

- a)** Obesidad con IMC mayor a 40.
- b)** Diabetes.
- c)** Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes 6 meses.
- d)** Retraso madurativo severo en menores de 18 años.
- e)** Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves.
- f)** Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años.
- g)** Convivientes o contactos estrechos de enfermos onco-hematológicos. Requiere receta médica.
- h)** Trabajadores de la salud.