

Tableau 27.1. A Définitions des accouchements.

Accouchement	Ensemble des phénomènes qui conduisent à l'expulsion du fœtus et des annexes (placenta, liquide amniotique et membranes) après 30 SA
Accouchement eutocique ou normal	Accouchement qui aboutit par la seule influence des phénomènes naturels à l'expulsion de l'enfant par voie basse
Accouchement dystocique	C'est celui qui entraîne des difficultés ou des impossibilités d'accouchement par voie basse
Accouchement prématuré	Accouchement qui survient avant 37 SA
Date du terme	Date de premier jour des dernières règles + 10 jours + 9 mois = 40,5 SA = date présumée de l'accouchement (intérêt de l'échographie avant 20 SA)

Tableau 27.2. A Les quatre étapes du travail.

1 ^{re} étape du travail	Depuis le début du vrai travail jusqu'à la fin de la dilatation du col de l'utérus (dilatation cervicale) Durée : 6 à 18 heures chez la primipare et 2 à 10 heures chez la multipare
2 ^e étape du travail	Depuis la fin de la dilatation du col de l'utérus à la naissance de l'enfant (descente de la présentation et expulsion) Durée : jusqu'à 3 – 4 heures maximum
3 ^e étape du travail	De la naissance de l'enfant jusqu'à l'expulsion du placenta (délivrance) Durée : 5 à 30 minutes
4 ^e étape du travail	De la délivrance jusqu'à la stabilisation des constantes maternelles Durée : environ 2 heures

B. Clinique, surveillance du travail

1. Interrogatoire

Il recueille les éléments suivants : gestité, parité, âge, aménorrhée, antécédents médicaux et chirurgicaux, antécédents gynécologiques et obstétricaux, déroulement et surveillance de la grossesse, maladies associées à la grossesse, résultats des examens prénatals.

2. Examen clinique général

Il mesure PA, pouls, température, poids, et recherche la présence de sucre et de protéines dans les urines.

3. Examen obstétrical

Palpation de l'abdomen

Elle apprécie la présentation fœtale longitudinale ou transversale par la recherche du pôle céphalique et du plan du dos.

Mesure de la hauteur utérine

La HU est mesurée en dehors d'une CU (en moyenne : 33 cm).

Examen du périnée

Il recherche la présence d'herpès, de cicatrices, d'anomalie congénitale, etc.