

Énoncés et questions manquants dans le livre

QI 44

Parmi les dosages suivants, lequel (lesquels) est (sont) indispensable(s) pour porter le diagnostic d'une hypothyroïdie périphérique ?

- A. TSH
- B. thyroglobuline
- C. calcitonine
- D. anticorps anti-TPO
- E. anticorps anti-récepteurs de la TSH

QI 45

Parmi les propositions suivantes concernant le diagnostic d'insuffisance surrénalienne périphérique, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. la cause la plus fréquente chez l'adulte est la rétraction corticale
- B. le diagnostic nécessite la réalisation d'une imagerie surrénalienne
- C. le bloc en 21-hydroxylase est dépisté de manière systématique à la naissance
- D. la réalisation du test au Synacthène® est impérative, même dans l'urgence
- E. la seconde cause est le traitement par corticoïdes

QI 46

Parmi les situations suivantes, laquelle (lesquelles) pourrai(en)t être responsable(s) d'une obésité ?

- A. syndrome de Cushing
- B. thyroïdite de Hashimoto
- C. phéochromocytome
- D. hyperprolactinémie
- E. ménopause

QI 47

Parmi les paramètres suivants, lequel (lesques) vous permet(tent) d'évoquer le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques chez une jeune patiente de 17 ans ?

- A. ménométrorragies
- B. présence de kystes ovariens bilatéraux à l'échographie pelvienne
- C. hypertrophie du stroma ovarien > 10 ml à l'échographie pelvienne
- D. aménorrhée secondaire
- E. testostérone dosée à 3,4 ng/ml (N : 0,1–1,0)

QI 48

Parmi les propositions suivantes concernant le taux de LDL-cholestérol, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

- A. le taux de LDL-cholestérol est estimé en soustrayant le dosage du HDL-cholestérol du dosage de cholestérol total
- B. le taux de LDL-cholestérol n'est pas calculable si les triglycérides sont supérieurs à 3,4 g/l
- C. le taux de LDL-cholestérol n'est pas interprétable s'il existe une stéatose hépatique
- D. le taux de LDL-cholestérol n'est pas intéressant à évaluer car les triglycérides sont les plus athérogènes
- E. la cible de LDL-cholestérol d'un patient diabétique de type 1 est de 1,60 g/l

QI 49

Parmi les critères suivants, lequel (lesquels) doi(ven)t vous conduire à prescrire un dépistage du diabète gestationnel chez une femme de 43 ans ?

- A. son âge
- B. un IMC en début de grossesse à 31 kg/m²
- C. un père diabétique de type 1
- D. une mère diabétique de type 2
- E. une première grossesse ayant donné naissance à un enfant de 3 250 g à terme

QI 50

Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle (lesquelles) vous oriente(nt) plus volontiers vers un nodule thyroïdien bénin ?

- A. nature kystique à l'échographie
- B. adénopathies cervicales
- C. calcitonine à 135 pg/ml (N < 10)
- D. thyroglobuline normale
- E. nodule hypoéchogène avec calcifications