


**Fig. 12.5.** IRM du pelvis, séquence T1 avec saturation de graisse, section transversale. Kystes endométriosiques ovariens bilatéraux en hypersignal.



**Fig. 12.6.** IRM du pelvis, séquence T2, section transversale.

Nodule d'endométriose profonde infiltrant les culs-de-sac droit et postérieur du vagin, la paroi antérolatérale droite du moyen rectum, le paramètre droit, étendu jusqu'à la paroi droite du pelvis et aux racines sacrées droites. La patiente présentait des dyspareunies profondes, des douleurs intenses de défécation et une sciatgie droite.



**Fig. 12.7.** IRM du pelvis, séquence T1, section sagittale.

Utérus augmenté de volume, avec spots en hypersignal dans le myomètre correspondant à des microkystes témoignant d'une adénomyose.

## C. Autres examens d'imagerie

D'autres examens sont indiqués dans les cas sévères, en fonction de la localisation des lésions d'endométriose visualisées sur l'échographie et l'IRM :

- échographie endorectale et coloscanner en cas d'endométriose colorectale;
- cystoscopie, uroscanner ou uro-IRM en cas d'endométriose de l'appareil urinaire;
- IRM et scanner du diaphragme en cas d'endométriose du diaphragme;
- etc.

## D. Bilan biologique

Il n'est pas spécifique. Une augmentation du taux de la CA125 peut être observée en cas d'endométriose ovarienne ou péritonéale diffuse, mais ce dosage non spécifique ne fait pas partie du bilan.

## E. Coelioscopie

Elle permet éventuellement le diagnostic de certitude (par l'exploration de la cavité abdominale avec biopsie ciblée et analyse anatomopathologique) et le traitement des lésions.

En cas d'infertilité, elle permet la classification pronostique selon l'AFSr (*American Fertility Society revised*).

Néanmoins, le diagnostic de certitude (et donc la coelioscopie diagnostique) n'est pas indispensable pour instaurer le traitement médical chez les patientes symptomatiques.

## V. Principes thérapeutiques

L'endométriose est une pathologie chronique, avec un potentiel évolutif rythmé par les règles qui couvre la période allant de la puberté jusqu'à la ménopause, qui peut se présenter sous