

Medikamente in der Pädiatrie, 5. Auflage, ISBN 978-3-437-21455-4

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf **Seite 206** (Penicillin G (Benzylpenicillin), auf **S. 241** (Salbutamol) und auf **S. 182** (Naloxon) haben sich Fehler bei den Standarddosierungen eingeschlichen:

- **S. 206: Penicillin G (Benzylpenicillin)** – korrekt muss es heißen:

Standarddosierung	2–12 Mon.	30.000–500.000 IE/kg/d in 4–6 ED
	1–12 J.	30.000–500.000 IE/kg/d in 4–6 ED

- **S. 241 Salbutamol (Oral Salbubronch-Elixier®)** für das Alter 2-23 Monate – korrekt muss es heißen:

Oral Salbubronch-Elixier®	bei mangelnder Inhalationskompetenz/-compliance im Sgl.- und KK-Alter	
	2–23 Mon.	Initial 1 Tropf./kg um Verträglichkeit zu prüfen, dann • (1–)2(–3) Tropf./kg 3 x tgl. • 4–6 kg 9(–13) Tropf. 2–3 x tgl. • 6–9 kg 13(–17) Tropf. 2–3 x tgl. • 9–12 kg 17(–20) Tropf. 2–4 x tgl. • max.: 5–9 Tropf./kg/d (0,3–0,6 mg/kg/d) Cave: NW
	2–6 J.	Initial 1 Tropf./kg um Verträglichkeit zu prüfen, dann • 15–30 Tropf. 3 x tgl. • 12–18 kg 20–25 Tropf. 2–4 x tgl: • max.: 60–120 Tropf./d Cave: NW

Medikamente in der Pädiatrie, 5. Auflage, ISBN 978-3-437-21455-4

- **S. 182: Naloxon** – korrekt muss es heißen:

Darreichungsform

Injektionslösung 0,4 mg in 1 ml
0,04 mg in 2 ml (Narcanti neonatal)

Indikation

Opiatantagonist zur Therapie der Atemdepression nach Opiatgabe an Kind (oder Mutter unter der Geburt),
Antidot bei Opiatintoxikation

Dosierung

Antagonisierung von Opiat-Narkotika, z. B. in der Neonatologie	<ul style="list-style-type: none">• 0,01 mg/kg/ED i. v. (notfalls auch i. m. oder intratracheal)• bei Bedarf repetitive Dosis alle 2–3 Min.: z. B. bei KG 2 kg = □ Amp. Narcanti Neonatal (= 0,02 mg); bei KG 4 kg = 1 Amp. Narcanti Neonatal (= 0,04 mg)
---	--

Wir bedauern die Fehler und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Elsevier GmbH