

Erratum

Ellegast

Basics Allgemeine und Spezielle Pharmakologie (1. Aufl.)

ISBN 978-3-437-42791-6

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ergänzung zur Substanz Flupiritin S. 103:

Flupiritin wurde 2018 in Deutschland die Zulassung entzogen, Grund waren hepatotoxische Effekte, insbesondere bei längerer Anwendung. In anderen Ländern wird die Substanz weiterhin eingesetzt (Lawson Kim 2019, Naguri et al. 2019, Yadav et al. 2019) und hat zuletzt auf Grund eines neuroprotektiven Effekts auf sich aufmerksam gemacht (Sampath et al. 2020).

Hyperlipoproteinämie

Zielwerte

- KHK und KHK-Risikoäquivalent: < 70 mg/dl
- ≥ 2 KHK-Risikofaktoren: < 100 mg/dl
- ≤ 1 KHK-Risikofaktoren: < 115 mg/dl

Therapieprinzipien

1. Allgemeinmaßnahmen
2. Pharmakotherapie:
 - **Statine:** \downarrow HMG-CoA-Reduktase – stärkste LDL-Senkung – meist erste Wahl
 - **Fibrate:** Beeinflussung von Transkriptionsfaktoren – starke Triglyzeridsenkung
 - **Ezetimib:** \downarrow intestinale Cholesterinresorption
 - **Colestyramin und Colestipol:** \downarrow Gallensäurerückresorption

Es muss LDL heißen

Wir bedauern die Fehler und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, dieses Werk zu verbessern. Bitte richten Sie Ihre Anregungen, Lob und Kritik an folgende E-Mailadresse: kundendienst@elsevier.com

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Elsevier GmbH



ELSEVIER

www.elsevier.de

Empowering Knowledge™