

Errata

Ron Walls, Robert Hockberger

Rosen. Medicina de urgencias: conceptos y práctica clínica, 10ª Ed.

ISBN 978-84-1382-505-2

Apreciado lector,

En la página 29, en el epígrafe Farmacología: analgesia y sedación del paciente ventilado, en el quinto párrafo, hemos detectado una errata en la dosificación de la morfina.

Donde dice:

La morfina (0,5- 1 mg/kg en bolo i.v.) y el fentanilo (en función del peso, de 0,5 a 1 µg/kg n bolo i.v.) se pueden usar para la analgesia, aunque las necesidades de dosificación variarán según la tolerancia y el metabolismo del fármaco.

Debe decir:

La morfina (0,1 a 0,2 mg/kg en bolo i.v.) y el fentanilo (en función del peso, de 0,5 a 1 µg/kg n bolo i.v.) se pueden usar para la analgesia, aunque las necesidades de dosificación variarán según la tolerancia y el metabolismo del fármaco.

Lamentamos el error y le agradecemos su comprensión. Agradecemos cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar esta obra.

Por favor, dirija sus comentarios, valoraciones y críticas a la siguiente dirección de correo electrónico: atencionalcliente@elsevier.com

Atentamente,

Equipo de Elsevier España



www.elsevier.es