



Knowledge grows

YaraVita™ ZINTRAC™ 700

YaraVita™ ZINTRAC™ 700 е концентриран продукт със съдържание на Цинк, създаден за листово приложение.

Съдържание на YaraVita™ ZINTRAC™ 700:

Състав: Zinc 40% (w/w), 70 % (w/v) - 700 г/л
Съдържа намокрителни и прилепителни.

Защо листово приложение ?

Листното пръскане гарантира прецизното приложение на точния елемент в подходящото време, за да задоволи моментните нужди на растението.

С листово приложение се гарантира бързото усвояване на хранителните елементи от растенията и като резултат, фермерите не зависят от почвените показатели, за да възстановят или подсилват дадени култури.

Предимства на листовия топ YaraVita™ ZINTRAC™ 700:

- YaraVita™ ZINTRAC™ 700 е високо концентрирана течна формулация за листово приложение, съдържаща 3-ю пъти повече цинк от стандартните продукти на пазара.
- YaraVita™ ZINTRAC™ 700 е много по-лесен за употреба от прахообразните продукти съдържащи цинк, по-лесно се разтваря и смесва в резервоара на пръскачката.
- YaraVita™ ZINTRAC™ 700 е с по-ниски норми на приложение и е по-лесен за съхранение и транспорт.
- YaraVita™ ZINTRAC™ 700 се усвоява бързо от

културата, но също така има и удължен период на действие, което ни дава възможност за добър ефект с по-малък брой приложения.

• YaraVita™ ZINTRAC™ 700 се смесва с много агрохимикали, което прави продукта лесен за интегриране в програмата за растителна защита, спестявайки време и пари.

Посетете : tankmix.com за повече информация.



ПРЕПОРЪКИ ПО КУЛТУРИ:



Царевица

Доза - 100 мл/дка. Фаза 3 – 8 лист.
При нужда може да бъде повторено след 14 дни.

Количество вода за пръскане 20 л/дка.



Зърнени култури

Доза - 100 мл/дка. Фаза от 2-ри лист до 1-во междувъзлие.
При нужда може да бъде повторено след 14 дни.

Количество вода за пръскане – 5 -20 л/дка.



Слънчоглед

Доза – 100 мл/дка. Фаза 2-4 двойка листа. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Рапица

При еднократно приложение във фаза начало на формиране на стъблото – 100 мл/дка.
При двукратно: пръскане във фаза 4-6 лист – 50 мл /дка и второ пръскане във фаза удължаване на стъблото на рапицата – 50 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Череша и сливи

Доза -100 мл/дка . Фаза зимни пъпки. Фаза розови пъпки. Не пръскайте по време на цъфтеж!
Фаза след прибиране на плодовете преди листопад.

Количество вода за пръскане 50 л/дка.



Малини

Доза - 50 мл/дка. Фаза зелена пъпка.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Ягоди полско производство

Доза - 50 мл/дка. Фаза зелена или бяла пъпка. Фаза след прибиране на реколтата и възстановяване на растежа.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.





Ягоди в оранжерии

Максимална концентрация: 50 мл **YaraVita™ ZINTRAC™ 700** на 100 л вода.

Максимално количество вода: 100 л/дка



Оранжерийни култури

Максимална концентрация: 50 мл **YaraVita™ ZINTRAC™ 700** на 100 л вода.

Максимално количество вода: 100 л/дка



Картофи

Доза – 100 мл/дка. Фаза една седмица след 100% поникване. При нужда може да бъде повторено след 14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Домати, пипер и патладжан полско производство

Доза – 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Лозя

Доза – 50-100 мл/дка. Фаза при наличие на достатъчно листна маса през пролетта преди цъфтеж. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане 20-50 л/дка.



Фасул и соя

Доза – 50-100 мл/дка. Фаза начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Люцерна и детелина

Доза – 50-100 мл/дка. Фаза през пролетта след начало на вегетацията. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.





Knowledge grows



Тютюн

Доза – 50-100 мл/дка. Фаза след разсаждане при наличие на достатъчно листна маса за пръскане преди цъфтеж. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане 20-50 л/дка.



Краставици дългоплодни и корнишони

Доза – 50-100 мл/дка. Фаза 10-14 дни след поникване/разсаждане до начало на бутонизация. При нужда може да се повтори след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.



Ябълки, круши

Доза - 100 мл/дка. Пролет: Фаза набъбване на пъпките. Фаза веднага след края на цъфтежа. Не пръскайте по време на цъфтеж! Лято/есен: Фаза след прибиране на плодовете преди листопад.

Количество вода за пръскане – 50 л/дка.



Царевица третирана с YaraVita™ ZINTRAC™ 700



Царевица с липса на Цинк

Офиси:

Дистрибутор за: