



Product Advice (YaraVita BIOTRAC)

"ЯГОДИ: Отглеждане на полето: 300 мл/ дка - първо приложение при фаза зелена пъпка, при цъфтеж и повторете след 10 -14 дни. Вода: 20 л / дка минимум.

АВОКАДО: приложение преди цъфтеж, повреме на цъфтеж и след формиране на плод в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л/дка а минимум.

АСПАРАГУС: Прилага се в доза 300 мл/дка, при достатъчна листна маса, през интервал от 10 до момента на стареене на листа. Вода : 20 л / дка.

БАДЕМ: Прилага се след поява на първи листа, в началото на цъфтеж и в каря на цъфтеж; при оформяне на плодове в доза 300 мл/дка. Вода : 20 л/дка, минимум.

БОБОВИ: може да направите три приложения от 300 мл / дка, през интервал от 10 - 14 дни, първо пръскане във фаза 4 - 6 трилистник. Вода: 20 л / дка минимум.

БОРОВИНКА:Прилагайте в началото на цъфтежа, повторете при пълен цъфтеж и формиране на плодове. Доза на приложение 200 - 300 мл/дка. Също така, прилагайте по време на стрес, може да повторите приложението през интервал от 10 - 14 дни, ако е необходимо. Вода: 20 л / дка.

БРОКОЛИ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ВИНЕНИ ЛОЗЯ: 300 мл / дка при набъбване на пъпки, разпукване на пъпки, формиране на грозд и затваряне на чепка 300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

Всички култури (полско производство): Прилага се след разсаждане и в периоди на стрес или интензивен растеж, в до за 100 - 300 мл/дка. Прилага се през на интервали от 10 до 14 дни. Вода: 20 л/дка.

ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ: 300 мл / дка при набъбване на пъпки, разпукване на пъпки, формиране на грозд и затваряне на чепка 300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ДОМАТИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

ЕЧЕМИК: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интервал от 10-14 дни. Вода: 20 л/дка, минимум.

ЗАХАРАНА ТРЪСТИКА: Три приложения от по 300 мл / дка, когато тръстиката е висока между 30 и 120 см, като второто и третото приложения се правят през интервали от 10 - 14 дни. Вода: 20 л / дка минимум.



Product Advice (YaraVita BIOTRAC)

ЗАХАРНО ЦВЕКЛО: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ЗЕЛЕВИ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ЗЕЛЕВИ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интервал от 10-14 дни. Вода: 20 л/дка, минимум.

КАЙСИЯ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

КАЛАБРЕЗЕ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

КАРТОФИ: Прилага се в доза 300 мл/дка , 7 до 14 дни след 100-процентово поникване, 20 дни от начало на клубено обрзуване и след анализ на петиоли. Може да прилагате и по време на нарастване на клубените. Вода: 20 л / дка минимум.

КАРФИОЛ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

КАФЕ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

КИВИ: Две приложения по 300 мл / дка през интервал от 10 - 14 дни, от разпукване на пъпки до начало на цъфтеж, след това 5 до 21 дни след падане на венчелистче. Вода: 20 л / дка минимум.

КРАСТАВИЦА: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум. При монокултурно отглеждане: 300 мл / дка от фаза 4 - 6 листа. Приложенията могат да се повтарят през интервали от 10 - 14 дни, ако е необходимо. Вода: 20 л / дка.

КРУШИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ЛЕШНИК: Приложете 300 мл / дка, при поява на първи листа, в началото на цъфтежа и в края на цъфтежа / формирането на плодовете. Вода: 20 л / дка минимум.

ЛИМОН: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.



Product Advice (YaraVita BIOTRAC)

ЛОЗЯ: 300 мл / дка при набъбване на пъпки, разпукване на пъпки, формиране на грозд и затваряне на чепка 300 мл/дка. Вода: 20 л/дка.

ЛУК: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

МАСЛИНИ: 300 мл/дка при разпукване на пъпки, 10 до 14 дни след цъфтежа и по време на образуването на плодове. Вода: 20 л / дка минимум.

МОРКОВИ: Започнете приложението при височина на културата 15 см, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

НАР: 300 мл/дка приложение преди цъфтеж, по време на цъфтеж и при формиране на плод. Вода 20 л/дка минимум.

НЕКТАРИНИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл /дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ОВЕС: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интервал от 10-14 дни. Вода: 20 л/дка, минимум.

ОРАНЖЕРИЙНИ КУЛТУРИ: Максимална концентрация 0,3 литра на 100 литра вода. Вода: 100 л / дка максимум. Вижте еквивалентната култура за отглеждане на полето за периода на приложение.

ОРЕХИ: Приложете 300 мл / дка, при поява на първи листа, в началото на цъфтежа и в края на цъфтежа / формиране на плодове. Вода: 20 л / дка минимум.

ОРИЗ: прилагайте 300 мл/дка преди братене. Вода 20 л/дка.

ПАМУК: Прилага се при фаза цветни пъпки и след отваряне на цвета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ПАТЛАДЖАН: три приложения в доза 300 мл/дка, през интервал от 10 - 14 дни. Първо приложение след формиране на 4-6 листа. Вода: 20 л /дка минимум.

ПИПЕР/ЧУШЛЕТА: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

ПОРТОКАЛИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл /дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ПРАСКОВИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.



Product Advice (YaraVita BIOTRAC)

ПШЕНИЦА: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интервал от 10-14 дни. Вода: 20 л/дка, минимум.

ПЪПЕШ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ПЪПЕШ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

РАЗСАДНИЦИ, ОКРАСНИ КУЛТУРИ: (На открито) 100 до 200 мл / дка, веднага след като има достатъчно листна маса, за да се задържи разтворът. Повторете при необходимост през интервал от 10 до 14 дни. Избягвайте приложения по време на цъфтеж. Направете максимум три приложения през вегетация. Вода: 10 до 20 л / дка.

РАПИЦА: 100 до 300 мл / дка във фаза 4-9 листа и отново при стрелкуване до началото на цъфтежа. Водата. 5-20 л / дка.

РЪЖ: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интервал от 10-14 дни. Вода: 20 л/дка, минимум.

САЛАТИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

СЛИВИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

СЛЪНЧОГЛЕД: Започнете приложението във фаза 4-та 6-та двойка листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

СОРГО: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

СОЯ: Може да направите три приложения от 300 мл / дка, през интервал от 10 - 14 дни, първо пръскане във фаза 4 - 6 трилистник. Вода: 20 л / дка минимум.

ТИКВИЧКИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум. При монокултурно отглеждане: 300 мл / дка от фаза 4 - 6 листа. Приложенията могат да се повтарят през интервали от 10 - 14 дни, ако е необходимо. Вода: 20 л / дка.

ТИКВОВИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

ТЮТЮН: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: от 3 до 20 л / дка.



Product Advice (YaraVita BIOTRAC)

ФЕРТИГАЦИЯ: от 500 мл до 1 л / дка, приложено чрез система за фертигация. Използвайте самостоятелно. След подготовка на разтвора използвайте веднага. След приложение промийте системата с вода. НЕ използвайте в "затворени" и "рециркулиращи" системи. НЕ използвайте при култури, отглеждани в саксии или контейнери. Може да повторите приложенията съобразявайки условията за фертигация посочени по горе. Може да съчетаете с приложения за листни пръскания спрямо препоръките посочени по култури.

ЦАРЕВИЦА: 300 мл/дка във фаза 4-5 листа. Вода 20 л/дка минимум.

ЦИТРУСИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ЧЕРЕША: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ЧИЛИ: Прилага се преди цъфтеж, по време на цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ЯДКИ (ЛИСТОПАДНИ): Приложете 300 мл / дка, при поява на първи листа, в началото на цъфтежа и в края на цъфтежа / формиране на плодове. Вода: 20 л / дка минимум.