



**ТОРЕНЕ ПРИ
РЕГЕНЕРАТИВНИ ПРАКТИКИ**



**ГРИЖА ЗА
ПОЧВАТА И ПРИРОДАТА**

Примерна схема на торене при рапица

						
	YaraMila™	YaraVera™	YaraLiva™	YaraBela™	YaraVita™	YaraAmplix™
Предсеитбено торене	Хелиос 13/11/21+ Mg+B или Трипъл 16/16/16 10 - 20 кг/дка					
Третиране на семена					Тепросин 1 л / 100 кг семе	
Формиране на листна розетка					Браситрел 200 мл/дка	
Развитие на розетка – пролет		Амидас 15-20 кг/дка			Оптитрак 150 мл/дка	
Стрелкуване			Аксан - 15 кг/дка или Сулфан - 15 кг/дка или Тропикот - 20 кг/дка		Браситрел 200 мл/дка	Оптиви 50-100 мл/дка
Развитие на съцветия						
Цъфтеж						
Образуване и узряване на плодове						

* За всяка фаза на приложение избираме един от посочените продукти, като нормите се определят индивидуално, в зависимост от почвено климатичните условия на средата

Примерна схема на торене при слънчоглед

					
	YaraMila™	YaraLiva™	YaraBela™	YaraVita™	YaraAmplix™
Предсеитбено торене	Стар Плюс 21/17/3 + 10SO ₃ + Mg + Zn или Хелиос 13/11/21 + Mg + B или Трипъл 16/16/16 15-20 кг/дка				
Третиране на семена				Тепросин 1 л / 100 кг семе	
2ра – 4та двойка листа		Тропикот - 15 кг/дка или Аксан - 15 кг/дка			
4та – 6та двойка листа				Браситрел 150 мл/дка	Оптиви 50 мл/дка
Фаза „бутонозация“				Бортрак 100 мл/дка	

* За всяка фаза на приложение избираме един от посочените продукти, като нормите се определят индивидуално, в зависимост от почвено климатичните условия на средата



Примерна схема на торене при пшеница

	 YaraMila™	 YaraVera™	 YaraBela™	 YaraLiva™	 YaraVita™	 YaraAmplix™
Предсеитбено торене	- Трипъл 16/16/16 - Стар Плюс 21/17/3 + SO₃ + Mg + Zn или - Грейн 18/20 + SO₃ + Zn + Fe 15-20 кг/дка					
Третиране на семена					Тепросин 300мл / 100 кг семе	
Растеж и развитие през есента						
Братене	- Или повърхностно приложение - Трипъл или Стар Плюс 10 кг/дка	Амидас 13-15 кг/дка			Оптитрак 200 мл/дка	Оптиви 100 мл/дка
Вретенене интензивен растеж			Аксан - 12-15 кг/дка или Сулфан - 12-15 кг/дка или Тропикот - 15-17 кг/дка			
Издължаване на стъбло – флагов лист					Грамитрел 200 мл/дка Сейф Н 500 мл/дка	
Изкласяване						

* За всяка фаза на приложение избираме един от посочените продукти, като нормите се определят индивидуално, в зависимост от почвено климатичните условия на средата



Примерна схема на торене при царевица

	 YaraMila™	 YaraLiva™	 YaraBela™	 YaraVita™	 YaraAmplix™
Предсеитбено торене	Хелиос 13/11/21 или Трипъл 16/16/16; 12-24 кг/дка				
Третиране на семена				Тепросин 0,8 л / 100 кг семе	
Листно пръскане 3ти-5ти лист				Зеатрел 150 мл/дка	Оптиви 50 мл/дка самостоятелно или в комбинация
Листно пръскане 6ти-8ми лист				Цинтрак - 50-70 мл/дка + Бортрак - 100 мл/дка	
Време на вегетация		Тропикот - 20- 30 кг/дка или Аксан или Сулфан - 15-25 кг/дка			

* За всяка фаза на приложение избираме един от посочените продукти, като нормите се определят индивидуално, в зависимост от почвено климатичните условия на средата



Торовете YaraMila (ЯраМила) отговарят на всички изисквания за регенеративно земеделие. Торовете, като троен суперфосфат, обикновените NPK гранули, калиев хлорид и други изискват заораване и предварително внасяне в почвата, докато YaraMila (ЯраМила) може да се прилага на повърхността, по време на сеитбата и за подхранване на вече поникнали растения. Доказано и с голям успех! Така позволяват спазване на наложените екологични ограничения за лятна и есенна оран.

Основното или стартиращото подхранване е важно за възможно най-добрия старт на житните и маслодайните култури. Бързото и равномерно развитие е най-добрият начин да се противодейства на различните вредители. По-доброто развитие на кореновата система подобрява усвояването на наличните ресурси от хранителни вещества и влага.

Балансирано и ефективно управление на хранителните вещества необходими за земеделските култури е от ключово значение за поддържането и подобряването на почвеното плодородие и възстановяването на биоразнообразието на почвата. Хранителни вещества, като азот, фосфор и калий, които допринасят за храненето, се изнасят от селскостопанските полета, когато се прибира реколтата. Само част от тези хранителни вещества се рециклират обратно в земеделските площи под формата на органични материали тор или компост. Ако нерещиклираната част не се заменя с минерален или органичен тор, почвата ще бъде изчерпана и няма да има хранителни вещества необходими за растенията, което ще доведе до намаляване на добивите и по-ниско почвено плодородие. Регенеративното земеделие изисква определени правила и практики и не изключва използването на неорганични и органични торове или пестициди, целта е да се оптимизираме приложението им.

**За всяка конкретна схема на торене, потърсете представител на KVC Агро България*



Офиси:

София - тел: 02/ 954 60 02;
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22
Варна /с.Тополи/ - тел: 0888/ 445 237
Русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. Русе/ - тел: 0885/ 288 054
Монтана - 0882/ 898 007
Плевен - 0897/ 200 254

Дистрибутор за:

Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360;
0888/ 307 293; 0889/ 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
София: ФБМ Агро, тел. 0894/ 705 335
Монтана: Агро КГ, тел. 0885/ 357 239

 office@kvsagro.com

 www.kvsagro.com